







N^o 150

MK $\frac{0-8^{\circ}}{91P}$

$\varphi \frac{10-78}{323}$

$A^{\circ} = 555$

1 u 2rs.

78
3

ПОЛНЫЙ И ВСЕОБЩІЙ ЛЕЧЕБНИКЪ,

ИЛИ
ПОЛНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ ВРАЧЕ-
БНОЕ НАСТАВЛЕНІЕ НАРОДУ,

Содержащее въ себѣ ясное и подробное описаніе
всѣхъ возможныхъ признаковъ, всѣхъ причинъ и
разныхъ средствъ къ излеченію всякихъ какъ вну-
треннихъ, такъ и наружныхъ болѣзней, случаю-
щихся разнаго состоянія людямъ: съ показаніемъ
составовъ, дѣйствій и пріемовъ лекарствъ вкупѣ съ
осторожностями, при употребленіи оныхъ
наблюдаемыми,

которое на Латинскомъ языкѣ сочинилъ и Матема-
тическимъ образомъ въ седми часпяхъ расположилъ

ИВАНЪ ФРИДРИХЪ РИБЕЛЬ

Медицины Докторъ

и

Его Свѣтлости Князя и Курфюрста Бранден-
бургскаго Совѣшникъ,

а на Россійскій языкъ перевелъ съ пріозвщеніемъ 24 хъ
гравированныхъ Анастомическихъ картикъ Ивана Весля-
гѣя Миндана, Кавалера и Анастоміи Доктора, и Фарма-
нологіи или науки о лекарствахъ Христіана Теофила
Зеле, при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ
Медицинскаго Факултета Студентъ

Гома Барсукъ-Мойсеевъ.

Изданіемъ Университетскаго переплетчика
Никииы Водопьянова.

ВЪ МОСКВѢ,

Печатана въ Университетской типографіи
у В. Окорокова 1791 года.



ОДОБРЕНІЕ.

По приказанію Императорскаго Московскаго Университета Господь Кураторовъ я читалъ книгу подъ заглавіемъ: Полный и всеобщій Лечебникъ, и не нашелъ въ ней ничего противнаго наставленію, данному миѢ о разсматриваніи печатаемыхъ въ Университетской Типографіи книгъ: почему она и напечатана быть можетъ. Коллежскій Советникъ, Краснорѣчія Профессоръ, Цензоръ печатаемыхъ въ Университетской Типографіи книгъ и Кавалеръ

АНТОНЪ БАРСОВЪ.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

О

Терапіи или той практической части
врачебнаго искусства, гдѣ представляются
всѣ возможныя средства къ излеченію
всѣхъ, внутри человеческого тѣла слу-
чающихся, болѣзней, вкупѣ съ осто-
рожностями, какія во время
пользованія наблюдать
должно.

PART II

THESE ARE THE
REMARKS OF THE
COMMISSIONERS OF THE
LAND OFFICE
IN ANSWER TO A
RESOLUTION OF THE
HOUSE OF COMMONS
PASSED IN 1841
RELATIVE TO THE
LANDS BELONGING
TO THE CROWN



ЧАСТЬ ПЯТАЯ.

О тераліи или наставленіи
лѣчить болѣзни.

ОТДѢЛЕНІЕ I.

О леченіи всѣхъ болѣзненныхъ
приладковъ.

ГЛАВА I.

О леченіи отъ внезапнаго сокрушенія
силъ разнообразно случающагося.

de escluyi

§ 334. Во внезапномъ сокрушеніи силъ
(§ 394) врачъ долженъ впервыхъ обращать
вниманіе свое на многокровное больного состоя-
ніе; ибо еслили примѣчено будетъ таковое со-
стояніе, то вдругъ должно пустить кровь въ
довольномъ количествѣ, каковое кровопусканіе,
смотря по состоянію силъ и крѣпости больна-
го, и нѣсколько разъ повторить можно. Между-
тѣмъ надлежитъ употреблять жилокрѣпитель-
ныя, укрѣпляющія то есть чувствительныя
жилы, лѣкарства вкупѣ съ бобровою струею
(*pervina medicamenta tum castoreo*), и къ подошвамъ

Часть V.

А

дѣ



дѣлать ѣдкия, слегка мокроту натягивающія, прикладки; снаружи либо весьма оспорожно, либо и совсѣмъ не должно употреблять лепучихъ солей и другихъ душистыхъ или крѣпкихъ лѣкарствъ. Если можно спавить промывательныя лекарства, то сего никогда пренебрегать не должно; ибо промывательныя въ семъ случаѣ употребляемыя лекарства весьма великую иногда приносятъ пользу.

Еслили сіе внезапное силъ сокрушеніе или обмираніе случится у новорожденныхъ младенцевъ, что по большей части приключается отъ засоренія ихъ глотки и дыхательнаго горла, то должно вложить имъ палецъ въ ротъ, чтобы тѣмъ произвести рвоту, и учинить дыханіе свободнымъ; послѣ чего можно дать не много уксусу съ морскимъ лукомъ приготовленнаго (*acetum scilliticum*); въ ноздряхъ пошевеливъ перышкомъ, чтобы возбудить чиханіе, а послѣ дать не много испить теплаго вина для укрѣпленія силъ, и, смотря по обстоятельству, обмывать тѣло теплымъ виномъ съ уксусомъ смѣшаннымъ, спавить промывательныя соляныя и вдыхать въ легкое теплой воздухи.

Еслили у ребенковъ сей припадокъ по примѣтамъ будетъ происходить отъ червей, находящихся въ ихъ тѣлѣ, то въ такомъ случаѣ надлежитъ давать противоглистныя лекарства, на пр. цыцварное сѣмъ съ медомъ и прочая.

Исте-

Истерическія, спраждуція по естѣ маточными припадками, женщины должно оживлять отъ обмиранія запахомъ или обоняніемъ чертова духа (*varore affæ fetidæ*), забрызгиваніемъ лица холодною водою и снятіемъ съ нихъ платья. Можно также давать нюхать *белосардинской ухусъ*, нашатырной спиртъ и тинктуру или ессенцію боровой струи, которой также можно давать и въ нутрь по 10, 20 и 30 капель, смотря только, чтобы припадка сего не было причиною многокровіе. Въ какомъ случаѣ острожно съ сими каплями поступать должно.

Снаружи употреблать можно, прикладывая по естѣ къ вискамъ и поздымъ ухусъ, такъ называемый отъ истерическихъ припадковъ, котораго соснавъ естѣ слѣдующій:

Возьми травы свѣжей садовой ру-
ты вкупѣ съ сѣменемъ
онимъ и унцѣ.

Гумми гадбана
полунца.

Россійской боровой струи,
чертова духа по 2 золот-
ника.

Виннаго крѣпнаго ухусу 2
фунта. Дай имъ хорошо на-
стояться въ закупоренномъ
сосудѣ, послѣ, сливши, дай
для употребленія.

Rc. herbæ rotæ hor-
tensis com seme-
ne unc. i.

Gummi galbani
unc. dimid.

Castorei Rosci,
affæ fetidæ aa.
dr. ii.

Aceti vini concen-
trati libr. ii. dige-
rantur vase clauso,
& d. usui sic præ-
paratum acetum
hystericum.

Задушенныхъ какими либо сокрушающими
упругость жизненныхъ соковъ парами надлежитъ
полагать на холодной воздухъ и омывать лица
холодною водою. Впадшихъ въ обморокъ отъ
опію,

спію, должно возбуждати укусомъ; но естли сей припадокъ приключится отъ испареній бродительныхъ и крѣпкихъ напитковъ, то въ такомъ случаѣ надлежитъ оживлять ихъ поставленіемъ такъ называемыхъ табачныхъ, изъ табачнаго то есть дыму приготовляемыхъ, промывательныхъ (cnemata de fumo nictianæ).

ГЛАВА II.

О леченіи худобы или худокровія de curatione cachexiæ.

§ 834. Худоба, слабость то есть въ тѣлѣ или худокровія (§ 432) леченіе состоитъ въ томъ: чтобы въпервыхъ густую, вязкую и липкую мокроту изъ тѣла и кроваваго состава вывести вонъ; и наконецъ ослабляя и дрябля тѣлесныя волокны (relaxatæ fibræ) надлежащимъ укрѣпить образомъ.

§ 836. Первое дѣйствіе (§ 838) исполнить можно помощію легкихъ слаблящихъ желудокъ лекарствъ, постепенно употребляемыхъ, предписывая между прочимъ и крѣпительныя лекарства; слабительныя лекарства можно предписывать и давать въ видѣ электурія или кашицы, либо настоекъ изъ горькихъ экстрактовъ, раздробляющихъ и разводящихъ вязкость, ревеню, золототысячниковыхъ верхушекъ и распускаемаго виннаго камня (tartarus solubilis): вмѣсто крѣпительнаго лекарства я совѣщую употреблять тинктуру или настойку желѣзную ооблоченную скупъ съ настойкою или кал-

лями жажарылловыми. (tinctura martis pomata cum essentia cascarillæ).

§ 837. Если вязкой и густой матеріи довольно изъ тѣла выведено будетъ, краска въ лицѣ опять натуральною учинится, отступятъ дурнои и уныніе и въ тѣлѣ почувствуется нѣкоторая крѣпость; тогда должно употреблять и долго продолжать изъ желѣза приготовленные и другія крѣпительныя лекарства; въ пропивномъ же случаѣ избѣгать оныхъ должно, а употреблять Бехеровы либо Шталіевы лилики или жатышки, (pilule Becherianæ vel Stalianæ). Впрочемъ никакихъ горячительныхъ лекарствъ употреблять не должно, исключая виноградныя хорошія вины и шонкое полпиво, смотря по общоупотребляемъ и привычкѣ больного.

Впрочемъ при употребленіи слабительныхъ лекарствъ надлежитъ иногда употреблять и острую виннокаменную или сурьмяную тинктуру (tinctura tartari acris s. antimoniata), эссенцію лнтарную и эссенцію совиной стрѣлы или лимонелла (essentia succini & pimpernellæ albæ), и другія симъ подобныя крѣпительныя и разбивательныя лекарства, дабы отъ частаго слабленія не ослабѣлъ совсѣмъ желудокъ.

Если будетъ нѣкоторая опасность, чтобы не учинилось расслабленіе и засорѣніе во внутренностяхъ, то должно давать разбивающія вкупѣ съ испражняющими лекарства, каковы суть слѣдующіе приемы:

Возьми стуженного соку или
экстракту изъ чистлика,
Избранной нашатырной
гумми.

Чистота Грецкого жмла
по 2 золотника.

Смѣшай и сдѣлай съ крѣп-
ительными Нарацельсовыми ка-
плями напышки вѣсомъ вѣ 3
грана. Пересыпь плаутовымъ
порошкомъ и давай по утру
и вѣ вечеру по 10 или 20 ка-
пышекъ.

Возьми порошокъ изъ хорошей на- RC
шатырной гумми,
Избраннаго галбана,
Избранной смирны,
Экстракту изъ померанце-
выхъ корокъ,
Чертополоха по ползолот-
ника.

Смѣшай и сдѣлай съ померан-
цовыми каплями напышки вѣ-
сомъ вѣ одинъ гранъ, обведи
золотомъ и давай поутру и вѣ
вечеру по 10 напышекъ.

Возьми избранной нашатырной RC
гумми 1 золотникъ, распусти
вѣ лишномъ желткѣ, послѣ при-
дай воды пчельной травы безъ
вина прѣготовленной,

Воды липовыхъ цвѣткѣ по 2
унц.

Кориценой воды съ кипятани
прѣготовленной одинъ унцъ.

Морскодуховата уксуснаго ме-
ду 3 золотника, смѣшай и да-
вай великіе три часа по поло-
винѣ чайной чашки.

RC. extract fumar.

Gum. ammon. elect.

Sap. Venet. pur. aa
dr. ii.

m. f. c. olix. p.
P. pil. pond. gr.
ii. Consp. Pulver.
lycopod. d. mane
& sero, X. vel.
XX. pilol.

pulver. gum. amm.
elect.

Galb. elect.

Myrrhæ. elect.

Extract. cort. avrant.

Cardoi benediti aa.
dr. f.

M. f. c. essent. aurant.
pil. pond. gr. i.
obduc. fol. avri d.
x. mane &
vesper.

gum. amm. elect.
dr. i. solv. c. vi-
tell. ovor. n. i. adde
aqu. meliss. f. v.

Aqu. fl. tilisæ aa
unc. ii.

Ciannamom. cydo-
niat. unc. i.

oxymel. scillitici
dr. iii. m. d. omni
trihorio dimidium
vasculum theanum.

ГЛАВА III.

О леченіи сухотки de curatione atrophiae.

§ 838. Сухотки (atrophiae (§ 407) лечение состоитъ въ томъ: чтобы впервыхъ разбить и истребить завалы и запоры, находящіеся въ брижейкѣ, поджелудочной желѣзѣ, печенкѣ или селезенкѣ; и потомъ ослабленное тѣло надлежащимъ укрѣпить образомъ, давая хорошую питательную пищу и приличное питье.

§ 839. Первое показаніе (§ 838) Совершается мягчительными и разбивательными лекарствами, каковы суть: рвечная настойка, эссенція или катлаи екулъ съ жидкостью существенной виннокислотной соли или виннокислотной листовой земли, (anima Rhei cum liqore terrae foliatæ tartari). Когда никакого не было подозрѣнія о нарывѣ, въ какой либо благороднѣйшей внутренности находящемся, и по примѣтамъ желчь была случаемъ учинившейся сухотки; то я въ такихъ обстоятельствахъ со всякою безпечностію давалъ рвотное лекарство, а послѣ разбивательныя и опровергательныя или пропускныя лекарства. Наконецъ, дабы укрѣпить изнуренное тѣло, я вслѣдъ употреблялъ студни (gelatinæ).

§ 840. Въ леченіи сухотки такъ какъ заразы избѣгать должно жирныхъ, а наипаче масленыхъ веществъ и кровопусканій.

Поелику же сухотка по болѣйшей части у младенцевъ случается; для того все вниманіе свое обращать надлежитъ на причины, которыя

причиняющіѣ оную. Естѣли сухотка по примѣчаніямъ происходитъ будетъ отъ испорченнаго молока, то въ такомъ случаѣ вдругъ должно перемѣнить кормилицу, а естѣли отъ находящейся на первыхъ пушяхъ кислоты, то употребляя въ виножаменное масло чрезъ отсыреііе полученное (*oleum tartari per deliquium*) съ водою, или Аглинскую магнезію, съ водою же или молокомъ.

Естѣли же причиною сухотки будутъ запоры и завалы; то хорошо давать меньшимъ ниже слѣдующее лекарство:

Возьми самаго лучшаго ревеню,
изгнанду или магнезію по
1 золотнику.

Вениціанскаго или грецкаго
мыла 20 гранъ.

Золотой сурьмяной сѣры или
сѣрнаго порошку изъ сурьмы
полученнаго 6 гранъ.

Масленаго сахару Волоскаго
укрону 1 золотникъ. Смѣшай
и сдѣлай порошокъ, котораго
дважды или трижды давай
въ день по 10 гранъ.

RC. Rlei optimi,
magnes. alb.
aa dr. i.
Sapon. venet.
gr. XX.
Sulphur. avrat.
antim. gran.
VI.
Oleo sacchari
sceniculi dr. i.
m. f. pul-
vis. d. bis vel
ter de die gr. X.

А большихъ слѣдующій составъ:

Возьми чистой нашатырной
гумми 2 золотника.
Грецкаго мыла 1 золот-
никъ.

Стуцвеннаго соку изъ золоти-
стическаго 40 гранъ.

Сладкой рипуты 5 гранъ.

Смѣшай, сдѣлай кашышши
вѣсомъ въ 2 грама и давай
по 3 на одинъ прѣемъ трижды
въ день.

RC. Gum. ammon. d.
dr. ii.
Sapon. Venet. dr. i.
Extact. centavr. mi-
nor. scrupul. ii.
Apuilæ albæ dr. V.
M. f. p. pond. dr.
ii. d. tres. ter.
de die.

Мож-

Можно такъ же намазывать животъ слѣдую-
щею мазью:

Возьми чистой нашатырной гум-
ми, растворенной въ уксу-
сѣ морскимъ лукомъ пригото-
вовленномъ, 3 зрлотинна.

Сгущенной бычачей желчи под-
волопника.

Жилокрѣпительной мази
унцѣ.

Анисаго, и тминнаго изсла
по 10 грановъ, сибѣшай и наши-
рай животъ дважды въ день.

RC. Gummi ammon.
d. acet. scqillit.
folat. dr. ii.

felis tauri inspi-
scati. dr. sem.

ungueti nervini
unc. i.

Olei anisi & cumini
aa scrup. semis. M.
inungatur abdomen
bis de die.

ГЛАВА IV.

О леченіи Аглинской болѣзни или увѣчья de curatione rachiridis.

§ 841. Въ леченіи Аглинской болѣзни,
(§ 410) какъ внутрь, такъ и снаружи употре-
бляемыя мягчительныя, жилокрѣпительныя, и
легкія слабительныя лекарства, также ванны
и другія бани великую приносятъ пользу. Къ
слабительнымъ лекарствамъ должно примѣшивать
по два или по три грана сладкой хорошо при-
готовленной ртути (mercurius dulcis rite preparatus).
При употребленіи слабительныхъ лекарствъ по-
требно такъ же предписывать и легкія крѣпи-
тельные лекарства.

При леченіи Аглинской болѣзни или увѣчья я
видалъ въ моей практикѣ превеликую пользу ни-
жеслѣдующихъ лекарствъ, составляемыхъ и
употребляемыхъ такимъ образомъ:

Возьми корня Ангельской сладосни ,	RC. radicis poly-
Селлеря ,	podii,
Воласкаго укропа ,	Apil,
Аниса по полу унца ,	Foeniculi,
Листовъ проскурняковыхъ ,	Anisi aa unc. sem.
Женскаго волосу ,	Folior. malvæ ,
Чистяловыхъ ,	Capilli veneris
Гребенищиковыхъ по 1 горсти.	Chelidonii majoris
Коринки или Коринскаго нязму 3 унца.	Tamarisci aa. m. i.
	Uvarum corynthiacarum unc. iii.

Срубивъ , вари въ прѣхъ мѣрахъ ключевой воды и дай для употребленія вмѣсто обыкновеннаго питья.

Снаружи употребляя я слѣдующую мазь :

Возьми листовъ полынныхъ ,	RC. Folior absynthii;
Золотошмысчниковыхъ ,	Centaur. minor.
Маррусовыхъ или бѣдой шашты.	Marrubii albi,
Листовъ травы не забудь и ея называется.	Chamaedrios.
Листовъ каменной шашы.	Calaminthæ.
Звѣробойныхъ.	Hyperici..
Богородской травы.	Serpilli.
Мятныхъ.	Menthæ.
Шалфейныхъ.	Salviæ.
Рушныхъ.	Rutæ.
Божїего дерева.	Abrotani.
Жижминныхъ или дикой рябины.	Tanaceti.
Свиннаго сала.	Axungie porcine.
Бычачьего жиру.	Sevi bovini.
Краснаго вина по 2 фунта.	Vini robri au libr. ii.

Намочи въ глиняномъ сосудѣ и поставь въ теплую зоду , гдѣ пусть спомитъ 12 часовъ . потомъ дай кипѣть до шѣхъ поръ , пока вся жидкость выпрѣетъ ; послѣ процѣди и дай для употребленія.

Впро-

Впрочемъ должно знать, что ничто въ сей болѣзни не приноситъ никакой пользы, какъ хорошая діета, копорю соленая и негодная кровь, причиняющая сію болѣзнь, весьма хорошо исправляется и очищается.

Ибо естѣли содержать хорошую и тонкую діету, то симъ однимъ образомъ безъ всякаго употребленія другихъ средствъ, исключая употребленіе слабительныхъ лекарствъ, совершенно пользоваться можно сію немочъ.

Естѣли младенецъ еще пипается грудью, то должно смотрѣть, чѣобы молоко у матери его или кормилицы было тонкое, не горячее и не соленое; въ противномъ случаѣ вдругъ надлежитъ перемѣнить кормилицу; а естѣли у матери шакое же будетъ молоко, то надлежитъ сей часъ сыскать шакую кормилицу, у копорой бы хорошее было молоко.

Взрослой уже младенецъ, на лр: двулѣтній или прехлѣтній, можетъ употреблять сочную хорошую пищу, тонкую похлебку изъ молодыхъ жившнихъ, а наипаче дикихъ пшицъ приугопваемую и хорошее молоко.

Но естѣли сія болѣзнь буде закоронѣлая или очень сильная; то въ семъ случаѣ всякимъ образомъ спараться надлежитъ исправить больного кровь и вывести изъ тѣла негодную матерію. Чѣо дабы съ успѣхомъ учинить, должно поступать слѣдующимъ образомъ:

Для

Для поправленія худой крови и выведенія изъ пѣла худыхъ маперій надлежитъ вдругъ дать слѣдующее пронесенное лекарство :

Возьми сладкой ртутки 10 гранъ. RC. Aquilæ albæ gr. X.
Сканионей съ квитами при- Diacrid. cidoniat.
готовленной 4 грана. gr. IV.

Сдѣлай съ небольшимъ количествомъ розовой приправы (conserva) двѣ пилюли, которыя должно употребить по утру, записавая слѣдующимъ питьемъ :

Возьми чистаго Александрійскаго RC. Sen. alexand. depur.
листу 1 золотникъ. dr. i.

Исполченнаго ревеню, Rhabarb. contof.

Изрѣзаннаго епиеима или на- Epithym. incis.

вилуцы по ползолотника. aa dr. sem.

Полынной соли 10 гранъ. Sal. adfynth. gr. XX.

Вари въ трехъ унцахъ ключевой Coq. in aqv. unc. iii.

воды, и въ отварѣ распусти. In colatura dissolve.

Самой лучшей манны 1 унцъ. Mannæ calabrinæ
unc. i.

Сдѣлай питье и вели записавъ F. poti.
по принятіи одной сначала пи-
люли.

На другой день очищенія желудка ребенокъ долженъ употреблять слѣдующую похлебку съ ряду девять дней :

Возьми корня брусковато. RC. Radic. brusc.

Спаржеваго. Asparag.

Цикорейнаго или зубиз- Cichor. aa unc. f.

го по полуунца.

Вари въ ухѣ молодата цып- Coq. In iusculo pulli
ленка. junioris.

Послѣ придай листовъ цы- Dein adde fol. cichor.

корейныхъ.

Chærefol.

Кервелевыхъ. Borrag. aa. m. i.
Огуречныхъ по горсти, coq. adhuc. per horæ
вари еще четверть часа, quadr. col. & exprim.

послѣ прохѣди, оспашки

хорошо

хорошо выжми и такимъ *f. juscolum.*
образомъ составь похлебку.

Когда пригостиши сию похлебку, и больной
начнетъ употреблять оную: то вдругъ должно
взять изъ аптеки и дать нижепоказаннымъ об-
разомъ слѣдующее лекарство:

Возьми финнаго камня съ спалью *RC. Tartar. chalybeat.*

приготовленнаго 10 гранъ. *scrup. f.*

Дай съ одною ложкою похлебки, и послѣ вели заливать
ее же до окончанія похлебкию.

По окончаніи употребленія сея похлебки, боль-
ного опять должно прочистить такимъ же об-
разомъ, какъ сказано выше, а потомъ давать
слѣдующій порошокъ съ ряду девять разъ:

Возьми железнаго пропускнаго *RC. Croc. mart. aperit.*
таискою россою пригото- *maia. cor. praparat.*
вленнаго шафрану.

Ревеню въ порошокъ стол-
ченнаго, по 10 гранъ.

Минеральнаго сеѣна безъ
огня приготовленнаго,

Древесной кассіи по 6
гранъ.

Корицы,

Ялапы въ порошокъ стер-
тыхъ по 4 гранъ. Сдѣлай по-
рошокъ, и дай на одинъ или

два прѣма, велѣвъ зани-
мать цицеликовою похлебкою
съ цикорейными листьями при-
готовленною

Rhei pulverat. aa
gr. X.

Ethiop. mineral f.
igne preparat.

Cass. lign. aa. gr.
VI.

Cinnamom.

Jalap. pulverat. aa
gr. V.

f. pulv. pvo una vel
duabus dosibus, su-
perbibendo Juscu-
lum pulli foliis ci-
chorei alteratum.

Когда больной помянутаго порошку приметъ
два четыре, то, дабы неослабѣлъ отъ часта-
го употребленія онаго, надлежитъ одинъ или
два дни не давать онаго, при окончаніи же упо-
тре-

прѣбленія сего порошка, должно послабитьъ желудокъ, и послѣ велѣть употреблять дней пятнадцатъ коровье снятое молоко сполненное съ сарсапарилловымъ корнемъ и небольшимъ количествомъ сахару, что однакожъ всякой день вновь приготавливать должно.

Послѣ употребленія сего молока надлежитъ еще нѣсколько времени давать больному ослиное парное молоко, и, наконецъ послабивъ разъ или два раза желудокъ, давать чрезъ день по 40 гранъ слѣдующій составъ:

Возьми приправы изъ двѣшовъ по RC. Conserv. flor. aurant.

Дикой рожы по 3 золотника.

Synorrhod. aa. gr. III.

Порошку изъ сарсапариллы.

Pulv. sarsaparil.

Приготовленныхъ красныхъ моральковъ по 2 золотника.

Coral. rubr. preparat. aa dr. II.

Минеральнаго сеіона или чернаго сѣроршущнаго порошку,

Aetiop. mineral.

Пошовой сурьмы.

Antimon. diaphor.

Оленья рога философически при-
готовленного по 40 гранъ. Сдѣ-
лай съ довольнымъ количествомъ
полимнаго сиропу опіатъ.

Corn. cerv. philoso-
phice preparat.
scrup II. fiat com f.
q. syr. de absynt.
opiatu.

Такимъ образомъ поступая можно совершенно воспользо-
вать больного, только бы смотрѣть,
чтобы во всемъ хорошо наблюдаема была діета
или содержаніе больного. Если же больной не-
оправится, то должно все предоставить напу-
рѣ, которая сама часто съ лѣтами таковыя
пользуетъ болѣзны.

ГЛАВА V.

О леченіи отъ червей или глистовъ de
curatione vermium.

§ 842. Глисты или черви въпѣлѣ умерщвляются
горячими и ртутными, а вонѣ изъ пѣла извер-
гаются проносными лекарствами на пр. симъ:

Возьми порошокъ изъ дыцварнаго RC. pulver. semin. fan-
семени ундѣ 1. ton. unc. 1.

Сладкой ртутни ползолотника. Mercur. dulc. dr.
sem.

Полынинику, Corallinæ,

Ялапповаго корня по 2 золотни- Rad. jalappæ aa
ка. dr. ii.

Смѣшай, сдѣлай съ довольнымъ количествомъ розоваго
сахару маленькія лепешки (morsuli) и давай по одной, по
дѣи и такъ далѣе:

Возьми розоваго сабуру,

RC. aloes rosatæ,

экстракта или стуженнаго соку
изъ черной чемерицы.

extract. belle
bor. nigr.

Чистой сивры.

Myrhæ elect.

Сладкой ртутни по ползолот-
ника.

Mercurii dulc.

Чортова духа или вонючей ка-
меди 13 гранѣ.

aa dra. f.

assæ fetid.

Жижиината масла 3 капель.

gr. XV.

Olei tanacetigr.

V.

Смѣшай, и, сдѣлавъ пилюли въ-
сомѣ въ 1 гранѣ, давай, смощря по
обстоятельствамъ.

M. f. pilul. pond.

gr. i. d. respici-

endo ad circum-

stantias.

Или Возьми порошокъ изъ Sive RC. Pulver. semin. fanton.
дыцварнаго семени.

Полыниника или коралликова
иху.

Musci corallini.

Минеральнаго веѣпа или
чернаго порошокъ изъ ртутни
и сѣры приготовленнаго.

Aethiopis mineralis.

Ялаппы

Ядупы по ползолотника,
смѣшай и сдѣлай порошокъ,
который давай, умножая по-
степенно прѣйтъ.

jalappæ aa dr. sem.
m. f. p. d. gra-
datim dosin au-
gendo.

§ 843. Иные похваляютъ слѣдующій снаружи
къ пуповой сторонѣ прикладываемой пластырь:

Возьми порошокъ изъ сабуры.
Райскихъ яблокъ,
Свири по 1 унцу.
Козацкаго Можжевельника.
Руты.
Полыни.
Живши или дикой рябины.
Корня параличной травы или
переступна по 2 золотника.
Воску.
Смолы или вару по 2 унц.
Рупнато мислз 1 унцъ, смѣ-
шай и сдѣлай пластырь.

RC. Pulver. aloes,
Colocyntidis.
Myrrhæ aa unc. 1.
Sabinæ.
Rutæ.
Absynthii.
Tanacetii.
Rad. bryoniæ aa
dr. ii.
Cereæ.
Resinæ aa unc. ii.
Olei rutæ unc. 1. m.
f. emplastrum.

Впрочемъ надобно знать, что всѣ пакковыя по-
ступки будутъ безуспѣшны, еслии не бу-
детъ употреблено спаранія, сперва разрушивъ
гнѣзда червей и ту вязкость, въ которой
скрываются глисты, а потомъ уже умерщ-
влять оныхъ, къ чему кромѣ вышесказанныхъ
пчѣмовъ хорошо употреблять столженное съ
лукомъ, чеснокомъ и бурдыряномъ молохо, и
деревянное масло одно или ехулъ съ цитроннымъ
или лимоннымъ сокомъ. Къ изгнанію же изъ тѣ-
ла и умерщвлению оныхъ съ пользою можно упо-
треблять слѣдующія лекарства:

Возьми цыцварнаго сѣмени.
Дикой рябины по-
ползолотника.
Чертова духа,

RC. Sem. fant.
Tanacet. aa. dr. f
Asse foetid.

Слад-

Сладкой ртутки по 10 гранѢ.
Ялопного корня 2 унца.
Слабительнаго розоваго сиро-
на 2. унца.
Смѣшай и давай по деѢ дош-
ки трижды вѢ день.

Mercur. d. aa. gr. X.
Rad. jalappæ unc. II.
Syrup. ros. solut.
unc. II.
M. d. ter. de die duo
cochlearia.

Если же будетѢ находиться плоская глиста
вѢ пѣлѢ, которой признакомѢ почипается то,
когда больные при чиханіи или испражненіи желуд-
ка чувствуютѢ вѢ животѢ нѣкоторое переливное
движеніе; то хорошо слѣдовать. Г. Шеле, ко-
торый, послѣдуя способу Гереншванціеву,
изгонялѢ плоскую глисту нижеслѣдующимѢ об-
разомѢ: съ вечера велѣлѢ онѢ пить нѣсколько ло-
жекѢ масла на лр: миндальнаго и проч., а по
утру давалѢ нашоцакѢ по 10 гранѢ желтой ка-
меди (gummi gutta); если же не выходила по-
мянутая глиста съ испражненіями, то онѢ опять
давалѢ по 10 гранѢ той же камеди; когда и та-
кимѢ образомѢ не выходилѢ червь, то онѢ велѣлѢ
сперва пить мясную похлебку, а послѣ опять
давалѢ по 10 гранѢ помянутой камеди, и та-
кимѢ образомѢ пользовалѢ больныхѢ отѢ оных
неудобоуморимых и изгоняемых глисты (tenia).

ГЛАВА VI.

О леченіи водяной болѣзни de curatione hyd- ropis.

§ 844. ПорядокѢ леченія водяной болѣзни
(§ 412) есть таковѢ: чтобы первѢ спячую
Часть V. В подѢ

подъ кожей воду разбить и вонъ изъ пѣла из-
вѣстнѣть, а потомъ какъ кровь приведемъ въ на-
туральное состояніе, такъ и ослаблыя укрѣ-
пить внутренности.

§ 845. Относительно до пераго показанія
(§ 844) съ пользою употреблѣнъ можно слѣду-
ющія лекарства въ сухомъ видѣ:

Двадцати экстракта изъ чистяка, RC.	Extract. fumaricæ.
Порошка изъ ялпимъ по 1	Pulver. jalappæ aa.
золотнику.	dr. i.
Хорошаго ревеня.	Rhabar. elect.
Можжевеловой соли,	Salis juniperi,
Виннокамеяной соли по 20 гранъ.	Tartari aa scrop. I.
Крушинниковаго сиропа,	Syrup. de spina cer-
сколько потребно, смѣшай	vina. q. f. m. f. pi-
и слѣлай кашышки въсомъ въ	lulæ pondere gr. II.
2 грана, и давай по 5 и даѣе.	d. V. & sic porro.
	five

Двадцати массы для полихресто-	RC. Massæ pilul. polychrest.
выхъ пилюль 2 золотника.	dr. II.
Нашатырной гумми въ мор-	Gummi ammon. aceto-
скодуковаго уксусѣ разпу-	scillitico soluti.
щенной.	
Сладкой рршши.	Mercuri dulc.
Водяной смирновой настойки	Extract. myrrhæ aqvo-
или экстракта по 15 гра-	si aa gr. XV.
новъ.	
Экстракта изъ лошакова	elaterii dr. vi.
огурца 6 грановъ.	
Смѣшай и слѣлай съ поме-	F. cum essent cort.
ранцовыми каплями кашыш-	avant. pilul. pond.
ки въсомъ въ 1. гранъ, и да-	gr. i. d. pro circum-
вай, смотри по обстоятель-	stantiis.
ствамъ.	

§ 846. Въ жидкомъ видѣ съ пользою употре-
бляется въ леченіи водяной болѣзни лекарствен-
ная вина, настоянныя съ

Верхуш-

Верхушками полынными,	Cum sumitat. absynthii
Верхушками кудряваго ел- лца или росто́ропши.	Cardui benedicti
Съ правою пѣкѣ называемою репешникѣ или агрымоніа.	Cum herba agrimoniae.
Чистякомѣ.	Fumarizæ.
Дикимѣ авраномѣ.	Gratiolæ.
Иглишниковымѣ корнемѣ,	Radicibus ononidis.
Калганомѣ,	Galangæ minoris. &
И коньшнымѣ ревнемѣ.	rhabarbari.

§ 847. Кѣ укрѣпленію ослаблага тѣла полез,
но употреблять.

Корку каскариловую, Cortex cascarillæ,

Корку Винтеранскую, иначе Ма-
геланскою корицею называемую, и Vinterani s. ca-
nenellæ albæ.

Лекарства приготовленные съ ревнемѣ и шафраномѣ
вкупѣ съ лекарствами изъ железа составленными.

§ 848. Когда пульсѣ былѣ полонѣ и краска
находилась въ лицѣ, то я съ хорошимѣ успѣ-
хомѣ пускалъ кровь и, смотря по необходимости
многокровія, и нѣсколько разѣ повторялъ крово-
пускание. Естли же дыханіе бываетѣ весьма
трудное и силы въ крайнее приходятѣ истоще-
ніе вкупѣ либо съ непрерывнымѣ бдѣніемѣ или
бессонницею, либо со всегдашнимѣ засыпаніемѣ -
то въ такомѣ случаѣ кровопусканіе больше при-
чиняетѣ вреда, нежели пользы. Бохолтробадеіе
(præsentibus) ускоряетѣ только смерть, а не при-
носитѣ пользу, когда внушенности въ живомѣ
весьма много попортились и уже англономѣ
огнемѣ заразились. Почему учиненіе таковой опера-
ціи надѣ людьми, которые много употребляли
вина, есть всякой подвержено опасности. Люди -

спраждающие брюшную водяною болезнью (*ascite laborantes*), по большей части бывающих неизлечи-

Однако по совету Г. Листера и Шомберга съ пользою употреблять можно для выведенія воды изъ брюха сгущенной сокъ изъ растенія такъ называемого лошажьей огурецъ (*elaterium*) либо въ порошокъ, либо въ отваръ, либо въ настойку; или взявъ средней бизинной корки 3 золотника, и, отваривъ сную въ водѣ смѣшанной съ молокомъ, взявши сихъ жидкостей по одному фунту, давать по утру и въ вечеру по одной части, и повторять сѣе до тѣхъ поръ, пока больной выздоровѣетъ. Въ противномъ случаѣ, естли сей поступокъ никакой не сдѣлаетъ пользы, Маіернъ советуетъ употреблять отваръ изъ муравьиныхъ яицъ, копорый готовится такъ:

Возьми одну ложку муравьиныхъ яицъ, отвари въ снятомъ молокѣ, послѣ выжми, и, подсладя сахаромъ, давай передъ обѣдомъ за 4 часа, что должно повторять нѣсколько съ ряду дней или недѣль; естли же сии средства не пособятъ больному, то должно взять, какъ говоритъ Шомбергъ, примѣняясь къ простолоудимству, сокъ изъ чесночныхъ и бизинныхъ листовъ по ровной части, и, смѣшавши, давать по 3, или 4 ложки дважды или трижды въ день. Отъ чего нерѣдко въ самыхъ даже крайнихъ обстоятельствахъ великая видѣнна была польза.

§ 849. Изъ лекарствъ, которыя я съ великою пользою употреблялъ въ леченіи сего болѣзни, есть всѣхъ преимущественнѣе ниже слѣдующее:

Возьми зольи изъ виноградной

RC. ciner. lign. vitis.

лосы,

Шильной травы или
полыни.

Можжевеловаго корня,
средней бузиновой корки по
2 золотника.

Физалковаго корня,
Волостей черной чемерицы
по 1 унцу.

Порошка изъ яланы,
Листовой винисаженной зем-
ли или существенной винно-
каменной соли по полунца.

Золототысячниковыхъ вер-
хушекъ 1 горсть.

Свѣжихъ померанцовыхъ ко-
рокъ полунца.

Гвоздики 1 золотникъ.

Сибтай и налей нѣсколькимъ
мѣрами хорошаго вина.

Genistæ five ab-
synthii.

Rad. juniperi.

cort. med. sambuc.

aa unc. II.

Rad. iridis florent.

fibr. hollebor. nigr.

aa unc. i.

Polver jalappæ.

Terræ soliat. tartari

aa unc sem.

Sumit. centavr. mi-
nor. m. I.

Cort. avrant. recent.

unc. sem.

Caryophyllor. dr. I.

M. infunde cum ali-

quot mensuris vini
boni.

§ 850. Снаружи я употреблялъ мѣшечки или
прикладки, которыя я дѣлалъ изъ

Корней морскаго лука.

Фіалки и

Зари или любистка.

Изъ листьевъ дикой бузины.

Золототысячника.

Полыни.

Листовъ римской или са-
довой ромашки.

Сѣмянъ тимоновыхъ и
пшеничныхъ.

Ex rad. scillæ.

Iridis &

Levistic.

Foliis ebuli,

Ex herba centavrii m.

Absynthii.

Fol. chaniomillæ ro-
manæ.

Semin. carvi & cu-
cumini.

Что все вкупѣ отвративши либо яѣ изве-
стной водѣ, либо винѣ, либо винномѣ или рен-
скомѣ укусѣ, прикладывать должно къ живо-
пу или мошонкѣ, либо къ ногамъ больного.

§ 851. Когда больной выздоравливалъ отъ
своей водяной болѣзни, то я, дабы болѣзнь
опять не возвратилась, съ превеликою пользою
и охраненіемъ употреблялъ сіе лекарство:

Возьми дягилеваго корня.

RC rad. angelicæ.

Каменной мяты.

Calaminthæ menthæ.

Корня ирога.

Calami aromat.

Царскаго корня по 1
унцу.

Imperatoris aa unc. 1.

Листовъ бѣлой шап-
ты или жарусовыхъ.

Fol. marrubii albi.

Богородской травы или
матерячки.

Serpilli.*

Полѣю и божіаго дерева.

Pulegii & abrotani.

Листовъ заѣрбовыхъ
по 1 горсти.

Fol. hyperici aa m. 1.

Шафранныхъ одинъ зо-
лотника.

Croci dr. 1.

Сѣмянъ тимоу и

Sem. carvi &

Дожечной травы по 2
золотника.

Cochleariæ hort. aa
dr. II.

Сруби, смѣшай и съ хо-
рошимъ медомъ сдѣлай
кашицу или электуарію
и давай трижды въ день.

Fac cum melle electu-
arium. d. ter de die.

§ 852. Чпужъ касается до скарификаціи, то
есть насѣчки на кожѣ и испариногонительныхъ
лекарствъ, то я всегда худое видѣлъ дѣйствіе
оныхъ; что то есть послѣ употребленія по-
мянутыхъ средствъ всегда великое происходиѣ
воспаленіе и потомъ помертвленіе или совершен-

ное

ное гніеніе. Тоже самое примѣчать должно и о летучихъ соляхъ на пр. о летучей змѣйной, изъ лрѣженія то есть змѣйнаго шуловыща лрѣготовленной соли, оленья рога и янтаря. Такъже о сильныхъ проносныхъ, а наипаче въ леченіи брюшной водяной болѣзни (§ 415.) употребляемыхъ и мочегонительныхъ лекарствахъ, копорыя однакожъ, то есть мочегонительныя лекарства съ начала и во время умноженія болѣзни съ очевидною употребляются пользою. Сюда относятся еще всѣ вяззательныя и крѣпкія, снаружи употребляемыя, лекарства тогда, когда вода либо изъ брюха, либо изъ ногъ, просѣдши, вытекаетъ; ибо въ такомъ случаѣ хотя опъ употребленія помятыхъ лекарствъ опухоль на ногахъ и уменьшается, однако гнилая и соленоводяная матерія прогоняется внутрь и прищекается ко внутренностямъ, находящимся въ чревѣ.

ГЛАВА VII.

О леченіи сухой водяной болѣзни въ брюхѣ de coratione tympanitidis.

§ 853. Брюшная водяная сухая болѣзнь, барабаннымъ звономъ, (tympanitis) называемая, лечится какъ вѣтроразбивательными, такъ и влажнительными лекарствами.

§ 854. Первое показаніе, то есть вѣтровъ разбиваніе, производится и наконецъ совершается

помощію легкихъ слабительныхъ лекарствъ; такъ же промывательныхъ, изъ лечебной травы (*herba melissæ*), иссола (*hyssopi*) и ромашковыхъ цвѣтовъ приготовленныхъ. Снаружи прикладываясь должно къ брюху, либо мыльной Барбетовъ пластырь, либо мазь, составленную изъ вътроразбивательныхъ маселъ, каковы суть тимочное и ромашковое масла (*olea carvi et chamomillæ*). Какое намазываніе производится тогда, когда болѣзни сея причиною бывающъ внутреннія судороги или спазмы, при чемъ не ошибно должно давать внутрь больному и олій (*opium*). Съ проносными выше упомянутыми лекарствами хорошо употребляя и разбивающія завалы лекарства, каковы суть сурьмяная сѣра и реотной винной камень; естли же запоръ столь силенъ будетъ, что никакія слабительныя и промывательныя лекарства пособить не будутъ въ состояніи; то въ такомъ случаѣ по совѣту Г. Шеле употребляя должно промывательное, такъ называемое изъ лостоянаго воздуха, (*clyster ex aere fixo*), который не только отворяетъ таковой запоръ, но и производитъ Геморройное печеніе, естли опъ оставленія онаго сія приключилась болѣзнь.

Можно также пускать кровь, когда примѣчено будетъ въ больномъ многокривіе.

§ 855. Влажнительныя лекарства (§ 857) сами по себѣ ясны. Чтожъ касается до укрѣпленія
спивіе

слабаго пѣла, по я видѣлъ весьма хорошее дѣй-
ствіе слѣдующихъ кашышковъ:

Возьми сгущеннаго сока или RC. Extract. gent. rubr.
экстракта изъ красной dr. i.
генціани і золотникъ.

Ревеневаго порошка,

Pulver. rhabbarbari.

Спильныхъ опилокъ по і
скрупею или по 20 гра-
новъ.

Limatur. chalib. aa
scrup. i.

Купоросной кислоты 2.
грановъ.

Spirit. vitriol. gutt.
VIII.

Капель или эссенціи поме-
ранцевыхъ корокъ сколько
потребно.

Essent. cort. av-
rant. q. s.

Смѣшай, и сдѣлай кашышки
въсомъ въ одинъ гранъ и да-
вай по 5 и больше на одинъ
прѣмъ.

M. f. p. p. gr. I. d.
v. & plus pro dosi.

ГЛАВА VIII.

О леченіи мошонковой водяной болѣзни или
грыжи de curatione hydroceles.

§ 856. Мошонковая водяная олухоль или бо-
лѣзнь, иначе мошонковою грыжею называемая,
(hydrocele § 429) не совѣмъ можетъ быть из-
леченна посредствомъ лекарствъ по причинѣ ча-
стей внѣ пѣла находящихся. Почему врачъ
все свое вниманіе обращать долженъ пуда,
чтобы опсрашитъ имѣющую воспослѣдовать
худосочность или лихость, либо и самую водя-
ную болѣзнь. Чпо дабы учинить, по должно
сохранять желудокъ всегда свободнымъ помощію
баллизамическихъ лиляль. Больной не долженъ
чрезвычайно предаваться домасѣдной и сидячей жи-

зни; припсѣмъ долженъ избѣгать сырыхъ, кислыхъ и соленыхъ яствъ. Еслии болѣной будетъ многокровенъ, или страдалъ прежде почечуемъ, которой послѣ того остагнулся; то въ такомъ случаѣ потребно пускать кровь дважды или трижды всякой годъ, что подлинно небезполезно учинено будетъ. Снаружи можно дѣлать приклады изъ нижеслѣдующихъ травъ, какъ то:

Изъ мяты	E mentha,
Пчельника или пчельной	Melissa,
травы,	

И другихъ чувствительножилыхъ, укрѣпляющихъ то есть чувствѣнныхъ жилы, прозябшей.

ГЛАВА IX.

О леченіи рвоты de curatione vomitus.

§ 857. Лечение рвоты (§ 429.) шуда каонится, чтобы во первыхъ унять судорожное желудка движеніе; потомъ очистить желудокъ отъ оспрой и ѣдкой влаги или другой посторонней раздражающей матеріи, и наконецъ, разслабленной укрѣпить желудокъ.

§ 858. Первому показанію (§ 857.) споспѣшествуютъ проптивосудорожныя и унимательныя (antispasmodica & paretica) лекарства. Какой есть нижеслѣдующій пріемъ.

Возьми воды мудрявой или нѣ- RC. Aque menthae суф-
жецкой мяты. рс.

Липовыхъ цвѣтовъ по 2 Flor. tiliaе aa unc. II.
унца.

Вишневой воды 1 унцъ. Cerafor. nigr. unc. I.

Ко-

Корицелой безъ вина при-
утовленной подунда.

Кашкирилового порошка.

Экстракта бобровой струи
по 3 грана.

Небеснаго еерѣяка 1 гранѣ.

Cinnamomi f. v. unc.
sem.

Pulver. cascarillæ.

Extract. caurei aa.
gr. III.

Theriac. caelest. gr. I.

Смѣшай и сдѣлай останавливающую рвоту микстуру,
которой давай по 1 ложкѣ до нѣлѣ порѣ, пока уй-
дется рвота.

Весьма также хорошо въ семъ случаѣ дѣй-
ствуетъ и противосудожное Риверсево лекар-
ство, котораго составъ есть сей :

Возьми соли изъ растѣній по-
лученной 1 золотникѣ.

RC. Sal. plantarum dr. 1.

Лимоннаго сока 1 унцѣ

Succi citri unc. 1.

Смѣшай и, по окончаніи ки-

Peracta effere tantiam

ненія, придай перегнатою

adde aquæ still. menthae

мятной воды 3 унца, смѣ-

unc. III. m. d. cochlear.

шай и давай всякѣ два

et omni bihorio.

часа по ложкѣ.

§ 859. Снаружи прикладывать должно пла-
стырь изъ хлѣбной корки и такамахаки или
камеди бальзамической толочи, съ неболь-
шимъ количествомъ камфоры и маслѣ мянна-
го и мушкатнаго. (empl. de crusta panis, de gumate
populi balsamiferæ cum paulullo camphoræ, olei que men-
thæ & nucis).

§ 860. Еслили будешь находишься въ же-
лудкѣ поспоронная острая или ѣдкая матерія;
то не вдругъ рвоту унимать должно; а если-
ли больной будешь многокровенъ, то надле-
житъ пустить кровь.

§ 861. Для укрѣпленія желудка съ пользою
употреблять можно ванны, мушкатной (рѣжѣ,
(pux moschata), мушкатные цвѣты (macis flores) и

по-

помертвевшую жорку. Бани или ванны составлялъ можно изъ душицы, и каменной и простой мяты (*Ex herbis origani, calaminthæ & menthæ*).

ГЛАВА X

О леченіи кровохарканія *de curatione hæmoptuæ*.

§ 862. Кровохарканія (§ 443 hæmoptuæ) лечительной способъ есть сей: то есть чтобы во-первыхъ упокоить чрезвычайное волнованіе крови; Потомъ опвесить къ низшимъ частямъ сильное и спремипельное оныя припеченіе къ легкимъ; Наконецъ сколько можно ослабое и поврежденное легкое укрѣпить и утвердить.

§ 863. Первое показаніе (§ 862) совершается учиненіемъ умѣренного и нѣсколько разъ повторяемаго изъ ноги кровопусканія. Послѣ чего должно давать весьма легкія слабительныя лекарства и спавить промывательныя. Внутри давалъ я съ великою пользою слѣдующую микспуру, составленную по есть:

Изъ воды подорожниковой.

Ex aqua plantaginis.

Веронишной.

Veronicæ

Грудной травы

Scabiosæ cum

Съ перегнаннымъ уксусомъ

Aceto dest. & corallis rubris; ex

и красными кораллами или
седмибратскою кровью;

изъ Гиацинтоваго порош-
ка и сиропа полевого
ману.

*Speciebus de hyacintho &
syropo rheoaddos.*

Великую такъ же приноситъ пользу въ леченіи кровохарканія и сіе лекарство:

Возьми воды землянишной,
Вишневоѣ по 3 унцѣ.

Сладкаго шиндзю.

Сѣмянни правы, называемой
костро пестро.

Сѣмянни бѣлаго маку по 2
золотника, смѣшай и сдѣ-
лай эмульсію. Послѣ при-
дай оленья рога безъ огня
приготовленнаго 2 скру-
пеля, или 40 гранѣ.

Перечищенной селистры пол-
золотника,

Канарскаго сахару 2 золо-
тника, смѣшай и давай по
ложкѣ всакиѣ три часа.

RC. Aquæ fragariæ,
Ceras. nigr. aa. unc.
III.

Amygdal. d.
Sem. cardui maris.

Papaver alb. aa.
dr. 2. m. f. emul-
sio. cui adde corn,
cerv. sine igne præ-
parati scrop. 2.

nitri depur. dr.
femis
sachari Conariensis
dr. II. m. d. coch-
lear omni tri-horio.

§ 864. Для предохраненія отъ кровохарканія
хорошо употреблять кашышки соспавленныя
изъ

Сгущеннаго сока солодкозато
корня.

Трагаканты или Кандійской
каведи.

Земли, называемой Катеху и
Копайскаго бальсаму.

E succo inspissato li-
quiritiæ.

Tragacantha.

Terra Catechu & Bal-
samo de Copaiva.

§ 865. Въмѣсто обыкновеннаго питія въ крово-
харканіи употребляемаго похваляется отваръ
приготовленной изъ:

Тамариндовой кашицы,

Подбѣла или бѣлокопитни-
ковыхъ листовъ.

Копытничковыхъ листовъ.

Бедренцовыхъ или тысяче-
листныхъ верхушекъ.

Ex pulpa tamarinden-
rum.

Fol. tussilaginis.

Hederæ terrestris.
Summat. millefolii.

Корня

Корня лошакова уха
и сѣмянъ бѣлаго мака.

Radice symphiti
Et sem. papaveris albi.

§ 866. Если сосуды не весьма раздупы
бываютъ, когда то есть бѣшеніе жилъ никакого
очевиднаго не показываетъ многокресія; то въ
такомъ случай недолжно пускать крови, коль-
ми паче повторяя кровопусканіе. Ибо такимъ
образомъ не можно истребить густоты въ кро-
ви, но напротивъ того кровь приводится въ
слабость. Недолжно также спавить пиявицъ,
развѣ когда боли въ крестцѣ и проходѣ ощу-
щаются будущъ. Изъ желѣза приготавливаемыхъ
лекарствъ никогда не должно давать до тѣхъ
поръ, пока не пройдетъ и не уймется жесто-
кость судорогъ и сведеній, также и тогда ко-
гда опасность бываетъ, чтобы не учинился въ
какой нибудь внутренности запоръ, или когда
первыя пуши еще подлежащимъ не очищены
образомъ.

ГЛАВА XI.

О леченіи кровавой харкотины de curatione fructu stupri.

§ 867. Кровавая, съ кровью то есть смѣ-
шенная харкотина (§ 444), пользуется помо-
щію легкихъ слабительныхъ и остроту припу-
пляющихъ, усладительными называемыхъ, ле-
карствъ, каковы суть: масло сладкаго мин-
далю, житовъ мозгъ (fregma ceti), и кроволу-
сканіе,

сканіе ; естѣли только слабое бленіе жилъ про-
тивнаго тому означать не будетъ.

ГЛАВА XII.

О леченіи слинотеченія *d: curatione
ptyalism.*

§ 868. Слинотеченіе (§ 447) пользуется
сильными проносными лекарствнами. Также спу-
днями, пасоку очищающими, и кровочиститель-
ными отварами, приготовляемыми изъ :

Корня бѣлаго приминелла	<i>E rad. ce pimpinellæ</i>
или бедренца.	<i>albæ.</i>
Пирейника.	<i>Radice graminis.</i>
Мыльной травы.	<i>Saporatæ &</i>
Ангелской сладости, и ско-	<i>Polypodii cum casaga</i>
бокъ или стружекъ са аф-	<i>ligni sassafras.</i>
роватаго дерева.	

ГЛАВА XIII.

О леченіи отрыжки *de curatione rictus.*

§ 869. Отрыжки (§ 448) по большей части
происходятъ отъ поврежденнаго пищеваженія и
худаго выработыванія питательнаго сока. Поче-
му пользуются оныя испражнительными и же-
лудокъ и кишки укрѣпляющими лекарствнами.

ГЛАВА XIV.

О леченіи чрезвычайнаго потѣнія или по-
та, *de curatione nimii sudoris.*

§ 870. Великой потъ или потѣніе (§ 449)
пользуется легко вязательными внутрь употре-
бляемы-

бляемыми лекарствами, а снаружи обмываніемъ пѣла холодною водою и пѣлеснымъ покоемъ; но естѣлибы находилось много крови въ больномъ, то въ такомъ случаѣ должно пустить кровь.

ГЛАВА XV.

О леченіи насморка *de curatione catharrhi.*

§ 871. Въ насморкѣ (§ 450), всегда подозрѣваема бываетъ клейкая вязкость на первыхъ пупяхъ находящаяся; почему прежде всего должно послабить желудокъ, а послѣ употреблять грудныя лекарства. Естѣли больной по примѣтамъ будетъ многокровенъ, то должно не опіимѣнно пустить кровь изъ ноги или руки.

ГЛАВА XVI.

О леченіи мокротнаго поноса или мыта *de curatione diarrhoeæ.*

§ 872. Мытъ или мокротной поносъ (§ 451) лечится помощію лекарствъ слегка слаблящихъ желудокъ, также болеутолительными лекарствами, поставленіемъ промывательныхъ и кровопусканіями.

§ 873. Для выведенія слизи на первыхъ пупяхъ находящейся доволенъ бываетъ одинъ ревенъ, а вмѣсто ушолительнаго лекарства можно употреблять утолительныя *Зиденгамовы жалли* (*lavd. liquid. Sydenham*), которыя по вечерамъ давать должно. Снаружи употреблять мо-

можно промывательныя , приготовляемыя изъ :

Листовъ лошакова уха ,	E fol. consolidæ majoris.
Цветовъ красной розы и	Flor. rosar. rubr. & fe-
квитовыхъ сѣмянъ.	min. cydoniorum.

§ 874. Я примѣнилъ въ практикѣ моей при пользованіи мокротныхъ поносовъ великое дѣйствіе рвотнаго лекарства, кровопусканія и каттышекъ составленныхъ изъ :

Экстракта каскариллового	Ex extract. cascariillæ.
Изъ пиквой гумми или	Gummi mastich.
камеди.	

Едальской гумми.	Gummi bdel.
Трагаканты и небольшо-	Gummi tragacanth.
го количества кайфору.	com panchillo camp-
	horæ.

§ 875. Въ леченіи мыта недолжно употреблять вязательныхъ лекарствъ; также олія или сылительнаго сгущеннаго изъ мажовыхъ головокъ сока и лилюльной массы изъ лѣтъ языка приуготовленной. (massa p. de cynoglossa).

ГЛАВА XVII.

О леченіи сильного моченоченія или незадержанія мочи de curatione diabetis.

§ 876. Въ незадержаніи мочи (§ 452.) съ пользою употребляются утолительныя и крѣпительныя лекарства. Весьма хорошее дѣйствіе видѣлъ я въ леченіи мочетеченія кашинцы или элекпуарія , приготовленнаго

Изъ Андромехова верѣака.	E theriaca Andromachi.
Фракастеріева элекпуарія,	Diafcardio Fracasterii.
дѣаскордіумъ называемаго.	

Часть V.

В

Их.

Имбиря.

Zingibere.

Мушкатнаго орѣха.

Nuce moschata.

Арильской глины съ консер- Bolo Armena cum
вою померанджевыхъ верхнихъ conserva flaved. cort.
корокъ и розовымъ сиропомъ aurant. & syrop. rosatum

§ 877. Для укрѣпленія ослаблыхъ частей я
предписывалъ лекарственное вино, которое я на-
спивалъ съ :

Кашкарылловою коркою.

Vinum e cortice cas-
carillæ.

Перуанскою коркою.

Peruvian.

Листами бѣлой шанты и
наменкой мяшк.

Fol. marrubii albi &
Calaminthæ vulgaris.

§ 878. Въ леченіи мочеиспеченія надлежитъ
избѣгать всякихъ слабительныхъ лекарствъ,
кровопусканій, поповыхъ лекарствъ и водяныхъ
пищевъ. вмѣсто же обыкновеннаго пищи над-
лежитъ употреблять хорошее вино съ чистою
водою, или одно, что какъ кажется большую
приноситъ пользу.

ГЛАВА XVIII.

О леченіи ѣственесвареннаго поноса de
curatione lientericæ.

§ 879. Ёственесваренной поносъ (§ 460) ле-
чится пропускными, разбивающими то есть
всякія засоренія и запоры, лекарствами, каковы
суть :

Бальсамическія Гофманскія капли отъ жи-
вота, Минзихтсвы кулоросныя капли (elixir
vitæoli Mynsichti) и есъ горькія и бальсамическія
лекарства.

ГЛАВА

ГЛАВА XIX.

О леченіи женской бѣли de curatione
fluoris albi.

§ 880. Женская бѣль (§ 452) пользуется какъ испражнительными и пошowymi лекарствами; такъ и кровочистительными отварами и прочая. А особливо тогда, когда припадокъ сей будетъ происходить отъ худой и ядовитой матеріи.

§ 881. Къ испражнительнымъ въ семъ припадкѣ употребляемымъ лекарствамъ принадлежатъ:
Проносной экстрактъ Кроу- Extract. panchymagog-
евъ. Crollii.

Магистерій или порошокъ изъ ладанъ, Magisterium jalappæ.

Избранной смирны Myrrhæ electæ

И сладкой ртути приго- Et mercurii dulcis
товленной.

Потъ производитъ отваръ изъ:

Спруженъ или скобокъ Гвайяко- Decoctum e rasura

ваго или бакаутоваго дерева, ling. gvajaci.

Корни мыльной травы. Rad. saponariæ.

Пилпичелла или бѣлаго седренца. Rad. pimpinel. alb.

Нарычняка. Rad. scrophulariæ.

Лимоны и корки и изю- Com cort. citri & pas-
му. sulis.

Кровь очищаютъ и исправляютъ пилюли со-
ставленные изъ:

Гвайковой смолы, E resina gvajaci.

Чертополоховога экстракта, Extract. card. benedict.

Сабуроваго экстракта, Extract. aloes.

Сладкой ртути и Mercurii dulc. &.

густога санидара изъ дис- Therebinthina veneta.
твенницы полученнаго.

ГЛАВА XIX.

О леченіи доброй или неядовитой грыжи или гонореи de curatione gonorrhææ benignæ

§ 882. Доброй или благой грыжи (§ 464) лечение производится такъ: спервыхъ надлежитъ вывести изъ тѣла нечистую пасоку, а послѣ укрѣпить разслабленные части.

§ 883. Нечистую пасоку изъ тѣла выводятъ слабительныя лекарства и отваръ изъ сарсапарилла, гваяковаго дерева и репейнаго корня приготовленной; также ниже слѣдующее лекарство:

Возьми варенаго, послѣ перетон- RC. Therebinth. coct. dr.

ки шо естъ ошываго, шер-
пейника 3 золотника.

III.

Слизь Арапской кашеи
полунца.

Mucilag. g. Arabic.
unc. sem.

Воды бузиновыхъ цвѣтовъ
4 унца.

Aqv. flor. fabur.
unc. IV.

Просфирняковаго ферпелёса
сиропа 1 унцъ.

Syr. dealthea F.
unc. i.

Смѣшай и давай по болѣшой
ложкѣ всякъ три часа, ка-
кое лекарство и повтораешь
и жно.

M. d. cochl. sing.
tribus horis. quod me-
dicamentum etiam re-
peti potest.

Укрѣпляютъ разслабленные части:

Гиацинтовой порошокъ,

Species de hyacintho

Протогипокритенные красные ко-
рени и каракатицыны кости.

Coral. rubr. preparata
& ossa sepiæ.

Но слѣдующій приемъ почти всѣ прочіе пре-
восходитъ:

Возьми желѣзныхъ незаржавѣ-
лыхъ опилокъ.

RC. limatur. ferri non
ruginati.

Перуанской корки и
Корицы.

Cort. Peruvani &
Cinnamomi.

Вин.

Винтеранской корки по
показанію лирика.

Смѣшай и сдѣлай порошокъ,
которъ ѿ нalley хорошимъ Ав-
спрѣйскимъ виномъ, взявъ она-
го фунта двѣ, поставь въ
легкой духъ на 24 часа, послѣ
слей нас койку и дай по лож-
кѣ трижды въ день, умножая
прѣмъ постепенно.

Winter. aa unc.
femis.

M. f. pulvis. infunde
vino austriaco gene-
roso per 24 horas
col. d. rer de die
cochlear. sepius au-
gendo dosim.

ГЛАВА XX.

О леченіи злой или ядовитой гонорей и
сестхъ отсюда происходящихъ худыхъ
сладствій de curatione gonorrhoeae malignae
omnium que inde provenientium malorum conseq-
uentiarum.

§ 984. Злой и заразительной или ядовитой
грѣжи (§ 465) леченіе ссшопиѣ въ томъ,
чтобы въ первыхъ выгнать любострастной и за-
разительной ядъ изъ тѣла, и очистишь кровь
уже зараженную онымъ ядомъ. Наконецъ, что-
бы укрѣпить разслабленныя части.

§ 985. Первому показанію удовлетворяютъ
проносныя лекарства со сладкою ртутью смѣ-
шанныя, на пр: сѣи кашышки:

Возьми самаго лучшаго ревеня з RC. Rhei. opt. dr II.
золотника.

Гваяковой смолы 1 золот-
никъ сѣ половиною.

Сладкой ртутіи 10 грантъ,
сдѣлай сѣ доволнымъ ко-
личествомъ Венеціанскаго

Resin. gvajac. dr. I.
& semis.

Mercur d. gr. X-
c. f. q. there int-
hinæ v. f. p. f-

терпентина катышши вѣ-
сомъ вѣ 3 грана, и давай по
3 прижды вѣ день.

gr. III. d. tres. ter
de die.

Второму показанію удовлетворяютъ кровочи-
стительные отвары приготовленные изъ:

Корней лимонелла или совей
стрѣлы.

Decoct. e radicibus pim-
pinellæ albæ.

Мыльной травы.

saponariæ.

Пирейника.

Graminis.

Антельской салдоности со
снотками корня саса-
фровата дерева и морю-
вымъ сѣмянемъ. или
изъ корней сарсанарилла.

Polypodii cum rasura
cort. lig. sassafras &
femin. davci. vel e

Жины.

radicibus sarsaparillæ.

Папоротника и

Chinæ, &

Фйилки съ коркою твая-
новаго дерева.

filicis.
Irid. florentin. cum
cort. lig. gvaiaçi.

§ 886. Къ укрѣпленію ослабыхъ частей хо-
рошо употребляють лекарствъ приготовленные
изъ:

Венецѣанскаго терпентина,

E terebinthina Veneta,

Яншаря,

Succino.

Маслики.

Mastiche.

Кашкаралачаго экстракта,

Extracto cascarillæ

Смолы Гваяковаго дерева и
жопайскаго бальсана.

Refin. gvaiaçi & bals.
de copajva.

§ 887. Когда же сіи лекарствъ недовольны
будутъ, то надлежитъ употреблять такія,
которыя первыхъ суть крѣпче, каковы на пр.
могутъ быть приготовлены изъ:

Вязательной желѣзной ржавчи-
ны или известии.

E croco m. ad.
string.

Олибана.

Ex olibano.

Масляни.

Mastyche.

Арабской гумми.

G. Arabico.

Каракашцыныхъ костей.

Off. færiæ.

Кори-

Корицеваго масла.

Ol. cinnamomi.

Мятнаго масла и

Ol. menthae &

Кипрекаго терпентина.

Therebinthina Cyprica.

Хорошо также употреблять крѣпительныя капли фалкеевы крупѣ съ копайскимъ бальсамомъ (tinctura tonica Falci cum balsamo de copaiva).

§ 888. Для оспановленія сѣмяннаго теченія употреблялъ я съ весьма хорошимъ успѣхомъ слѣдующія лекарства, и во первыхъ въ видѣ кашицы:

Возьми консервы или приправы RC. Conservæ flor. tunicæ гвоздичныхъ цвѣтѣвъ.

Лимоннаго мякиша по 3 Pulpæ citri aa. dr. V. золотничковъ.

Квитовой корки 3 золотничка. Cort. cydon. dr. III.

Малиноваго взару или морсу 3 золотничка. Rob. rubi idei dr. II.

Неполнаго алкериссова конфекта полтора золотничка. Conf. alkernes in completæ dr. I. & semis.

Смѣшай и давай по ложкѣ нѣсколько разъ въ день. M. d. cochleare aliquoties de die.

Въ видѣ кашышковъ:

Возьми сгущеннаго сока изъ вязнаго корня 1 золотничковъ. RC. extract. tormentillæ dr. I.

Венеціанскаго терпентина ползолотничка. Terebinthinæ Venet. dr. semis.

Небеснаго сирѣпка 10 гранъ. Theriacæ coelest. gr. X.

Смѣшай, слѣдай съ запламя Японской земли кашышки рѣсомъ въ 3 грана, и давай по 3 чемырежды въ день. M. f. p. c. tinctur. terræ catechu p. gr. III. d. tres quater de die.

или

five

Возьми Японской земли, кашеху именуемой.

RC. terræ Japonicæ five catechu.

Избранной смирны.

Ладакиной гумми по пол-
тора золотника.

Кашкарыдлового экстракта
и золотникъ.

Камфары 10 гранъ.

Смѣшай, сдѣлай съ рас-
пущенною трагакантою
напышки въсомъ въ 3
грана и давай по 4 тра-
жды въ день.

§ 889. Для укрощенія воспаления и ушоленія
жару, при испускании мочи ошунцаемаго, я давалъ
съ великою пользою слѣдующую эмульсію :

Возьми дынныхъ сѣмянъ 1 унцъ. RC. Semin. melon. unc. I.
Сѣмянъ бѣлаго маку 2 золо-
тника. Sem. pap. alb. dr. II.

и 6 сладкихъ очищенныхъ
миндалинь.

Личной воды полтора фунта.

Сдѣлай эмульсію, и послѣ при-
дай надлежащее количество
леденца, и давай по 2 ложкѣ
всякѣе 2 часа.

Возьми сѣмянъ бѣлаго маку 2
золотника.

Салашты

Сонцовой сестры по одно-
му золотнику.

6 сладкихъ очищенныхъ мин-
далинь.

Столчи, и налей маковою,
маковыхъ по естѣй цѣлоны,
водою, взей оной 6 унцовъ,
да одинъ унцъ кувшичковой
воды.

Myrrhae electae

G. olibani aa dr. I &
femis.

Extract. cascarillae dr.
I.

Camphorae scrupul. fe-
mis.

M. l. p. cum tragantha
soluta p. gr. III. d. IV.
ter. de die.

Amygdal. d. ex cort.
n. XII.

Aqv. hordei libr. I &
femis.

F. emulsio. cui adde
fichari crystallini q.
s. d. duo cochlearia
omni bihorio.

sive

RC. papaveris albi unc II.

Lactucæ.

Endiviæ aa unc. I.

Amygal. d. excort.
n. VI.

Contunde & infunde
aq. flor. p. albi unc.
VI. & nympheæ unc.
I.

Сдѣлай

Сдѣлай молоко, послѣ придай
изюмоваго сиропа ползолотника
и давай по ложкѣ часто.

F. emulso, cui adde
syrup. diacodii dr. f.
d. c. saepius.

§ 890. Снаружи должно прикладывавать къ дѣ-
породному члену мѣшечки, составленные изъ:

Мягкихъ листовъ.

E. fol. menthae.

Ромашковыхъ цвѣтотъ.

Flor. chamomillae.

Лавровыхъ и вишневыхъ
цвѣтотъ.

Lavri & balauitiorum.

Масляни и

Mastiche &

Гвоздики, опваренныхъ въ
красномъ винѣ.

Caryophyllis, in vino
rubro coctis.

§ 891. Еслили рана дѣпороднаго члена увели-
чиваться будетъ, то должно дѣлать примочку
изъ и есеной и розовой воды, заживитель-
ной воды l'eau d'arquebuse называемой; также
изъ воды придорожниковой екулъ со свино-
вымъ сахаромъ и осажденною бѣлою ртутью.

§ 892. Еслили рана будетъ находится въ
самомъ дѣпородномъ удѣ, то есть въ спивотѣ,
то должно предписывать базиликонскую мазь
екулъ съ мазью табашною (unguentum basiliconis
cum ungueto nicotianae), или Египетскую мазь съ
розвою водою, либо Пленкою ртутной ра-
створъ екулъ съ молокомъ.

§ 893. Еслили сдѣлаются какіе либо бугры
и колючія шипки (torhi), то должно прикла-
дывать къ онымъ пластырь составной изъ:

Нашатырной камеди.

Empl. de amm. gummi.

Смирны.

Myrrha.

Опипопонакса.

Opoponace.

Кипова мозга.

Spermate seti.

Сѣрнаго съ терпентин-
номъ прѣготовленнаго

Бальсама

Виннокаменнаго вонючаго
масла и воска.

Balsamo sulphuris
therebinthinato.

Oleo tartari fetido &
resina.

§ 894. При многокровіи можно пускать кровь больному, только бы отъ того не ослабѣли силы больного. Но естли прежде будущѣ очищены первыя пищевапроходныя пути, то въ такомъ случаѣ кровопусканіе мало приноситъ пользы. Къ опухлымъ яграмъ должно дѣлать припарки изъ разбивательныхъ веществъ; такъ же банить оныя опваромъ изъ ромашковыхъ и проскурняковыхъ цвѣтовъ и лямаря, какія вещества должно опварить въ водѣ смѣшанной съ небольшимъ количествомъ уксуса.

§ 895. Естли ядовитая гонорея преждевременно остановлена будетъ, то вдругъ должно предписывать проносныя лекарства, давать рвотныя, легкія потовыя и противосудорожныя лекарства. Впрочемъ съ осторожностію поступать должно со свинц.вою известью, сахаромъ обыкновенно, называемою.

ГЛАВА XXI.

О предохраненіи отъ выкидыша de præservatione ab abortu.

§ 896. Отъ выкидыша (§ 469.) предохранять должно кровопусканіями изъ руки; противосудорожными лекарствами и поспавленіемъ промывательныхъ лекарствъ; ибо такимъ образомъ

зомъ можно отвратить разныя скопленія къ
маткѣ и предохранить дѣтское мѣсто отъ
опшнорженія онаго отъ матки. Но естли бу-
детъ ощущаема чрезвычайная боль въ поясницѣ,
младенецъ или зародышъ будетъ двигаться въ
маткѣ, разорвутся зародышевы сорочки и воды
сойдутъ изъ оныхъ вонъ; по въ такомъ случаѣ
все раченіе свое должно обращать туды, чтобы,
естли сама натура не довольна будетъ къ
учиненію добра, вынявъ младенца изъ утробы
вонъ, помощію искусства въ семъ случаѣ упо-
требляемого.

§ 897. Кровь пускашь должно, смотря по раз-
личію многокротія, возраста и силъ больныя изъ
руки. Къ усполяющимъ судороги лекарствамъ
принадлежащъ:

Противосудорожный	Штадель	<i>Pulvis antispasmodicus</i>
порошокъ.		<i>Stalij.</i>
Бобровая струя съ против-		<i>Castoreum cum antispa-</i>
судорожными перегнатыми		<i>smodicis destillatis aquis &</i>
водами и сиропомъ бѣлаго		<i>syngppo papaveris albi.</i>
ману		

§ 898. Естли у больной будутъ жаръ и
жажда; по хорошо употреблять слѣдующія
лекарства:

Возьми ячной воды 1 фунтъ.	<i>RC. aq. hordei libr. I.</i>
Вишневого сиропа	<i>Syr. ceras. nigr.</i>
Малинового сиропа.	<i>rubi idej,</i>
Сиропа изъ гвоздичныхъ	<i>Flor. tunicæ aa unc. I.</i>
цѣтокъ или травы во-	
стро пестро называемой	
по 1 унцу.	
Купоросной кислоты 10	<i>Spirit vitrioli gutt. X.</i>
капель, смѣшай и давай	<i>m. d. cochleatim.</i>
по ложкѣ.	Возь-

Возьми вишневоѣ воды 6 ун-
цовъ.

Корицневоѣ съ квинта-
ни приготовденноѣ
полшара унца.

Сиропъ лимоннаго со-
ка.

Малиновоѣ

Цвѣтновъ дикаго яблѣу ,
сѣѣшай и давай по ло-
жкѣ часто.

RC. aq. ceras. nigr.
unc. VI.

Cinnamoni cydoniat.
unc. I & semis.

Syr. de acetos. citri

Rubi idei.

Flor. papav. Rhoead-
dos m. d. cochica-
tim sæpius.

§ 899. Промысательныя составлять мо-
жно изъ корней.

Проскурияка и

Лошакова уха.

Попутиниковыхъ листовъ.

Ромашковыхъ цвѣтновъ.

цвѣтновъ медвежья уха

или царской сѣчи , и цвѣ-
тновъ красной розы.

eradicibus althææ &

Consolidæ majoris,
herbæ plantag.

Flor chamomil.

verbasci & rosarum

rubrarum.

§ 900. Что касается до вязательныхъ и го-
рячительныхъ крѣпительныхъ лекарствъ , то
оныхъ употреблять не должно , пока кровь на-
длежащимъ образомъ очищена не будетъ.

ГЛАВА XXII.

О леченіи преизбыточества молока въ
груди de curatione abundantiae lactis in mam-
mis.

§ 901. Преизбыточество молока (§ 452) ле-
чится слабительными лекарствами и кровопу-
сканіями.

ГЛАВА XXIII.

О леченіи чрезвычайнаго теченія мѣсячныхъ кровей у женщинъ, de curatione nimii fluxus mensium.

§ 902. Чрезвычайное мѣсячныхъ кровей теченіе (§ 453) лечится кровопусканіями изъ руки производимыми, прописывосудорожными изъ соборовой струи пригипсованными лекарствами, и наконецъ употребленіемъ крѣпительныхъ лекарствъ, каковъ есть елексуаріи, или кашица составленная изъ:

Делешекъ пригипсованныхъ изъ	E trochiscis de terra le-
лешинской глины или пе-	mpia.
чапной земли.	
Померанцевыхъ корокъ.	Cort. aurant.
Приготовленныхъ коралковъ.	Corall. rubr. præparat.
Змѣиной крови.	Sang. draconis.
Розовой консервы и квитова-	Conservæ rosar. & sy-
го сиропа.	rop. cydoniorum.

§ 903. Похваляется также въ семъ случаѣ и порошокъ *Геаргіевъ*, котораго составъ есть слѣдующій:

Возьми сѣмянъ бѣдой блекоты.	Rc. Sem. hyosciami.
Бѣлаго маку по 1 золот-	paravcr. alb. aa. dr. I.
нику.	
Кровавика.	Lapid. hæmatit.
Красныхъ прѣготовленныхъ	Corall. rubr. præparat.
коралковъ по ползолотника.	aa. dr. semis.
Перечищенной селитры 20	Nitri d. scrupul. I.
гранъ.	
Камфоры 6 гранъ.	Camphoræ gr. VI.
Смѣшай, раздѣли на 7 час-	M. d. in VII partes
тей равныхъ, и давай приж-	æquales d. ter de die
ды въ день по порошокъ.	pulvis.

§ 904. Снаружи должно дѣлать припарки составленные изъ придорожниковыхъ, слорышевыхъ и жемчужныхъ листовъ, опваривъ оныя въ розовомъ уксусѣ, которыя должно прикладывать къ наддѣшпородной части, когда нѣсколько простынутъ.

§ 905. Еслили у больной силы ослабѣли или много крови пролилось изъ тѣла, то въ такомъ случаѣ крови пускать не должно. Надлежитъ также избѣгать сильныхъ вяззательныхъ лекарствъ, и теплыхъ водъ или горячихъ ваннъ.

Впрочемъ еслили будетъ у больной кожа сухая, и слѣдственно остановившаяся испарина; то въ семъ случаѣ умѣренно теплыя ванны могутъ имѣть свою пользу.

Мѣсячныя крови иногда очень рано, а иногда очень поздно начинающся и оканчивающся. Раннее печеніе мѣсячныхъ кровей располагаетъ больную къ чахоткѣ, а еслили оное долѣе надлежащаго продолжится времени, болѣе то есть 30 лѣтъ отъ начатія своего, то причиняетъ водяную болѣзнь. Почему всѣ мѣры употреблять должно, дабы такой непорядокъ исправить и спрадалицу сохранить отъ ея бѣдствій.

ГЛАВА XXIV.

О леченіи чрезвычайнаго кровоочищенія
женщинъ *de curatione nimii fluxus lochiorum.*

§ 906. Неполнѣнное кровоочищеніе
(§ 455), которое узнается изъ сокращенія и
умаленія силъ, боли оцупцаемой въ подвздош-
ныхъ частяхъ, скупившейся крови, вытекающей
изъ дѣпородныхъ частей, обмороковъ и слабого
и скорого біенія жилъ, умѣряется и остано-
вливается сгущающими влаги и укрѣпляющими
шѣло лекарспвами.

§ 907. И такъ къ умѣренію онаго печенія мо-
жно давать:

Порошокъ изъ кашарылла
Бобровой струи
И разноросного гіацин-
товыхъ называемаго вкупѣ
съ мушкатныймъ масломъ.

*Polv. cascarillæ.
Castorei &
Speciei de hyacintho
cum oleo muscatæ.*

или

Экстрактъ изъ звязнаго корня.
съ разнороснымъ гіацинто-
вымъ порошкомъ и двумя грана-
ми небеснаго еерілка.

*five
Extr. tormentillæ,
sp. de hyacintho
cum duabus. granis
theriacæ celest.*

§ 908. Къ ноздрямъ прикладывать можно.

Галбанову камедь.

Gum. galbani.

Дурной духъ и

*Asa foetida & casto-
reum cum*

Бобровую струю съ лепучею
янтарною содыю,

S. electri volatil.

Можно также давать нюхать и прикладывать
къ вискамъ тинктуру бобровой струи.

§ 909. Въ чрезвычайномъ печеніи кровей быва-
ющихъ послѣ родовъ, не должно предписывать

ле-

лекарствъ, приводящихъ кровь въ сильное движеніе. Ибо въ семъ случаѣ о родильницахъ такъ судить должно, какъ бы онѣ были уязвлены. Также не должно давать и слабительныхъ наипаче сильныхъ лекарствъ. Но если случится запоръ, то должно лучше снавить промывательныя.

Если остановится сіе кровоочищеніе и причинитъ въ какой либо части тѣла скопленіе крови и сильную инфламмацію; то въ такомъ случаѣ должно смотрѣть, чтобы, если сіе происходитъ будетъ отъ многокровія, пустить кровь изъ ноги, спавить ноги въ теплую воду, давать селитру въ ячномъ опварѣ и спавить пиявицы къ дѣшроднымъ частямъ. Если же причиною сему будутъ судороги, то давать олій; а если расслабленность какая либо, то употреблять постоянно во духъ (aë fixus) такимъ образомъ, чтобы съ распущеніемъ щелочной соли смѣшивать вкупѣ и массу для бальзамическихъ пилюль, дабы такимъ образомъ псмянутой воздухъ могъ доходить до сихъ низкихъ частей тѣла

ГЛАВА XXV.

О леченіи кровотеченій *de curatione hæmorrhagiarum.*

§ 910. Кровотеченія (§ 457) лечатся кровопусканіями холодительными и легкими слабитель-

щельными лекарствами, также нарывными пластырями, къ яшкамъ прикладываемыми.

ГЛАВА XXVI.

О леченіи чрезвычайнаго гемороя или почечуя de curatione nimii fluxus hæmorrhoidali.

§ 911. Чрезвычайногеморойное теченіе (§ 458), еслили больные бываютъ многокровны, пользуется пусканіемъ крови изъ руки; а еслили оное происходитъ отъ разслабленности внутреннихъ, то крѣпительными лекарствами. Кровопусканіе можно повторять и нѣсколько разъ, смотря по состоянію силъ и крѣпости больного.

§ 912. Для укрѣпленія разслабленныхъ внутреннихъ хорошо употреблять лекарство. составленное изъ:

Сгущеннаго кашкарыллового сока	Medicament. de extracto
или экстракта.	cascarillæ.
Бобровой струи.	Castoreo.
Земли патеху.	Terra catechu.
Стальныхъ опилокъ.	Limatur. chalib.
Сиропа изъ цитроннаго сока	Syr. de succo citri.
приготовленнаго.	

§ 913. Снаружи употреблять должно приклады, приготовленные изъ:

Травы придорожника.	Ex herba plantag.
Мяты.	Menthæ.
Зѣрбосемянхъ цвѣтовъ.	Flor hyperici.
Маслики.	Mastiche.
Хинской и кашкарылловои	Cort. chinæ & casca-
корокъ съ краснымъ виномъ	rillæ in vino rubro
отваренныхъ.	decoctis.

Часть V.

Г

Впро-

Впрочемъ должно знать, что умѣренное Геморройное теченіе очищаетъ кровь и другія неудобоблагодѣтельные пользуется болѣзни, на пр. *меланхолическая* (melancholia), и такъ называемую сухую водяную брюшную болѣзнь, иначе еще *барабаннымъ звономъ* называемую (tympanitis). Почему въ такихъ случаяхъ ставить промывывательныя, изъ лютнаго воздуха приготавливаемыя, весьма нужно и полезно.

ГЛАВА XXVI.

О леченіи натуженія при испраженіи
или частаго позыва на судно *de*
citatione tenefmi.

§ 914. Натуженіе при испраженіи бываемое, иначе *позывамъ на судно* (§ 474) называемое, пользуется весьма легкими слабительными лекарствами. Если же причиною онаго будутъ черви; то должно къ слабительнымъ лекарствамъ примѣшивать иѣкоторое количество и сладкой ртути, (mercurius dulcis). Если опъ тѣдой и острой матеріи будетъ происходить натуженіе или силеніе, какъ-то случается въ кровавомъ поносѣ (§ 656); то должно предписывать остроуму унимающія, *успокоительными* называемыя, лекарства, и употреблять промывательныя, приготавливаемыя изъ:

Сѣмянъ бѣлаго мака.

Яичнаго и мушкетерскаго масла.

ex herbis emollientibus.

S. paracet. alb.

Ex oleo ovorum & piscis.

Или

Или употреблять снаружи
Мазь, изъ жевотной слизи и личнаго жел-
тка пригопвленной.

ГЛАВА XXVIII.

О леченіи рѣза во вздохихъ или боли во
вздошной кишкѣ de curatione ilei.

§ 915. Подвздошнокишечная боль или рѣзъ
во вздохѣхъ и животѣ (§ 476), лечится кро-
вопусканіемъ и впервыхъ съ самаго начала во-
спаленія въ желудкѣ, которое можно повпорять
и нѣсколько разъ, смотря по состоянію боль-
наго. Также постановленіемъ промывательныхъ
лекарствъ и ваннъ. Снаружи должно дѣлать
припарки; крайнее же средство въ семъ случаѣ
есть ртуть, которая, очистивши хорошо,
можно давать до одного или двухъ унцовъ,
что тогда только исполнить можно, когда
кишки еще неповреждены; въ опощивомъ слу-
чаѣ ртуть можеть пробавить кишки *). Впро-
чемъ хорошо употреблять слѣдующее промы-
вательное лекарство:

Возьми рупной травы : RC. herb. ruthæ m. l.

горсть.

Т.бачныхъ листовъ : унцъ. Fol. peti. m. l.

Лиственный губки : во- Agaric. dr. l.
лошникъ.

Смѣшай и отварь въ про- M. coq. in aq. simpl.
стой водѣ, взявъ оной : lib. l. colat. depurat.
фунтъ; послѣ процѣди
и придай горной соли. adde.

Грецкаго мыла по 3 золо- Sal. gemmæ.
тника.

Saponis Venet. aa dr.

III.

Горькой стабильной кашицы,
называемой гѣра пикрі,

Вареннаго укрепитнаго масла по
1 золотнику.

См и пошавь.

Elest. hieræ picæ.

Olei anethi cocti aa
unc. I.

M. infundatur.

- а) Здѣсь сочинитель похваляетъ употребленіе ртутти въ такомъ смыслѣ, когда описываемой здѣсь болѣзни причиною бывающъ вложденіе нижней кишки въ вышнюю, или когда одна такая кишка подается въ верхъ и т.д., что опъ того испражняемая матерія не можеть проходить въ проходу.

ГЛАВА. XXIX.

О леченіи припадковъ мочепроходныхъ
лутей de curatione viarum urinariarum.

§ 916. Припадки мочепроходныхъ лутей, таковы суть: трудное мочеиспущеніе (§ 478), и проч. лечатся кровопусканіями, растворяющими и унимающими остроту лекарствами, банями и хорошо діею.

§ 917. Къ унимающимъ остроту лекарствамъ припадають смягчительныя и прохладительныя смулагси или молоки; масло сладкаго миндаля, и масла яичное, деревянное и льняное. Снаружи полезно упшрелять чувствительныя и крѣпительныя лекарства, прикладываемыя къ наддѣтородной части.

§ 918. Еслили будетъ причиною зла камышекъ, находящійся въ мочевомъ пузырьѣ; то въ такомъ случаѣ болѣзнаго безъ операціи, безъ вырѣзанія то есть камня, ползовать не можно.

Однако

Однѣко Наванаилъ Гуамъ, послѣ учиненія многихъ опытовъ, узналъ, что камень можно разбить и вывести изъ пѣла вонъ помощію постояннаго воздуха; почему и совѣлустъ въ леченіи опъ оного употреблять постоянною в воздухъ, такимъ образомъ, чпобы оный производимъ былъ въ желудкѣ, что слѣдующимъ совершася образомъ:

Возьми перетищенной виннокаменной соли 2 золотника, разпусти въ перчатой водѣ, взявъ оной 12 унцозъ, и дай, ознаивъ 1 номеромъ.

Потомъ должно изслѣдывать, сколькобы потребно было купоросной чистой кислоты для насыщенія 2 золотниковъ оной виннокаменной соли? что узнавъ, также должно смѣшивать съ 12 унцами чистой воды, и запечатать 2 номеромъ.

Послѣ должно дать изъ перваго номера одинъ унцъ воды, а потомъ вдругъ изъ втораго равное же количество, что должно всякой часъ, или всякіе 2 часа повторять. Опъ чего воздухъ, освободившись такъ скакать опъ своихъ оковъ, будетъ дѣйствовать на мочеисходныя пупы и мочевой пузырь, возбудитъ въ нихъ раздражимость, и такимъ образомъ много учинитъ сплѣществованія къ изверженію вонъ хряща и каменныхъ отсломокъ. Ибо извѣстно, что постоянный воздухъ разводитъ и разрушаетъ вязкость, соединяющую известныя мочевого камня

составныя части, и, дѣйствуя вышепоказаннымъ образомъ на пузырь, споспѣшествуютъ разбитію и изверженію камня. *Пространнѣе о семъ смотрѣть должно въ особинномъ сочиненіи томля нутаго сочинителя, известномъ подъ названіемъ, новой способъ лечить каменную болѣзнь, которой и на русской уже переведенъ и напечатанъ.*

ГЛАВА XXX.

О леченіи подвздошной болѣзни, или илохондріи de curatione mali hypochondriaci.

§ 919. Илохондрія или подвздошная болѣзнь (§ 482) пользуется противосудорожными и легкими слабительными; промывательными, кровопусканіями и крѣпительными лекарствами.

§ 920. Впрочемъ надобно наблюдать хорошее и порядочное жизни состояніе, избѣгать холоднаго и влажнаго воздуха, кислыхъ, одувающихъ желудокъ и соленыхъ яствъ, и душевныхъ страстей, пить хорошее вино, избѣгать безвременнаго спановленія пѣвицъ, развѣ когда сильныя боли будутъ ощущаемы въ крестцѣ или поясницѣ и проходѣ (in intestino recto). Желудокъ всегда должно содержать въ порядкѣ. Въ семъ припадкѣ всѣ острия и ѣдкія проносныя лекарства, каковы суть: ялаппа, саб, рѣ (aloe), скиммо-нел или змиахсовая смола (scamoneum), и прочая,

чая, суть бесполезны и вредны, такъ какъ и кровопусканіе чинимое тогда, когда только бываютъ надутые сосуды, а настоящаго не находится многокровія. Желѣзистыя лекарства также съ осторожностію употреблятъ должно, наипаче, когда спазмы или судороги не уняты и неиспреблены; также когда бываетъ опасность, чтобы не учинилось засореніе въ какой либо внутренности, наипаче когда первыя пищепроходныя пути еще не очищены и не вымыты надлежащимъ порядкомъ.

Вязкости и разныя склизости, въ животѣ находящіяся, хорошо разбиваютъ соки доставаемые изъ одуванчиковъ, (tagaxacum), бѣлой шаты, (taggabium), и чистяка (sumaria); также и слѣдующія разбивательныя капли:

Возьми чистой винюкаженной RC. S. tartar. unc. 1.

соли 1 унцѣ.

Насыть оную морсколуковнымъ уксусомъ, послѣ дай:

Satur. с. aceto scillitico, postea adde.

Сгущеннаго водянаго сока изъ чистяка.

Extr. aquos. fumaris.

Дикой гречухи.

Millefol.

Трилистника или дягилины.

trisol. fibr.

Черноплоха или полевой травы по ползолотника.

Card. benedic. aa. unc. semis.

Ромашковой воды, безъ вина приговаренной 4 фунта.

Aq. chamomil. f. v. libr. IV.

Сурьмяныхъ Яковлевыхъ капель.

Tinct. antim. Jacobi.

Желѣзныхъ пропускныхъ капель по 1 золотнику.

mart. aperitiv. aa unc. 1.

См. и давай всякѣ два часа по полложкѣ столовой.

m. d. omni bihorio dimid. cochl. ordinar.

ГЛАВА XXXI.

О леченіи истерики или маточной болѣзни
de curatione mali hysterici.

§ 921. Истерики или маточныхъ припадковъ (§ 484) лечительныя показанія шуды усмреленны: чптобы первѣе унять судороги, а потомъ укрѣпить чувствительныя жилы и очистиить кровь.

§ 922. Судороги укрощаются крогпусканіемъ, промывательными лекарствами, прикладками и припарками, также противосудорожными лекарствами, пригопсвляемыми изъ:

Каши карылового экстракта.	Ex extract. cascarrill.
Возрой струи.	Castoreo
Чертова духа	Aff. fœtid. &
и ушодительныхъ капель.	lavd. liquid.
§ 923. Я въ практикѣ моей весьма хорошее дѣйствіе примѣнилъ слѣдующаго лекарства:	
Возьми кашкарыловыхъ канель	RC. ess. cascarrill. dr.
2 золотника.	II.
Бобровой струи 1 золотникъ.	Castorei dr. I.
Противоядныхъ или потовыхъ, бецоардическихъ намываемыхъ, Веделіевыхъ капель 40.	Tinctur. bezoadic.
	wedelii scr. II.
Смѣшай и дарай по 40 капель, накапай на сахаръ.	M. d. XL. gutt. cum frustol. sachar.

§ 924. Снаружи должно прикладывать къ ноздрямъ вещества тяжелой и вонючей запахъ имѣющія; каковы суть: дымъ зажженныхъ куропаткиныхъ перьевъ; fumus perdic. plumar.

Чертовъ духъ.	Aff. fœtida.
Бобровая струя.	Castoreum.

Летучій мочевоі спиртѣ,
сѣ рутнымѣ масломѣ смѣ-
шанной.

S. Urin. vol. cum oleo
rutæ.

И ласточковая кислая во-
да сѣ бобровою струею.

Aq. hirondinæ acida
cum castoreo.

Промывательныя приготовляющіяся изъ:

Корня и сѣмянн зрнчатого

Ex rad. & sem. levistici.

Ромашковыхѣ и бузиновыхѣ
цвѣтѣвъ,

fior. cham. & sambuc.

И чепырехѣ вѣтроутолн-
тельныхѣ сѣмянн.

Et sem IV. carminat.

§ 925. Когда больная свободна бываетѣ отѣ
своихѣ припадковѣ, то должно давать ей
такія лекарства, которыя бы могли выводить
желчныя и вязкія сырости, на первыхѣ пупяхѣ
находящіяся.

§ 926. Если сего припадка бываетѣ при-
чиною непорядочное мѣсячныхѣ кровей теченіе;
то въ такомѣ случаѣ я совѣтую употреблять
мылья въ баняхѣ, ваннахѣ и теплицахѣ, ста-
вить ноги въ теплую воду сѣ чернопольни-
кою, маточною травою и ромашкою на-
стоянною, и давать балзамическія пилюли
сѣ истойкою изъ лядьниковыхѣ и мажвнхѣ
цвѣтѣвъ приготовленною. Балзамическія пилю-
ли, послѣдуя Г. Шеле, можно составлять
такимѣ образомѣ:

Возьми сгущеннаго сока черной че-
мерицы.

RC. extract. hel-
lebor nigr.

Чистаго сабура.

Aloes depur.

Желѣзистыхѣ нашатырныхѣ цвѣ-
тѣвъ по ползолотника.

Flor. sal. ammon-
mart. aa unc. sem.

Восточнаго шафрана 2 золоти-
ника.

Croici orientalis
dr. II.

Опиескаго опіа 20
гранъ.

Смѣшай, сдѣлай каплишки съ
ревеневыми каплями въсомъ въ
2 грана, пересыпь порошкомъ
солодкового корня, и давай
отъ 8 до 12 съ вышепомнну-
тою настойкою.

Opii thebaici scrup.
I.

M. f. p. l. eff. rhei.
pond. sing. gr. II.
consperg. p. liqui-
rit. d. VIII ad XII
cum infuso supra
laudato.

Еслили подымется рвота, то должно да-
вать Говманскія утолительныя капли, вкушѣ
съ каплями обрзозой струи (liquor amand. mineral.
Hoff. cum castoreo).

§ 927. Всякія летучія соли и съ желѣзомъ
приготавливаемые лекарства, даемыя въ нутрь
во время свирѣпствованія болѣзни, причиняютъ
вредъ. Также горячительныя лекарства, каковы
суть противоядныя *Шталезы* капли (ess. alexi-
pharmaca Stalii), капли бѣлаго бѣдренца и лошакова
огурца, (ess. pimpinell. alb. & scordii). Во время бо-
лѣзненнаго приступа должно также избѣгать
бань, ваннъ и кровопусканія, что однакожъ не
всегда исполнять по потребно.

ГЛАВА XXXII.

О леченіи цынготной болѣзни или скорбу- та de curatione scorbuti.

§ 928. Скорбута, или цынготной болѣзни
(§ 486) леленіе производится такъ: во первыхъ
стараться должно вывести нечистоты, находя-
щіяся на первыхъ путяхъ, потомъ очистить

и исправить вязкую и соленую кровь, а наконецъ, такъ сказать, укрѣпить кровавой составъ.

§ 929. Почему прежде всего надлежитъ пу-
скасть кровь, а потомъ давать слабительныя
лекарства. Кровь хорошо исправляютъ и очи-
щаютъ:

Корень Нѣмецкаго илбirea или

Radix ari.

Аароновоѣ борода.

Цыганская или ложечная
травя.

Herba cochleariæ.

Жаруха или кресъ.

Herba nasturtii,

Чистякъ

herb. fumarizæ.

и постоянной воздухъ, употребляемый шаникъ обра-
зомъ, какъ показано подъ § 917.

§ 930. Снаружи должно прикладывавать баль-
самическія лекарства и употреблявъ полосканья
для очищенія десенъ, составленные изъ:

Мирровыхъ и янтарныхъ ка-
пель.

*Ex ess. myrhæ &
succini.*

Смирна ложечной травы
и придорожниковой воды.

*spirit. cochlear.
& aq. plantaginis.*

§ 931. Изъ помѣстныхъ или упоиитель-
ныхъ средствъ хорошее дѣйствіе имѣетъ слѣ-
дующее лекарство:

Возьми Ангальтинской воды по-
дунца.

*RC. aq. Anhaltinæ
unc femis.*

Ленучаго спирта земляныхъ
чешуй.

*Spirit. lubricorum
volatil.*

Шедранныхъ и мушинныхъ
капель по 2 золотника.

*Esse croi & nucifæ
aa dr. II.*

Камфоры 20 гранъ.

*Comphoræ scrupul. I.
M. app. linteolum
modetactum, ubi
opus est.*

Смѣшай, и осмочи въ тряпку,
прикладывай, гдѣ должно.

§ 932.

§ 932. Изъ укрѣпляющихъ лекарствъ имѣютъ пользу свою:

Смирна.	Myscha.
Ладанъ	Olibanum &
и мятной и кашкарилловой	extract. menthae & sa-
экстркты.	scardiae.

По вечерамъ надлежитъ спавить ноги въ теплую воду.

§ 933. Поелану ршуть распускаетъ кровь; для того при пользованіи скорботы не должно употреблять изъ ршуты приготовляемыхъ лекарствъ, также перутиской жоржи и опія.

Въ прочемъ надлежитъ наблюдать приличную скорботѣ діету, правящую то есть и кислую, естли скорботы причиною будетъ гнилая соленая кровь; нѣжную же и уполяющую кислоту, естли причиною оной будетъ кислота и накопленіе постояннаго воздуха въ крови.

ГЛАВА XXXIII.

О леченіи членосоставныхъ болей, какъ то, подагры и прочая de curatione arthriticorum dolorum, ut podagrae & cetera.

§ 934 Членосоставной боли (§ 487) какъ-то, подагры, хирагры, гонагры, шіагры, упина, и прочая: леченіе состоитъ въ томъ: чтобы во первыхъ унять и истребить жестокость спазмовъ; потомъ вывести изъ тѣла нечистую кровяную водяность и тѣдную матерію, и наконецъ, чтобы укрѣпить ослабленные отъ жестокихъ болей чашши.

§ 935. Съ самаго начала должно пускать кровь, и, смотря по обстоятельствамъ, нѣсколько разъ таковое повторять кровопускание. Боли утѣляютъ унимающія и противосудорожныя лекарства. Также разводящія и растворяющіе остропу составы.

§ 936. Если боли будутъ чрезвычайно сильны, то въ такомъ случаѣ предписывать надлежитъ легкія утѣлительныя лекарства, на прим. составленное изъ:

Шафраннаго экстракта.

Ex extr. croci.

Пилульной Вильдеганзѣвой
массы

Maff. pilul. Wildegan-
si &c.

И гречкаго мыла.

Sap. venet.

§ 937. Снаружи прикладываятъ должно чувственожилыныя пластыри, изъ коихъ какойнибудь можно составить такъ:

Возьми сѣрныхъ цвѣтовъ по-
лунца.

RC. Flor. sulphur. unc.
semis.

Винокаменной соли 2 зо-
лотника.

Sal. tart. dr. II.

Распусти въ плавлении горшкѣ, и едѣтай массу, которую вари въ деревянномъ и бѣлешномъ маслахъ, взявъ перваго 3 унца, а послѣдняго полунца, потомъ придай.

Fleant in tigillo, fiat
massa, quam loque. in
olei olivar. III unc.
hyssopam. unc. f. dein
adde.

• Можжевеловато масла,
Скиндара по 2 золотника

Olei juniperi.
Olei therebinthinæ aa
dr. II.

К мѣфы : золотникъ.
Смѣшай и прикладываятъ въ
спаряющихъ частяхъ на
на шпатель.

Camphoræ dr. I.
M. ap'ic. ad. p. do-
lent. cum linteolo.

§ 938. Когда членосоставныя боли будутъ происходить отъ оспантковъ ломотной материи, или гонореи, и любостроенной нечистоты, то въ такомъ случаѣ должно употреблять ошваръ изъ:

Сарсапарилла.

Хины

и гваляковаго дерева вкупѣ съ безоардическими то есть противоположными и ртутными лекарствами.

Sarsaparilla.

china

Ing. qvazaci cum bezoardicis & mercurialibus.

Во время свирѣтствованія подагры, видѣлъ я весьма хорошее дѣйствіе слѣдующаго порошка: Возьми перечищенной салиптры 1 золотникъ.

RC. nitr. pur. dr. I.

Порошка изъ земляныхъ червей ползолотника.

Pulver. lumbr. terrestr. dr. f.

Камфоры 3 грана.

Camphoræ gr. III.

Смѣшай, разбѣли на 3 равныя части и давай по порошку чрезъ 2 часа въ ромашковой водѣ

M. d. in III. partes æquales d. unus omni biborio in aqua flor. chamomillæ.

§ 940. Когда уймуться членосоставныя боли, то должно давать крѣпительныя лекарства, изъ коихъ слѣдующій электуарій въ моей практикѣ всегда приносилъ пользу:

Возьми хинской или лихорадочной корки полунца.

RC. cort. chinæ unc. semis.

Конарникаго корня.

Rad. aristolechiæ longæ

Калуфероваго корня.

Rad. costi veri.

Гвоздики.

Caryophyll.

Ромашковыхъ цвѣтковъ.

Flor. chamomil.

Мушкетнаго орѣха по 2 золотника.

Nucis moschat. aa dr. II.

Розовго вина или юлепа 4 унца.

Julepi rosarum unc. IV.

Ку-

Купоросной кислоты 30 капель. S. vitriol. gut. XXX.

Масла лимонного. Olei de cedro.

Мятного. Menthae.

Мушкатного, изъ мушкатныхъ Olei macis g. X.

то есть цвѣтновъ полученнаго,

по 10 капель.

Перуанскаго бальсама ползоло Balfami Peruviani dr.

тиника. semis.

Смѣшай и сдѣлай кашину или M. f. elctuarium de

электуарій, которой давай qvo d. cochlear. omni

по небольшой ложкѣ всакѣе

четыре часа.

§ 941. Стоянїя или застои нечистой пасоки (§ 933) разбиваются чайными настойками, приготавливаемыми изъ слѣдующихъ:

Диной гречухи.

Ex herb. millefollii.

Вероники.

Veronicae.

Шалфея и

Salviae &

Травы очанки или дубровки.

Chamendryos.

Снаружи можно прикладывавать мѣшечки приготовленные изъ мягчительныхъ и разбивательныхъ цвѣтновъ однихъ, или вкупѣ съ камфорою и небольшимъ количествомъ шафрана.

§ 942. Когда боли увеличивались и больного весьма сильно терзали; то я съ превеликою пользою давалъ слѣдующій составъ:

Возьми экстракта бобровой RC. Extract castor scrupul.

струи 20 гранъ.

I.

Упоительнаго квинковаго

Lavdan. cydoniat. gr.

состава 4 грана.

IV.

Камфорнаго спирта сколько

S. camphorae q. s. m.

потребуется, смѣшай и сдѣлай

f. p. XII. d. II. prodosi

12 кашмекъ, изъ коихъ

ter de die.

давай по 2 на одинъ прїемъ

трижды въ день.

§ 943. При пользованіи членосоставныхъ бо-
лей и подагрыхескихъ припадковъ не должно упо-
треблять пиявицъ, проносныхъ лекарствъ и
теплаго содержанія; ибо такимъ образомъ мож-
но еще увеличить зло, а не унять оное. Избѣ-
гать также должно съ опіемъ приготовленныхъ
лекарствъ, и даже снаружи не должно приклады-
вать оныхъ, потому что опіаты могутъ оспа-
новить и внутрь вогнать испаряемую болѣзненную
матерію. Крѣпкихъ лекарствъ также употре-
блять не должно; для того что оныя могутъ
причинить воспаленіе въ страдающихъ частяхъ.
Спѣспіи, каковы суть гнѣвъ и любострастіе,
поселику увеличивающъ боль, для того оныхъ
такъ, какъ яда избѣгать должно.

ГЛАВА XXXIV.

О леченіи коросты de curatione scabiei.

§ 944. Чтобы больныхъ излѣчить отъ ко-
росты (§ 494); то надлежитъ стараться: что-
бы прежде умирить и разтворить острия и сѣр-
чистыя влаги, а нечистыя вывести изъ тѣла
вонъ посредствомъ слабленія желудка.

§ 945. Оспроту умирятъ и утполяютъ по-
рошки приготовленные изъ *хуторочнаго винна.о*
жмня (tartarus vitriolatus), *существенной винно-*
каменной соли (terra fusa tartari) и *сурьмяной*
жидко ори (cinabaris antimonii), запивая опваромъ,
составленнымъ изъ *корня ангельской сладости*,
(rad

(rad polypodii), лимпинелла (pimpinella alba), грудной травы (herba scabiosae), и лошакова уха (scordii herba). Нечистыя влаги выводятъ изъ нѣла вонь слабительныя лекарства, съ ртутью смѣшанныя, изъ числа коихъ суть слѣдующія катышки :

Возьми экстракта Кролѣва, пани-	RC. extracti panchy-
магогическимъ называемаго.	magi Crolii.
Каеодического или Рудѣва по 1	Extr. Catholici, S.
золотнику.	Rudii aa dr. 1.
Сладкой ртуты.	Mercur. dulc.
Аттинской соли по ползолотника.	S. Anglic aa dr. S.
Перуанскаго бальсама сколько по-	Balsam. peruviani
требно, сдѣлай катышки и да-	q. s. f. p. d. tres
вай по 3 трижды въ день.	ter de die.

§ 946. Въмѣсто обыкновеннаго питья хорошо употреблять отваръ изъ :

Сарсапарилловаго Корня.	E rad. sarsaparill.
Корни сасафразоваго дерева.	Corl. lig. safras.
Солодковаго корня	Rad. liquoritiae et
И коришки.	Passulis minoribus.

§ 947. При пользованіи коросты не должно употреблять сильныхъ пшовыхъ и горячительныхъ лекарствъ, потому что оныя болѣе еще распущаютъ кровь, и слѣдственно угрожаютъ разгоряченіе въ оной. Также не должно употреблять мазей и пластырей, не выведши первѣе изъ нѣла худыхъ и острыхъ влагъ. Если же хорошо очищены будутъ первыя пуги; то изрядно употреблять мазь, составленную изъ чувствительножильной мази и ссажденной лжаской ртуты, взявъ первой 1 унцъ, а лжаской дней 15 драхт. (ungv. nervinum et merc. precipitat. rubr.)

§ 948. Снаружи для очищенія кожи можно употреблять сіе лекарство :

Возьми коровья молока 1 фунтѣ. RC. Lactis vaccini libr.

Приготовленныхъ бѣлилъ полу-
унца.

1.
Cerussæ præparatæ
unc semis.

Грецкаго мыла 1 унцѣ, свѣ-
шай и омывай тѣло.

Sap. venti unc 1.
m. et ablvas cutim.

Впрочемъ нехудо употреблять и ванны, съ
сѣбною печенной приготовленной, которую пе-
ченку можно давать и внутрь, наипаче когда
причиною коросты будетъ золотушная и скор-
бутная матерія.

Любострастная короста лечится внутрь упо-
требляемою возгонною, а снаружи осажденною
красною ртутью.

Когда короста свирѣпствуетъ переважно, и
бываетъ мокротная, то въ такомъ случаѣ вѣсѣ-
ма хорошо употреблять внутрь хуторосую ки-
слоту (acidum vitrioli.)

ГЛАВА XXXV.

О леченіи одышки de curatione asthmatis.

§ 949. Одышку (§ 497) лечить должно,
смотря по ея причинамъ. Ибо еслили оная при-
ключится отъ вогнанной внутрь коростной, по-
даггической или вередной матеріи, то въ та-
комъ случаѣ предписывать надлежитъ поповыя
лекарства, изъ ангара, сѣрыхъ цвѣтовъ и
калфоры, приготовляемая.

§ 950.

§ 950. Если же воспоследует одышка отъ задержанія вътровъ; то нѣтъ лучшаго средства къ избавленію отъ оной, какъ мягчительныя и разбивательныя лекарства, которыя пригото-
вить можно изъ:

4. Вътпроунимательныхъ сѣмянъ.	E sem. IV carminati- vis.
Ромашковыхъ и бузиновыхъ цвѣтовъ.	Flor. chamomil. & fambae
Масла сладкаго миндаля.	Ol. amygdal. d. &
И слабительной Сейгнетовой соли.	Sal de Scignette.

§ 951. Если причина одышки будетъ чрезвычайное въ груди крови скопленіе; то дол-
жно пустить кровь изъ ноги; или постараться
піявцы къ золотымъ жиламъ, либо баночное
учинить кровопусканіе.

§ 952. Если одышка будетъ происходить
отъ худобы и лихоты телесной (§ 402); то
должно давать среднія соли екупъ съ ревенемъ,
а снаружи прикладывать мыльной Барбетовъ
пластырь (empl. saponatum Barbetti). Внутрь же
полезно давать настойку изъ гиссола или
сильнаго зѣробол. *infusum ex herb. hyssopi.*

Вероники.

Veronicae.

Плюща или копытника
и бархатныхъ цвѣтовъ, иначе
скороспѣлки или бѣльцами
называемыхъ.

Herbae terrestres
& flos. bellidis.

§ 953. Въ самомъ болѣзненномъ приступѣ
крови пускать не должно, развѣ когда того
требовать будетъ очевидная опасность. Также

не должно употреблять сильныхъ рвотныхъ, проносныхъ и потовыхъ лекарствъ. Когда болѣзнь застарѣла, или скопилась вода въ груди, обыкновенно грудною водяною болѣзнію называемая, то плевранцы, иногда въ семъ случаѣ употребляемые, никакой не приносящъ пользы. Еслили въ одышкѣ подѣлаются на ногахъ опухоли, то какъ проносныхъ лекарствъ, такъ и всего иного избѣгать должно, что холодитъ шло, куды надлежитъ опнестъ кислыя и соленыя кушанья.

ГЛАВА XXXVI.

О леченіи жара въ желудкѣ или изгаги de curatione ardoris ventriculi sive sodæ.

§ 954. Къ излеченію опѣ изгаги или жара въ желудкѣ (§ 503) полезно употреблять виннокаменное масло, чрезъ опсыреніе, полученное (Ol. tartari per deliquium), приутопленной мѣль и утолительныя порошки, изъ селитры и раковыхъ жерновокъ составленные.

ГЛАВА XXXVII.

О леченіи желудочной боли съ одышкою или околосердечной щеткоты de curatione cardialgiæ.

§ 955. Въ желудочной съ одышкою боли или околосердечной щемотѣ (§ 504) великое приноситъ пособіе порошокъ составленный изъ:
При-

Приготовленныхъ раковинъ.	Polv. e. coapch. pteparat.
Окупорошеннаго виннаго камня.	Tart. vitriolat.
Перечищенной еселитры и самородной киновари.	Nitr. depur. & Cinnabar. nativ.

Котораго порошка понемножку употреблять должно нѣсколько разъ въ день, запивая настойкою изъ мякы и верхушекъ дикой гречули приготовленную.

Впрочемъ надлежитъ вѣдать, что вышепоказанныя лекарства тогда только дѣйствительны и оправданны бывають, когда помянутые припадки имѣють причину происхожденія своего кислоту и испортившіяся желудочныя влаги. А еслили причиной оной не кислота, но будутъ промглыя влаги и испортившаяся желчь; то весьма хорошо употреблять лимонной сокъ, терновую воду, барбарисной сироль и симъ подобныя лекарства. Въ обѣихъ же случаяхъ хорошо употреблять слѣдующее лекарство:

Возьми Армянской глины под- тора лица.	RC. Boli Armenae unc. I. & semis.
Верхней желтой померанцевой корки 6 золотниковъ.	Flav. cort. aurant. dr. VI.
Корня Аароновой бороды.	Rad. ari.
Коричневой острой корки.	Cort. cinnamomi acuti.
Ирванаго корня по 1 золотни- ку. бѣлаго сахара въ водѣ раз- пущеннаго, сколько потребно.	Rad. cal. aramat. aa. dr. I. sacchar. alb. in aqua f. q. f.
Сдѣлай леешечки и давай по 1 трижды въ день.	F. morali d. I. ter de die.
Возьми Лемнійской жирной гли- ны 2 золотника.	RC. Terr. lem. dr. II.
Окупорошеннаго виннаго за- мня 1 золотникъ.	Tart. vitriolat. dr. I.

Порошка изъ кашкарыловой
норки 2а гранъ
Слѣжай, раздѣли на 6 час-
тей, и давай по одному по-
рошку трижды въ день.

Pulv. cort. cascaril.
gr. XII.
M. d. in VI partes.
d. unus ter de die.

Поелику же приемы сии имѣютъ земляныя,
отлищающія желудокъ частицы; для того
послѣ употребленія оныхъ надлежитъ давать
слабительныя лекарства.

§ 956. Въмѣсто обыкновеннаго питія можно
употреблять отваръ изъ волчьяго жорна (*radix
ferozepetæ*), скобокъ оленьяго рога, ячменя и ко-
ринки.

ГЛАВА XXXVIII.

О леченіи глазныхъ припадковъ *de curati-
one affectuum oculorum.*

§ 957. Глазные припадки весьма трудно
пользуются. Чпобы излечить опѣ оныхъ боль-
наго; то должно первѣе разбить стоячую и
чувствительныя жилы давящую влагу, а по-
томъ укрѣпить ослаблыя части.

§ 958. Первому показанію удовлетворить мо-
гутъ либо заволока (*setaceum*), либо прижогъ
(*cauterium actuale*), учиненныя на затылкѣ, ка-
ковы учиненія супъ единственныя средства къ
излеченію опѣ темной воды въ глазѣ (*gutta fe-
rena*). Во всякихъ глазныхъ припадкахъ наипаче
сѣ воспаленіемъ соединенныхъ. сначала должно
пу-

пускать кровь, а послѣ предписывать слѣдую-
щій порошокъ:

Возьми прѣготовленнаго ян- таря.	RC. Succini præparati.
Половой сурьмы.	Antimon. diaphoret.
Сурьмной киноари по 2 зо- лотника.	Cinnabar antimon. aa dr. II.
Минеральнаго кermеса, иначе Карш, дѣанскимъ порошокъ называемаго.	Kermes mineralis.
Лепучей соли оленья рота и янтарной лепучей же соли по 10 гранъ.	Salis volatil. cornu cervi & succini aa. gr. X.
Слѣдай порошокъ, раздѣли на 12 равныхъ частей, и давай по 1 трижды въ день, запи- вая отваромъ изъ:	M. f. p. d. in XII partes æquales d. I. ter de die, super- bibendo decoct. &
Бадьяноваго корня.	Radice valerianæ
Пчельной правы	Herba melissæ &
И семян Волоскаго укропа.	Semine fœniculi.

§ 959. Желудокъ всегда должно сохранять
свободнымъ. Потому надлежитъ предписывать
каплишки, изъ ланхимического экстракта
Кромеа и сладкой ртуты. Снаружи можно
прикладывать къ глазамъ мѣшечки, изъ бадхр-
ячковаго корня, ромшковыхъ цвѣтовъ и семяни
Волоскаго укропа прѣготовленные. Дѣлать
примочки изъ туца или шліаутовой извести
и розовой воды; воды такъ называемой l'œu de
luse, или глазной лизоревой (aqua ophthalmica sægu-
lea) и симъ подобныхъ.

На примѣръ:

Возьми перетнутой придорож- никовой воды 4 унца.	RC. Ad. fil. plantag. unc IV.
---	----------------------------------

Шипаушеровыхъ цвѣтовъ 10 гранъ.	Flor. zinci ser. I.
Свинцоваго сахара.	Sachar. saturni.
Камфоры, по ползолотника	Camphoræ aa de. f.
Бѣлаго купороса 10 гранъ.	Vitriol. alb. gr. X.
Сильный, слабый прищичку, которую должно часто про- мывать глаза всякой день.	M. f. collyrium, quo abluo oculo, sæpius de die.

чпужь касается до питья, то вмѣсто обык-
новеннаго употреблятъ можно отваръ изъ бал-
дырьяноваго жерня, бахаутоваго дерева, и лечеб-
ной и ислѣйной травъ. Рвотныхъ же и про-
носныхъ лекарствъ употреблять не должно, а
наипаче безвременно. Ибо первыя могутъ причи-
нить скопленіе влагъ къ глазамъ, а послѣднія
сгустить оныя.

ГЛАВА XL.

О леченіи ушныхъ или слуховыхъ при-
падковъ de curatione affectuum aurium sive
auditus.

§ 960. Способъ леченія уменьшеннаго и
исторченнаго слышанія (§ 519) состоитъ въ
томъ, чпобы первѣе отвести отъ головы и
ушей влаги, и потомъ разбить уже сплотивъ
въ ушахъ и истребить завалы.

§ 961. Къ исполненію перваго дѣйствія удоб-
ны суть кровопусканія, на ногахъ производимыя,
слабительныя лекарства, ванны, и нарывные
пластыри. Въ порчахъ слышанія изрядное дѣй-
ствіе имѣютъ слѣдующія каплишки:

Возьми

Возьми прозрачнаго Американ- RC. Aloës socotrine.
скаго сабура.

Экспрессии черной чемерицы.

Extract hellebar. ni-
gri.

Цвѣтовъ рознго ладана.

Flor. benzoes.

Избранной смирны пополю-
дошника.

Myrrhæ elect. aa dr-
femis.

Янтарной соли.

Salis succini.

Сладкой ртуты по 20 гранъ.

Mer. dulcis aa gr.
XX.

Камфоры 4 гранз.

Camphor. gr. IV.

Перуанскаго бальсма сколько
потребу.

Balsam. peruviani. q.
s.

Смѣшай, сдѣлай напышки въ-
сомъ въ 1 гранъ, и давай по
3 четирижды въ день.

M. f. p. p. gr. I. d.
tres quater de die.

§ 962. Ванны приготавливаются изъ ромаш-
ковыхъ цвѣтовъ, пшеничныхъ отрубей и по-
ташу. Нарывные пластыри должно приклады-
вать къ яшкамъ. Полезно также употреблять
мѣшечки изъ разбивательныхъ веществъ приго-
товляемые вкупѣ съ камфарою.

§ 963. Еслили причиною зла сего будетъ
зетвердѣлая въ ушахъ сѣра; то должно впу-
скавъ въ уши помощію маленькаго насоса масло
сладкаго миндаля, одно или съ янтарнымъ
масломъ.

§ 964. Еслили припадки ушные приключа-
ются отъ острой внутри вогнанной матеріи, то
хорошо употреблять слѣдующій порошокъ:

Возьми пошовой сурьмы.

RC. Antimon. diapher.

Сѣрныхъ цвѣтовъ пополю-
дошника.

Flor. sulphur. aa dr-
f.

ЦѣтшюкѢ роснаго ладана 6
гранѢ.

Смѣтай, раздѣли на 4 равныя
части, и дѣлай по одному по-
рошку, дважды въ день по-
утру и на ночь въ кровочисти-
тельную ошварѢ.

Flor. benzoes gr. vi.

D. in IV partes æqua-
les d unus pulvis bis
de die mane et ves-
peri sub noctem, cum
decocto sang. puri-
ficante.

§. 965. ТѢ, кои выходятѢ на открытой
воздухѢ, могутѢ для охраненія своего упопре-
блять головные холлахи (сасирѢ), пригото-
вленные изѢ :

Циперхнаго корня.

СѣмянѢ дѣвичей красоты.

Янтаря.

Роснаго ладана.

Мускуса.

ЦѣтшюкѢ багуновыхѢ.

ЛавендуловыхѢ.

РозовыхѢ.

Егородской травы

И жайгерановыхѢ.

E rad. cyperi.

Sem. nigellæ.

Succino.

Benzoe.

Moscho.

Flor. anthos.

Lavendulæ.

Rosarum.

Serpilli et

Majoranæ.

ГЛАВА · XLII.

О леченіи паралича или отнятія членовѢ
и лострѢла или удара de curatione paraliseos
et apoplexiæ.

§ 966. Чтобы отѢ паралича (§ 523) и
удара или лострѢла (§ 541) излечить боль-
наго: то сперва надлежитѢ истребити прѣпят-
ствіе, останавливающее теченіе духовѢ и жизнен-
ныхѢ соковѢ, и потомѢ укрѣпить пораженныя
части, и весь ликѢ чувствительныхѢ жилѢ.

§ 967.

§ 967. Препятствіе печенія и вліянія жи-
вительныхъ соковъ испребляется , когда внутрен-
нія уничижаются судороги и сведенія , уто-
ляется волнованіе и спременение крови , и опво-
дится опѣ головы , слѣдственно и опѣ мозга.
Для учиненія чего , можно и должно упопре-
блять мягчительныя промывательныя лекарства,
приутопяляемыя изъ :

Овсяной ухи.

Ромашковыхъ цвѣтисъ.

Кминнаго сѣмянн.

Масла сладкаго миндаля

И просвирияковаго фермелѣна
сыр на , который всякой день
два раза ставиль должно.

E jusculo avenaceo.

Flor. chamomill.

Sem. cumini.

Ol. amygd. d. et

Syro. de alchea F.
quod infundatur bis
de die.

§ 968. Спременение и волнованіе крови оспа-
новляется кровопусканіями , умѣряющими и хо-
лодильными пинктурами и порошками , при-
утопяляемыми изъ :

Потовой сурьмы.

Янтаря.

Сели пры и самородной кино-
вари.

Ex antim. diaphor.

Succino.

Nitro et cinnabar.
nativ.

Зипяая настойкою изъ бальдырьяковаго корня , пчель-
ной травы и сѣянн волоскаго укропа. (S. fœniculi).

Поутру должно давать слѣдующія катышки:

Возьми рандимогогическаго эк-
страктъ Кролѣва.

Экстрактъ черной чемерицы
по 2 золотника.

Сладкой риллии ползолотника.

Карпузіанскаго порошка 10
гранъ.

Померанцеваго сиропа сколько
пошрѣно , слѣлай катышки
вѣсомъ въ 3 грана , пересынь

RC. Extr. ranchimagogi
Crolii.

Extr. hellebor. nigr.
aa dr. II.

Mercur. ducl. dr. f.

Kerm. mineral. gr. X.

Syr. avrant. q. f. m.

f. p. p. gr. III. conf-

perg. pulv. lycopod.
d. tres ter de die.

порошкомъ плауновымъ и да-
взй по 3 трижды въ день.

Снаружи онѣмѣлая части можно напирать
мурашковымъ спиртомъ вкусъ съ халаями
шланскихъ мукъ, или элекпризовать, сдѣлан-
ною на по парочипую машиную.

Естьли параличъ будетъ происходить отъ
многокровія, то должно пустить кровь. Есть-
ли же причину онаго будуть свинцовыя испа-
ренія; то должно употреблять растительныя,
изъ растѣній то есть полученные кислоты, нлпр.
щивелевой сокъ, укусъ и прочая. Также рпуть-
ныя и усладительныя лекарства.

А когда такового приладка причиной будетъ
мышьячное испареніе, то хорошо и весьма поле-
зно употреблять анисное масло, и сѣрныя
бани.

Въ неизвѣстныхъ же случаяхъ, когда то есть
не можно будетъ узнать настоящей причины
паралича, надлежитъ употреблять внутрь по-
стоянный воздухъ, такимъ образомъ, какъ о
томъ выше сказано при леченіи каменной бо-
лѣзни.

§ 969. Вовсякомъ ударѣ или лострѣлѣ я
предписывалъ рвотное лекарство изъ трехъ гранъ
вишняго рвотнаго камня и трехъ унцъ пере-
гнтой мятной воды, что и повпорялъ по
прѣшествіи трехъ дней. Прежде же нежели пред-
писывалъ рвотное, я пускалъ кровь.

ВЪ

Въ пострѣлѣ такъ называемомъ *кровавомъ*, онѣ многокровія но есть происходящемъ, пусшивши прежде кровь, я прикладывалъ нарывной *пластырь* къ запялку, чпо когда мало приносило пользы, то я дѣлалъ заволоки (*setacea*). Мазь, составленная изъ чувствительножильной мази и перцу, которою я напиралъ спановую жилу, весьма великую приносила пользу.

§ 970. Въ пострѣлѣ, такъ называемомъ *мокротномъ* (*in serosa aroria*) не должно пускать крови, развѣ къ тому особливый будутъ понуждать знаки, а вмѣсто кровопусканія употреблять рвотныя лекарства, которыхъ никакъ не должно давать больнымъ сухаго сложенія и истощившимъ силы свои невоздержною жизнію, пьянствомъ и любострастіемъ; ибо рвотныя лекарства въ семъ случаѣ могутъ учинить самыя опаснѣйшія судороги. Къ ногамъ можно прикладывашъ нарывные пластыри, а на шеѣ дѣлать прижогн или заволоки. Въ пострѣлѣ такъ называемомъ *кровавомъ*, всякимъ образомъ избѣгать должно крѣпкихъ душистыхъ веществъ, каковы сущі: *слиртъ* земляныхъ червей, *слиртъ* оленья рога съ янтаремъ приоттовленнымъ, *слиртъ* камфарной, *скилидаръ* или *слиртъ* терпентинной, и перегнатыя масла, которыя однакожъ вещества въ мокротномъ пострѣлѣ употребленіе и пользу свою имѣютъ.

Есть-

Естьли сія средства не пособятъ; то должно больныхъ отсылать къ Вишбадскимъ и симъ подобнымъ теплицамъ, или вмѣсто оныхъ составлять ванны изъ справъ:

Вожьего деревъ.	Ex herb. abrotani.
Душицы.	Origan.
Богородской травы.	Seprilli.
Синяго аѳроболъ.	hyssopi.
Мяты.	Menthae.
Багуна.	Roris marin.
Маеранна.	Majoranae.
Мурзынъ или	Formicis f.
Желѣзной пѣвки.	Scor. mart.

Или намазывать животъ мягчительными мазями, дабы такимъ образомъ разбить и унять судороги.

Ударъ, причиненной сыпильными какими либо веществами, лечится внутрь и снаружи употребляемыми кислотами, напр. янскимъ укусомъ, и сему подобными средствами.

Естьли же ударъ бываетъ уроченной (periodicus), то для охраненія отъ онаго должно очищать первыя пищепріемныя пути, когда будутъ примѣты находящихся на оныхъ нечистотъ; пускать кровь, когда будетъ находится много крове; и наконецъ укрѣплять ослаблыя чувствительныя жилы, употребленіемъ дсвольнаго количества Перуанской ко хл.

Впрочемъ должно стараться, чптобы истребить судороги и другія препяшствія, останавливающія вытеченіе крови изъ головы.

ГЛА-

ГЛАВА ХLI.

О леченіи кашля *de curatione tussis.*

§ 971. Кашель (§ 528) лечить должно слѣдующимъ образомъ: вопервыхъ надлежитъ дурную и опягощающую легкія матерію сдѣлать удобною къ изверженію; потомъ припеченіе мокротъ къ легкимъ, остановить и изгнать другими испразнительными путями; наконецъ, возвратитъ прежую крѣпость ослабшимъ часпямъ.

§ 972. Первое исполнить можно смягчительными, разводишельными и разбивашельными лекарствомъ.

§ 973. Къ разбитію матеріи и учиненію оной способною къ изверженію великое пособіе приноситъ слѣдующее лекарство:

Возьми фѣаліеваго корня	RC. Rad. icrid. florent et
И корня Нѣмецкаго имбиря по 40 гранъ.	Aci aa scrup. II.
Морскаго луку 20 гранъ.	Squillæ scrup. I.
Порошка изъ бѣлокопытника волзолотника.	Pulv. herbæ tussilag. dr. semis.
Смѣшай, раздѣли на 8 равныхъ часпей, и давай по одному порошку трижды въ день, велѣвъ запивать отварами составленнымъ изъ:	M. div. in IV part. aqv. d. unus ter de die, superbibendo decoct.
Вероники и синяго звѣрбоя.	Ex herb. veron. et hyssop.
Цвѣтовъ пресвирковыхъ и Цвѣтовъ, такъ называемыхъ бѣльцовъ, съ сѣменемъ волоскаго укропа.	Floc. malvæ et Bellidis cum s. fœniculi.

§ 974.

§ 974. Мокротная матерія отводится къ другимъ мѣстамъ помощію легкихъ слабительныхъ лекарствъ: изъ числа коихъ супъ слѣдующій:

Возьми нашатырной камеди вѣ RC. Gum. ammon. aceto морскодуковой укусеѣ распу- scillitico soluti et sic- щенной и послѣ высушенной cati dr. I. и золотикиѣ.

Сабуроваго и ланжинагогиче- ского Кролѣва экстракта по- трезоюючина.

Приготовленныхъ шокриѣ зо граиѣ.

Сибшай, и сѣ перуанскииѣ бал- самовѣ, изъѣ онато сколько потребно, сдѣлай кашышши вѣсомѣ вѣ 1 граиѣ. пересыпъ по- рошковиѣ солошковаго корня и давай по 6 кашышковиѣ два- ды вѣ день.

Возьми яинны 2 унца. распу- сти вѣ шерновой водѣ, и, при сѣшшиваніи, придай листовоѣ виннокаменной земли зо граиѣ.

Лимоннаго масла 2 капли, и давай, пока послабиѣ желу- дкиѣ.

Extract. aloës et pan- chymagogi. Crolii aa dr. f.

M. Meped. pręparat. scrup. I.

M. f. c. f. q. bals. peruviani p. f. p. gr. I. consperg. p. liqui- ritizę d. VI bis de die.

Mannę unc. II. f. in aqv. acaciarum. coi adde. terr. foliat tar- tari scr. I.

Ol. de cedro gutt II. d. donec. alvus solva- tor.

§ 975. Естѣли же кашля причиною будетѣ кислопа, находящаяся вѣ желудкѣ, то должно давати порошокъ уполяющій кислопу, каковѣ можно составитѣ изѣ раховыхъ жернововѣ и Мархионоза порошка (pulv. Marchionicus.)

или

five.

Возьми марганцу.

RC. Magnęfiz.

Горькой слабительной соли по полтора унца.

Sal. cathart. aa unc. I et f.

Благо

Бѣлаго сахара, вѣ порошокъ
спертого, 1 унцѣ.

Порошка изѣ коричневой кории
1 золотникѣ.

Смѣшай хорошо и давай по
малой ложечкѣ.

Pulv. sacchari alb. unc.
I.

Pulv. cort. cinnam.
dr. I.

M. d. cochlear. parv.

§ 976. Вѣ сильномѣ духоваживительномѣ
или удушличомѣ кашлѣ, коклюшемѣ или пещь-
имѣ называемомѣ (tussis ferica), когда оной приклю-
чится младенцамѣ, безѣ всякаго закоснѣнія над-
лежитѣ давать легкія слабительныя лекарства,
или спавить промывательныя; по учиненіи чего
можно безѣ всякой опасности давать рвотное,
которое можно составить такѣ:

Возьми перегнаною мятной воды
6 золотниковѣ.

Рвотнаго виннаго каменя пол-
грана.

Масленнаго померанцеваго са-
хара 6 гранѣ.

Смѣшай и давай до тѣхѣ порѣ,
пока подымется рвота.

или

Возьми морсколуковаго уксуса
10, 15, 20 гранѣ.

Провирчковаго сиропа.

Или розоваго меда 1 золот-
никѣ, смѣшай и дай.

RC. Aq. stil. menthae
dr. VI.

Tart. emet. gr. f.

Oleosacchari avrant.
gr. VI.

M. d. donec oriatur
vomit.

vel.

RC. Aceti scill. gr. X.
XV. XX.

Syr. de althea. vel

Mel. rosaceum dr. I.
m. d.

Возьми одного морсколуковаго меда простаго или слож-
наго (охумел. scyllit.), которые меда всегда въ апте-
кахѣ приготовлены находятся, и давай, пока начнетѣ
рвать, или вдругѣ дай полунца большихѣ, а меньшихѣ
золотниковѣ два.

Снаружи должно прикладывать пластырь со-
ставленный изѣ:

Часть V.

Е

Смир-

Спирит.
Бдельской смолы.
Янтаря.
Китова мозга.
Свинного сала.
Воска.
Сурика.
Грецкого шила.
Шафранъ и
Камфоры.

E myrrha.
Bdell.
Succino.
Spermate ceti.
Axongia porcina.
Cera.
Minio.
Sap. venet.
Croco et
Camphora.

§ 977. Если бы кокалюшъ попалъ на ипоходриковъ, то въ такомъ случаѣ полезно пу-
скасть больнымъ кровь, давать слабительныя
лекарства и спавишь ноги въ теплую воду, на-
стоянную съ смягчительными травами.

§ 978. Въ застарѣломъ и чахотномъ кашлѣ
(in tossi habituali et phthysica) хорошо употреблять
осляное молоко, съ млечною сывороткою и
вмѣстѣ давать слѣдующую кашицу:

Возьми масла сладкаго миндаля	RC. Ol. amygd. dulc. unc.
полуца.	℥.
Китова мозга 2 золотника.	Sperm. ceti dr. II.
Шафраннаго экстракта 6	Extract. croci gr. VI.
граммъ.	
Простирняковаго ферреліева	Syr. de althea Fernel.
сиропа 6 золотниковъ.	dr. VI.
Смѣшай и давай по ложкѣ	M. d. cochlear. omni
вслѣдѣ 3 или 2 часа.	tri vel bihorio.

§ 979. Если въ закорелѣломъ или чахо-
точномъ кашлѣ сдѣлается голосъ хрипи-
вымъ, то должно предписать слѣдующее поло-
сканье:

Возьми травъ шалфейной.	RC. Herb. salviae.
Вигуновой.	Anthos.
Лавендуловой.	Lavendulae.

Цвѣтовъ

Цвѣтотъ садовой ромашки.

Flor. chamimil. Romanæ.

Душицы.

Origani.

Тимьяновыхъ верхушекъ по 2 щипоты. отвари въ молокѣ, взявъ онаго фунтовъ 2, и вели полоскать ротъ.

Thymi aa pugil. II. coq. in lactis libr. II. jubeas collui os.

Или вмѣсто онаго предписать надлежитъ слѣдующее сосательное лекарство (eclegma):

Возьми склизы блохина съмляни. RC. Mucilag. psyllii.

Бѣлой прозрачной камеди по 2 золотника.

Gummi tragacanthæ aa dr. II.

Масла сладкаго миндаля.

Ol. amygd. d.

Фіалковаго сиропа по 1 унцу.

Syr. violar. aa. unc. I.

Кипова мотга.

Sperm. ceti.

Бѣлаго сахара по 2 золотника.

Sachar. alb. dr. II.

Шафрана 20 гранъ.

Crocī scrup. I.

Смѣшай и слѣлай сосательное лекарство, котораго часть, взявъ въ ротъ больной, долженъ качать въ ротъ, сосать оное и мало по малу глотать, запивая настойкою изъ вероники и цвѣтовъ дикаго маку составленною.

M. f. linctus, coque partem voluntet ægrotus in ore et successive solutam deglutiat, super bibendo decoct. ex veronica et flor. papaveris erratici confectum.

Въ сухомъ кашлѣ хорошо употреблять мягчительное лекарство съ сироломъ полевой горчицы, называемымъ Лобелиевымъ (syr. de erythimo Lobellii).

§ 980. Для укрѣпленія ослабшихъ частей полезно употреблять слѣдующую кашницу:

Возьми конфекта красныхъ розъ RC. Conservæ ros. rubr. 2 унца.

unc. II.

Конфекта багуноваго 1 унцъ.

Conserv. anthos unc. I.

Е 2

При-

Приготовленнаго янтаря.

Кашнирыллового порошка по 1 золотнику.

Померанцовога сиропа, сколько потребно, смѣшай и давай по чайной ложкѣ нѣсколько разъ въ день.

Saccini præparat.

Polv. cascariillæ aa dr. I

Syr. avrant. q. s. m. detur cochleare theanum aliquoties de die.

§ 981. При пользованіи кашля не должно пускать крови, когда придутъ въ истощеніе силы; бесполезно также предписывать проносныя лекарства, когда кашель будетъ сухъ и причинился хрипота. Не долженъ также больной употреблять сахарныхъ закусокъ и другихъ съ сахаромъ приготовленныхъ кушаньевъ, когда кашля причиною будутъ ипохондрія и находящаяся въ желудкѣ кислота. Въ сильномъ кашлѣ вредно давать опійныя лекарства, послѣдствіемъ оныхъ никакой не приносящъ пользы, но еще причиняющъ великой вредъ. Еслии кашель воспослѣдовалъ опію вогнашой внутрь острой магне-ріи, налр. коросты; то должно предписать пощевое лекарство, налр. сѣрыныя цвѣты съ лотковою сурьмою. Впрочемъ Г. Гулмъ совѣщаетъ во всякомъ застарѣломъ кашлѣ употреблять лосеюной воздухъ такимъ образомъ, какъ сказано при способѣ лечить каменную болѣзнь.

ГЛАВА XLII.

О леченіи икоты de curatione singultus.

§ 982. Чтобы больнаго вылечить опію икоты (§ 529); то во первыхъ надлежитъ употребить

лишь судороги лицевпріемнаго горла и дерготныя движенія желудка ; а наконецъ укрѣпить выше-сказанныя часпи.

§ 983. Первое исполнить можно помощію противосудорожныхъ лекарствъ, употребляемыхъ безъ всякаго примѣса *олія*, коковы еснъ *Гофманскія* утолительныя капли, смѣшанныя съ каплями оленя рога съ янтарежъ пригото-
вленными ; (*liquor mineralis anodynus Hoff. cum liq. cornu cervi succinato*), наипаче, когда икота опъ про-
спуды и сему подобныхъ причинъ приключится.

Еслии икота происходитъ опъ кислоты, находящейся въ желудкѣ, то Должно предписы-
вать всасывательныя порошки.

§ 984. Еслии икота приключиласъ опъ вогнашой внутрь острой матеріи, то надле-
житъ прикладывать къ яшкамъ нарывныя пла-
стыри ; а внутрь давать пошовыя лекарства.
Хорошо также употреблять деревянное и мин-
дальное масло.

§ 985. Когда икота воспослѣдовала опъ великаго изліянія крови ; то хорошо употре-
блять растворительныя, вязательныя и упо-
лительныя лекарства ; также пускать кровь.
Въ семъ случаѣ имѣетъ похвальное дѣйствіе
слѣдующая микстура :

Возьми воды бузиновыхъ цвѣтовъ	RC. Aq. fl. sambuc. unc.
4 унца.	IV.
Перегнанатаго укуса : унцѣ.	Acet. dest. unc. I.
Упоипельныхъ Гофмановыхъ	Liq. anod. m. Hoff.
капель подзолотника.	dr. semis.

Сирона дикаго маку полунца
см. и дараѣ положиѣ всякѣ
при часа.

Syr. p. Rheaddos unc
f. m. d. cochl. omni
trihorio.

Полезно также спавить промывательныя и
опускать руки въ теплую воду.

§ 986. Для укрѣпленія ослабыхъ частей
должно предписывать :

Мясную,

Пчельниковую и
Коричневую воду.
или

Aqv. menthæ,
eliffæ et
Cinnamomî.
five

Вѣтроразбивательную Дори-
келѣву воду.

Aqv. carminat. Dorn-
crelii.

Вѣтроразбивательныя Веделѣ-
евы капли и

Ess. car. Wedelii et

Трехчастной вѣтроразби-
вательной спиртъ.

Spirit. carminat. de
tribus.

Снаружи можно намазывать животъ мазью, со-
спавленною изъ масла мушкатнаго орѣха, ма-
сла мушкатныхъ цвѣтовъ, и мятлиаго масла.

Впрочемъ надлежитъ вѣдать, что когда ико-
пы приключится отъ анпонова огня или помер-
венія желудка, либо грудобрюшной перепонки;
то всегда предзнаменуетъ скоро послѣдовать
имѣющую больного смерть.

ГЛАВА XLIII.

О леченіи трелетанія или трясенія сер-
дца de curatione palpirationis cordis.

Еслили трелетаніе сердца (§ 532) будетъ
происходитъ отъ сильнаго спремленія крови,
что

что полной и твердой пульсъ довольно подтвердитъ въ состояніи; то сначала должно пустить кровь, а послѣ предписать противосудорожныя, растворяющія и разводящія лекарства, каковы то есть послѣднія лекарства и тогда давать должно, когда причиною прерыванія сердца будутъ густота крови и закипѣ оныя, каракатицею или полиллою обыкновенно называемой.

§ 988. Еслили *трясеніе* или *трепетаніе сердца* приключится отъ запоровъ и задержанныхъ въ животѣ въправъ; то должно спавить промывательныя и предписывать легкія слабительныя лекарства. А еслили причиною оного будутъ сильныя кровоточенія; то полезно употреблять крѣпительныя и вязательныя лекарства, каковы сушь:

Тяктура красныхъ розъ.

Tinct. ros. rubr.

Бархатныхъ цвѣтовъ съ ландышевою или вишневою водою.

Flor. belidis cum
aqu. lil. convall. vel
ceras. nig.

Можно также давать пить лимонной сокъ съ сиропомъ изъ цвѣтовъ 4 сердечныхъ или крѣпительныхъ травъ приготовленный.

§ 989. Еслили прерываніе сердца воспослѣдовало отъ ломотной, коростной, и другой какойлибо высыпной матеріи; то должно предписывать поповыя, такъ какъ чай употребляемыя, лекарства.

Еслили же будетъ причиною трясенія сердца, какъ уже о томъ выше сказано, кровяной за-

жипѣ въ сердцѣ, котораго закипа признаками быва-
ютъ неровное и перерывающееся бѣненіе жилъ, бѣненіе
въ шейныхъ крововозвратныхъ жилахъ, и трудное
дыханіе; по должно пустить кровь, а потомъ
давать соки изъ травъ, разбивательную силу
имѣющихъ, каковы сущь:

Одуванчики.

Волчій корень.

Виндигей.

Салатъ и проч.

Herb. taraxaci.

Scorzonera.

Endivia.

Lactuca.

Которые соки должно давать пить съ сла-
бою и жидкостію листовою винохлебен-
ной земли. А наконецъ предписывать укрѣпляю-
щіе сосуды лекарства, каковы сущь: пердан-
ская корка и съ желѣзомъ приготовленные ле-
карства.

ГЛАВА XLIV.

О леченіи плясанія святому Виту или
плясательнаго буйства de curatione cho-
reae sancti Viti.

§ 990. Плясаніе святому Виту или пляса-
тельное буйство (§ 539) лечится кровопу-
сканіемъ, проносными и наконецъ крѣпительны-
ми лекарствами; почему, дабы укрѣпить ослаб-
лыя нервы, можно употреблять слѣдующую ка-
шицу:

Возьми приправы или консервы RC. Conservae anthos et
балдырьяновой и помаранцо- flaved. corr. angraut
выхъ корокъ по : унду. aa unc. I.

Бузиц-

Бузиноваго взара полуниц.

Андромехова есрѣнка і золот-
никъ.

Приравненнаго мушкатнаго
орѣха.

Гиацинтоваго порошка по пол-
злотника.

Цикорнаго сиропа вкупѣ съ
ревенемъ составленнаго, сколь-
ко поспредно, смѣшай и давай
почайной ложкѣ чашырежды
въ день и больше.

Rob. sambuc. unc. f.

Theriac. Andromach.
dr. I.

Nucis moschatæ cond.

Specier. de hyacintho
aa dr. f.

Syr. de cychoreo
cum rhabbarbo q. f.
m. d. coch. theanum
quater de die & plus.

§ 991. Снаружи поспребно намазывать спано-
вую жилу слѣдующею мазью.

Возьми свиннаго сала і унцѣ.

Двленнаго масла изъ муш-
катнаго орѣха.

Масла Вагунтоваго.

Лавендуловаго.

Рутнаго.

RC. Axungiae porcinae
unc. I.

Olei nunc. mosch.
expressi.

Rorismarini.

Lavendulae.

Rutæ.

Смѣшай и намазывать спину; или выѣшто сса мизи дол-
жно звать і унцѣ животнаго Дипелісса масла и напи-
рать становую кость почаще.

Хорошо также употреблять въ семѣ припад-
кѣ наипаче въ малыхъ дѣтяхъ опварѣ изъ ло-
миринковыхъ листовъ одинъ, или вмѣстѣ съ
жибарой либо съ перункою коркою; когда
того требовать будутъ обстоятельство.

Очпрям матерія выводится изъ тѣла, либо
прикладываніемъ снаружи испанскихъ мухъ, ли-
бо электрачежамъ огчемъ. Впрочемъ должно
знать, что припадокъ сей проходитъ съ лѣпа-
ми молодыхъ больныхъ.

ГЛАВА XLV.

О леченіи падучей болѣзни или черной немочи de curatione epilepsiae.

§ 992. Падучей болѣзни или черной немочи (§ 546) лечение производится такъ; во первыхъ надлежитъ умѣрить острую, раздражающую чувствительныя жилы матерію и укротить жестокость судорогъ и сведеній; а наконецъ, укрѣпить судорогами приведенныя въ слабость части.

§ 993. Остроту умѣряютъ и утоляютъ растворимельные отвары. Въспоможе обыкновеннаго питья надлежитъ употреблять отваръ изъ:

Пшоннаго корня.	E rad. poeniz.
Волчьея корня.	Rad. scorzomeræ.
Сарсапарилла.	Rad. sarsaparillæ.
Скобикъ оленя рога.	Rad. corn. cervi.
Сѣмянъ волосаго укропа	S. foeniculi &
и коринья.	Rassul. minoribus.

§ 994. Иные чрезвычайно похваляютъ хрѣстительной черной порошкѣ. Чпужъ касается до меня, то я никакого хорошаго дѣйствія сего порошка не видѣлъ. Напрошивъ можусъ великое имѣетъ дѣйствіе въ падучей болѣзни, естли его, начиная отъ двухъ гранъ, даватъ постепенно больнымъ.

Однако должно знать, что сіе лекарство не всѣ больные терпятъ могутъ; почему въспомо онаго должно предписывать камфору или камфарную микстуру, какова естли сія:

Возьми камфоры ползолотника.	Camphor. gr. f.
Каиарскаго сахара.	Sachar. canap.

Склязи,

Склизи Арапской камеди по :
золотнику.

Смѣшавши хорошо въ ступѣ,
прибавь :

Горячаго укуса полунца.

Воды бузиновыхъ цвѣтовъ 6
уницовъ.

Сиропа изъ цвѣтовъ полевого
маку 1 унцъ.

Смѣшай и давай по ложкѣ
прижды въ день.

Иногда можно прибавить къ минстурѣ сей и утоля-
тельныхъ Зидентамовыхъ капель отъ 20 до 30.

§ 995. Спину, или спановую жилу должно
напирати шеплымъ сукномъ, а послѣ намазы-
вати жилокрѣпительною мазью, копорую можно
составить слѣдующимъ образомъ :

Возьми свиняго сала.

Мази сѣ желѣзомъ составлен-
ной по 1 унцу.

Перегнашаго Лавендуловаго ма-
сла 1 золотникъ.

Перегнашаго же масла изъ ба-
гуновыхъ цвѣтовъ.

Масла шалфейнаго.

Давленато масла изъ мушнат-
нато орѣха по полтора золот-
ника.

Перегнашаго янтарнаго и
рушнаго по ползолотника.

Сдѣлай мазь и намазывай озна-
ченныя части.

Mucitag. g. Arab. aa
dr. I.

His, invicem bene tritis
in mortario, adde :

Aceti calidi unc. f.

Aq. fl. samb. unc.
VL

Syr. flor. papaver.
erg. unc. I.

M. d. coch. ter de
die.

RC. Axungia porcina.

Ung. mart. aa unc. I.

Ol. dest. lavendulae
dr. I.

Ol. stil. flor. anthos.

Ol. salviae.

Ol. nucis moschat.
express. aa dr. I. &
semis.

Ol. succin. destil. &
rutae aa dr. semis.

M. f. unguentum, quo
innung. signatae partes.

§ 996. Еслили падучая болѣзнь приключилась
отъ оспрой внутри вогнапой материн, то
вдругъ надлежитъ выводить оную изъ тѣла
помощію поповыхъ лекарствъ, либо нарывныхъ
пластырей.

§ 997.

§ 997. Если же причинили оную сильныя и нестерпимыя боли; то должно постыгнуть промывательное, а внутрь дать какое нибудь успокоительное лекарство.

§ 998. Если падучую болѣзнь причиняютъ въ нутри находящіяся глисты; то должно употреблять противоглистныя лекарства.

Наконецъ должно сказать, что отваръ изъ померанцовыхъ листьевъ одинъ, или съ камфорою употребляемый въ леченіи падучей болѣзни, весьма хорошее имѣетъ дѣйствіе; о чѣмъ пространнѣе смотрѣть должно въ небольшомъ сочиненіи Г. Лохера, извѣстномъ подъ названіемъ, практическихъ наблюденій о любострастной болѣзни, падучей болѣзни и прочая, которое сочиненіе и на Русской языкъ переведено.

Г Л А В А XLVI.

О леченіи обмороковъ *de curatione lipothymiaum.*

§ 999. Въ обморокѣ (§ 550) полезно употреблять лекарства, возбуждающія жизненные соки; каковы сущь: жгѣлительныя и чихотныя лекарства:

Вода ландышевая.	<i>Aqua lil. convall.</i>
Вода багуновыѣхъ цвѣтовъ.	<i>Flor. anthos.</i>
Вода Венгерская или желтая вода.	<i>Aqua Hungarica.</i>
Также летучій спиртъ оленяго рога.	<i>Spirit. vol. corn. cervi.</i>
Спиртъ нашатырной соли.	<i>Spir. sal. ammon.</i>

Жи-

Жизненной бальсамъ Гофмановой или крѣпительныя Гофманскія капли.

Balsam. vitæ Hoff

§ 1000. Еслили обморокъ приключится при кровопусканіи; то должно приложить къ ноздрямъ немного либо уксуса, либо спирта оленья рога съ янтарею приготовленнаго, и окропить лице холодною водою.

§ 1001. Еслили обморокъ случится у женщинъ отъ остановленія теченія мѣсячныхъ кровей, и слѣдственно спраждающихъ маткою; то полезно употреблять микстуру, составленную изъ:

Капель бобровой струи,
Волеупотительныхъ гофмановыхъ
И не большаго количества
противояднаго Вуссева спирта.

Ex ess. castorei,
Liquor. anod. m.
Hoff.
Et pauxillo spir. Bezoard. Russii.

Впрочемъ должно всегда взирать на причины, причиняющія обмороки, и взглядомъ оныхъ лечить больныхъ, спраждающихъ оными.

Еслили обморокъ приходитъ отъ великой слабости, то надлежитъ какъ лице, такъ и руки обмывать теплымъ виномъ, а душистыхъ водъ, какъ большее еще причиняющихъ расслабленіе, совсѣмъ употреблять не должно. Спраждающихъ маточною болѣзнію женщинъ ободрять должно вонючими веществами, каковы супъ чертоваго духъ (ass. fetida), бобровая струя (castoreum), вонючее виннолаженное и янтареое масло и прочая.

Обмо-

Обморокѣ, отъ сыпильныхъ ядовъ возпослѣдовавшій, надлежитъ пользоваться употребленіемъ кислыхъ лекарствъ, каковъ напр. есть уксусъ.

Задушеннымъ не худо вздыхать въ легкое воздухъ, пакъ называемой дефлогистированной, лишенный то есть излишняго горючаго начала, каковъ получается изъ селитры, и ей подобныхъ веществъ.

Новорожденныхъ обмирающихъ младенцовъ должно пользоваться купаніемъ въ водѣ, съ душистыми крѣпительными травами наспояиной, съ примѣшеніемъ къ оной небольшого количества вина, или выпущеніемъ нѣкотораго количества крови изъ пупка, когда по примѣтамъ обморокѣ и обмираніе будущъ происходить отъ многокровія.

Замерзшихъ отъ стужи людей не должно вносить вдругъ въ теплое мѣсто, но согревать ихъ мало по малу. Сначала надлежитъ покрыть замерзлое тѣло снѣгомъ, а потомъ слегка шерсть оное; наконецъ должно спарать-ся дать имъ испить теплаго чаю съ виномъ, и привести ихъ въ движеніе. Что когда въ нихъ примѣчено будетъ; то вдругъ должно перенести таковыхъ въ теплое мѣсто.

Утопшихъ оживлять надлежитъ преніемъ конечныхъ частей ихъ тѣла, поспавленіемъ острыхъ промывательныхъ, каковы супъ: табашной дымъ и постоянный воздухъ, и произведеніемъ въ ихъ дыханія. Наконецъ даваніемъ

емъ рвотныхъ лекарствъ, изъ коихъ Руландоза вода первое имѣетъ преимущество, которой отъ 6 до 12 золотниковъ давать можно.

Упопшимъ, ежели зѣвы оныхъ, такъ засорены будутъ иломъ, что отъ того никакъ вздохнуть не будутъ въ состояніи, надлежитъ дѣлать горлоотробоженіе, дабы такимъ образомъ возбудить въ нихъ дыханіе.

Обмершихъ людей отъ захлаго воздуха должно возбуждать окропленіемъ холодною водою, обмываніемъ конечныхъ часпей ренскимъ уксусомъ и поставленіемъ промывательныхъ изъ уксуса же.

Пришибленныхъ громовыхъ перуновъ, которой двоякимъ образомъ умерщвляетъ людей, 1) такъ какъ электрическій огонь, 2) такъ какъ мамерія, отъ которой портится воздухъ и дѣлается неспособнымъ къ дыханію, пользовавъ надлежитъ такимъ образомъ, какимъ пользуются замершіе отъ сыпильныхъ испареній и захлаго воздуха, очемъ неоднократно уже говорено было.

ГЛАВА XLVII.

О леченіи сонливости, холоднаго сна и сна безчувственнаго de curatione Comatis, Lethargi & Cari.

§ 1002. Сонливости или спачки (§ 558), безпросыпнаго или холоднаго сна (§ 559), и сна безчувственнаго (§ 560) леченіе состоитъ въ томъ, чтобы

чтобы первѣ возбудить опѣ сна больного; потомъ истребить застои и просидѣніе крови; а наконецъ возвратить прежнюю крѣпость мозговымъ сосудамъ.

§ 1003. Первое совершается пущеніемъ крови изъ ноги и лепучими солями, каковы суть: нашатырный спиртъ съ известію приготовленной, и дымъ зажженныхъ лервевъ, также прикладки составленныя изъ:

Розоваго и рупинаго уксусовъ,	Ex acet. rosarum.
	& rutæ.
Чиберовыхъ верхушекъ.	Somitat. satureiæ.
Бронной смруи.	Castoreo.
Капфори и	Camphora &
Горчичнаго сѣянн.	Sem. sinapis.

§ 1004. Еслили внутри находится клѣйкая, вязкая и желчная матерія; то попотребно дать рвотное лекарство.

§ 1005. Кровяные застои можетъ разбить микстура изъ янтарныхъ и сабуровыхъ калелъ, окупъ съ ландышевымъ спиртомъ. (ess. fuccini, aloes & fr. lili convallium).

§ 1006. Влаги опшводятся опѣ головы посредствомъ нарывныхъ пластырей, къ ногамъ или шеи прикладываемыхъ, или помощію промывательныхъ лекарствъ, и банешнаго кровопусканія изъ запялка. (scarificat. cruenta).

§ 1007. Еслили сонливостъ или безчувственной сонъ прикинутъ къ оспрымъ и воспалительнымъ лихорадкамъ; то надлежитъ
вдругъ

вдругъ пустить кровь, а послѣ сдѣлать промывательныя и дѣлать приличные приклядки.

§ 1008. Въ снотворныхъ болѣзняхъ не должно употреблять сыпильныхъ, опійныхъ и еерікальных лекарствъ. Также избѣгать надлежитъ теплыхъ и парныхъ бань. Желудокъ всегда должно сохранять свободнымъ. Просѣдшую кровь изъ своихъ соудовъ надлежитъ употреблять помощію операций.

ГЛАВА XLVIII.

О леченіи круженія въ глазахъ *de curaratione vertiginis.*

§ 1009. Круженія и потемнѣнія въ глазахъ (§ 562.) леченіе совершается пѣмъ, чтобы первѣе разбить стоячія въ головѣ мокроты, и, разбивши, отвесить къ низшимъ частямъ пѣла; наконецъ, чтобы ослабшій чувствительныхъ жилъ составъ укрѣпить и утвердить.

§ 1010. Прежде всего надлежитъ очистить первыя пути, потомъ пустить кровь изъ ноги; наконецъ спавить ноги въ теплую воду. Если круженіе воспослѣдовало отъ остановки Геморройнаго или мѣсячнаго кровотеченія; то должно сдѣлать промывательныя лекарства.

§ 1011. Весьма часто случается, что круженіе какъ въ глазахъ, такъ и головѣ, про-

исходитъ отъ разслабленности желудка. Почему въ такомъ случаѣ экстракты или горькія капли, каковы сущь Минзихповы, съ возделенною можно употреблять пользою.

§ 1012. Для укрѣпленія желудка похваляется также слѣдующая каша:

Возьми дубоваго яху или омелы. RC. Visci querni.

Кашкарыллового порошка по 2 Pulv. cascarill. aa

золотника. dr. II.

Сжущеннаго сока или экстракта пошовой травы, чернополохомъ иначе называемой, и золотника.

Extract. cardui benedicti dr. I.

Гвоздики 20 гранъ.

Coryophyl. scrup. I.

Барбарисоваго сиропа сколько потребно.

Syr. berberum q. s.

Смѣшай, сдѣлай кашу и дай по чайной ложкѣ нѣсколько разъ въ день.

M. f. electuarium, d. cochlear theanum aliquoties de die.

Впрочемъ надлежитъ смотрѣть, не отъ изливающейся ли крови въ мозгъ происходитъ круженіе, котораго три вида бываютъ: простое, темное, причиняющее по естѣ темноту въ глазахъ и пелену, или паденіе причиняющее, что естѣли примѣчено будепъ, то должно сдѣлать операцію, черепопросверленіемъ (trepanatio) называемую, и такимъ образомъ изъять закипѣлую кровь.

Женщинамъ, страдающимъ круженіемъ въ глазахъ, надлежитъ пособлять Утолительными Зиденгемовыми каплями. А страдающимъ запорами и завалами, пропускными и разбивательными лекарствомъ.

Сла.

Слабыхъ и лихихъ людей, кромѣ вышесказанныхъ крѣпительныхъ лекарствъ, можно еще пользоваться холодными банями зимою, а лѣтомъ купаніемъ въ чистой водѣ.

ГЛАВА LIX.

О леченіи сильной задумчивости или меланхолическаго сумасбродства и бѣшенства
de curatione delirii melancholici et maniaci.

§ 1013. Меланхолическаго сумасбродства (§ 567) и бѣшенства, лечительныя показанія суть таковы: чтобы первѣе остановить стремленіе крови къ головѣ и опивестъ оное къ низшимъ часпямъ пѣла, и такимъ образомъ привести въ порядокъ спасительныя испраженія; наконецъ, чтобы возвратить прежнюю мозговымъ оболочкамъ крѣпость.

§ 1014. Кровь опиводится отъ головы пусканіемъ изъ ноги крови; слабительными лекарствами, промывательными и банями, а когда пройдетъ нѣсколько дней, то надлежитъ пустить кровь изъ руки.

§ 1015. Изъ теплицъ особливо похваляющся въ семъ случаѣ Имперскія, а естли банились въ оныхъ не позволяютъ обстоительства, то я ссвѣнную употребляю ванны, приготовляемыя изъ мяты, мячителныхъ травъ и корней, таковы суть просфирки и большой просфир-

накъ ехулѣ съ жорнемъ, листьями и цѣтлами
онихъ, льняное сѣмя и отрубы.

§ 1016. Въ свободные дни, въ которые по
есть недаюся проносныя лекарства, надлежитъ
употреблять порошокъ, составленный изъ :

Марѣинова порошка.

E pul. marchionis.

Оленья рѣга, философически
приготовленного.

Cer. e. philosophice
preparat.

Разносорного гѣциптоваго
порошка.

Sp. de hyacintho.

Перечищеной селитры.

Nitri depurati.

Приготовленного янтаря.

Sacchari prepat.

Кинобаръ и нѣсколькихъ
грановъ мускуса.

Cinnabar et aliquot
gr. Moschi.

Хорошо также пользоваться сумашедшихъ дво-
нымъ укусомъ и померанцовыми листьями, раз-
нообразно употребляемыми.

§ 1017. При леченіи меланхоліи или мелан-
холической сумашестія или бѣшенства не дол-
жно предписывать сильныхъ рвотныхъ и проно-
сныхъ лекарствъ. Также не должно давать
опійныхъ лекарствъ и употреблять нарывныхъ
пластырей, предписывать поповыхъ веществъ и
курить табакъ. Въ питье же надлежитъ да-
вать одну только ключевую воду.

Впрочемъ должно смотрѣть на причины бѣ-
шенства, и такимъ образомъ поступать въ ле-
ченіи съ больными.

Иногда должно употреблять и нравственность,
которая при леченіи сумашедшихъ иногда все
дѣло леченія желаннымъ вѣнчаетъ концемъ.

Чрез-

Чрезвычайную раздражительность или чувствительность должно пользоваться крѣпительными лекарствами, изъ каковыхъ первое мѣсто занимаютъ: зѣробойныя цѣлѣны въ отъарѣ употребляемые, одни или съ небольшимъ количествомъ перемѣнаго уха. Не худо также въ семъ случаѣ прививать коросту и производить лихорадку.

Наконецъ должно знать, что, прислучаѣ не-знанія причинъ, камфора мало помалу употребляемая, весьма хорошее производитъ дѣйствіе, въ чемъ однакожъ съ искусствомъ поступать должно.

ГЛАВА I.

О леченіи боязни отъ воды или неистовства, отъ угрызенія бѣшеной собаки происходящаго *de curatiōe rabiei Caninae five hydrophobiae.*

§ 1018. Неистовство, отъ угрызенія бѣшеной собаки приключившееся, обыкновенно боязнію отъ воды (§ 573) называемое, пользуется, когда къ угрызенной бѣшеною собакою части, сдѣлавши прежде глубокую наѣчку на оной, великую поставитъ банку для выведенія крови, въ чемъ однакожъ осторожно поступать должно; или когда угрызенную часть прижечь раскаленнымъ желѣзомъ, дабы такимъ образомъ учинить загноеніе, въ семъ случаѣ весьма полезное и необходимое.

§ 1019. Изъ лекарствъ, внутрь употребляемыхъ похваляется слѣдующій порошокъ:

Возьми листовъ шалфейныхъ.	RC. Fol. salviae.
Рутныхъ.	Ruthae.
Буковичныхъ.	Betonicae.
Желѣзняковыхъ.	Verbenae.
Пчельниковыхъ.	Fol. melissae.
Зѣробосныхъ.	Hyperici.
Золотысячниковыхъ.	Centavrii m.
Корня ангельской сладости по и золотнику.	Rad. polypod. aa dr. I.
Смѣшай, сдѣлай порошокъ и давай понемножку часто въ день.	M. f. pulv. d. pauxil- lum saepius de die.

§ 1020. Чтожъ касается до особыхъ или нарочитыхъ отъ сего припадка снаружи употребляемыхъ лекарствъ, то не весьма много на оныя полагаться должно. Таковыя вздорныя лекарства, иначе симпатическими называемыя, суть: леченка и сердце бышеной собаки, аженные рѣзки и посыпанные на рану; также жуки, ловленные въ май мѣсяцъ и задушенные въ меду, а наипаче волосы вкусившей собачки приложенные къ ртнѣ; чтожъ принадлежитъ до рпушныхъ, снаружи употребляемыхъ лекарствъ, то сія немалую могутъ приносить пользу.

Еслили же ядъ проникнулъ уже въ тѣло и заразилъ составъ чувствительныхъ жилъ; то кромѣ вышесказаннаго порошка, также мускуса, камфоры, и очнаго цвѣта или горченной помощи (anagallis), нехудо еще употреблять слѣдующій составъ Г. Шеле:

Возьми

Возьми маселъ, числомъ 8.	RC. Scarab. majal. n. VIII.
Андромахова верѣлка полунца.	Theriac. Andr. unc. f.
Депучей соли, оленья рога а золошника.	Sal. vol. s. s. dr. II.
Камфоры і золошникъ.	Camphor. dr I.
Миндерерова спирта 8 унцовъ.	Spirit. mindereg. unc. VIII.

Смѣшай и давай поемножку въ то время, когда при-
мѣченно будетъ, что какъ попомъ, такъ и ночью можно
будетъ вывести ядъ изъ шѣла.

Олія употреблять не должно, для того,
что въ семь припадкѣ опій никакого дѣйствія
не оказываетъ, попому, что въ сей болѣзни
такой родъ чувствительныхъ жилъ заражается,
которой никакой гармоніи или никакого согласія
съ прочими чувствительными жилами не имѣетъ.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ.

ОТДѢЛЕНІЕ II.

О леченіи лихорадокъ.

ГЛАВА LI.

О леченіи лихорадокъ вообще *de curatione februm in genere.*

§ 1021. Всѣ лихорадочныя припадки имѣютъ свои извѣстныя причины, по которымъ можно узнавать и различать лихорадки; почему о припадкахъ такъ, какъ о дѣйствіяхъ причинъ разсуждать должно. Ибо кто въ состояніи истребить причины, тойъ въ состояніи уничтожить и припадки.

§ 1022. Ближайшія причины перемежающихся лихорадокъ суть: мокротная, желчная и черно-желчная лихосць, худоба или худосочность: оспная и кислая чаперія и остановленіе испарины; а наименѣе пренебреженныя и брошенныя испражненія, разнообразно чинимыя, то посредствомъ то есть рвотныхъ лекарствъ, то слабительныхъ, то кровопусканій.

Почему во всѣхъ перемежающихся лихорадкахъ лечительныя мѣры нуды усмремлены: чтобы первѣе испражнить вязкую, клейкую и желчную массу, та первыхъ путяхъ находящуюся, и унять кислоту; потомъ истребить, гдѣ либо

на-

находящіяся завалы, и наконецъ укрѣпить разслабленные внутренности.

§ 1023. Чтобы достигнуть взглядомъ перваго показанія до желанной цѣли, то должно дать рвотное поутру, а въ вечеру, когда больному пора будетъ ложиться спать, по обнѣй или разбавительный порошокъ изъ распускаемаго виннаго камня и сурьмяной селитры (*pulvis digestivus ex tart. solubili et nitro antimoniato*). Рвотное же лекарство можно предписать слѣдующимъ образомъ:

Возьми рвотнаго виннаго камня *RC. Tart. emetici. gr. II.*
2 грана.

Окупорошеннаго виннаго же
камня 15 гранѣ.

Зло пахнущей сурьмяной
сѣры третей осадки 1 гранѣ.

Tart. vitriolat. gr. XV.

*Sulphur. antimon. ap-
rat. tertiae præcipit.
gr. I.*

Смѣшай, раздѣли на 2 рав-
ныя части, и дѣлай черезъ
часъ по 1 порошку, либо и
обѣ части на одинъ прѣмѣ.

*M. d. in II. part. æq.
detur unus pulvis. Do-
sa præterlapia. una
vel totus pro dosi.*

Хорошо также употреблянь для произведенія
рвоты и слѣдующіе составы:

Возьми рвотнаго виннаго камня *RC. Tart. emetici gr. III.*
3 грана.

Перегнашой мятной воды 3
унца,

Смѣшай и дай на одинъ прѣ-
мѣ, или на два, которые че-
резъ часъ принять должно.

*Aq. stillat. menthæ
unc. III.*

*M. f. potio pro dosi
una vel duabus vici-
bus sumenda.*

или

Возьми порошка рвотнаго
корня 20 гранѣ.

*RC. Pulv. rad. ipecacuanhæ
scr. I.*

Рвотнаго виннаго камня 1 грань.	Tart. emet. gr. I.
Чистаго бѣлаго сахара 10 грань.	Sachari alb. gr. X.
Смѣшай и дай на одинъ прѣ- емъ.	M. d. pro dosi.

Малымъ же дѣтямъ для возбужденія рвоты можно давать морехолуковой уксусъ (acet. scillit.), взявъ онаго 20 капель, и смѣшавъ съ соразмѣрнымъ количествомъ розоваго меда.

§ 1024. Чпожъ принадлежитъ до втораго показанія, по оному удовлетворить можно, размягчательными и притупляющими остропоу лекарствами; также пособными, разбавительными и средними солями (salia digestiva et neutra).

§ 1025. Въмѣсто обыкновеннаго питья надлежитъ употреблять тонкой отваръ изъ:

Хины или лихорадочнаго корня.	E radice chinae.
Волчьего корня.	Rad. scorzonerae.
Ячменя.	Hordeo.
Лимонныхъ корокъ и коринки.	Cort. citri et pass. minor.

III

Вмѣсто онаго одинъ ячной отваръ съ уксусомъ и медомъ.

§ 1026. Еслили бы находилось засореніе въ какой либо внутренности, причиняющее лихорадку; то въ таковомъ случаѣ должно предписывать горькія лекарства, каковы могутъ быть приготовлены изъ:

Золототысячника.	E centaureo m.
Чертополоха.	Card. benedic.

Рвотна

Ревеня и
Виннаго распускаемаго капиа.

Rhabbaro et
Tar. solubili.

§ 1027. Еспьли же таковыя лекарства не-
довольны будущь; по я совѣтую употреблять
сие лекарственное вино:

Возьми корня старолуэнииз.
Корня царскаго
Ангельской сладости по 1 зо-
лотнику.
Золотопысячниковой.
Трилиственниковой травы по
горсти.
Ревеневаго порошка.
Виннокаменной листовой земли
или еущественной виннокамен-
ной соли 2 золотника.
Сейгнетовой соли полунца.
Хорошаго вина 3 фунта.
Надей вышесказанныя веще-
ства, дай въ шепломѣ мѣстѣ
настоиться, послѣ сцѣди, и
давай по ложкѣ всякіе чешыре
часа.

RC. Rad. gentian. rubr.
Imperatoriae.
Polypod. aa dr. I.
Herb. centavr.
Trifol. fibr. aa m. I.
Pulv. Rhei.
Terr. fol. tart. dr.
II.
Sal. feignet. unc. S.
Vini boni libr. III.
Inf. supra dict. speci-
es in loco tepido, de-
inde decanta et da
cochleatim omni quad-
rihoriv.

§ 1028. Третье намѣренте, чптобы по есть
укрѣпить слабыя внутренности, исполнить мо-
жно употребленіемъ л-руанской съ кашкырыло-
вою коркою и потовою ожелѣзованною сурьмою
(antimon. diaphoret. martiato), или сего лекарства:

Возьми золотопысяшниковыхъ
верхушей 1 горсть.
Порошка самой лучшей перу-
анской корни.
Верхнихъ исмеранцевыхъ ко-
рокѣ поползолотника.
Винтеранской настоющей кор-

RC. Sumit. centavr. m.
I.
Pulv. cort. peruviant.
opt.
Flavel. cort. avrant.
aa unc. f.
Cort. vinter. veri

Калгановзго корня по 3 золо-
тника.

Корня Аароновой бороды

Сѣмянъ волоснаго укропа по
2 золотника.

Срубивъ, налей ренскимъ ви-
номъ, дай хорошо настояться
и давай передъ обѣдомъ и
ужиномъ по столовой ложкѣ.

Rad. galangæ aa dr.
III.

Rad. ari

Sem. fœnicul. aa dr.
II.

Incis. inf. vino Rhe-
nano dein, des coc-
cleare mensale pran-
dium ante & cenam.

Во время жара можно предписывать слѣдую-
щее, жаръ утоляющее, питье:

Возьми воды липовыхъ цвѣ- RC. Aq. flor. tiliae
товъ

Черныхъ вишенъ по 2 унца.

Приготовленныхъ раковыхъ
жировокъ.

Приготовленной перловой ма-
лки подзолотника

Перечищенной селитры 20
гранъ.

Сиропа изъ лимоннаго сока 2
золотника.

Смѣшай и давай всякѣе два
часа по половинѣ чайной ча-
шки.

Ceras. nigr. aa unc II.

Lap. canor. præparat.

Matr. perl. præparat.
dr. f.

nit. p. scrup. I.

Syr. acetos. citri dr.
II.

M. d. omni bîhorio
dimidium vasculum
theanum.

Учинившейся въ переменяющихся лихорадкахъ оп-
тискъ на языкъ означаетъ слабость нищеваритель-
ныхъ орудій; почему и въ семъ случаѣ употреблять
должно крѣпительныя лекарства а наипаче
ле уанскую корку съухъ съ сабельникомъ или
сердечнымъ корнемъ. (cum bîhorta).

§ 1029. При осторожностяхъ употребляе-
мыхъ въ практикѣ еще примѣчать должно,
что въ переменяющихся лихорадкахъ никогда
не должно пускать крови, развѣ смотря, ко-
гда

гда съ перемежающеюся лихорадкою будетъ соединена и желчная, и пульсъ будетъ полонъ и твердъ. Рвотныя лекарства съ самаго начала предписывать должно. Что остается тогда развѣ, когда другія будущія причины, не позволяющія употреблять рвотныхъ лекарствъ. Таковыя причины или обстоятельства суть: кровоизлияніе (hæmoptis), грыжа, (hernia), *) кровавая жартина, младенецъ, находящійся въ утробѣ, воспаленіе въ желудкѣ, печенихъ и селезенкѣ и наконецъ чахотка.

- о) Иные сочичители какъ къ кровоизлиянію, такъ и грыжѣ советуютъ давать рвотныя лекарства. Въ чемъ однакожъ спорножно поступать должно. Грыжу великъ подвязывать перевязками и давать почти безъ всякой опасности рвотное.

ГЛАВА II.

О леченіи ежедневной безпрерывной или
дурной простудной лихорадки *de curacione*
febris quotidianæ continuæ sive benignæ
catharhalis.

§ 1030. Ежедневной лихорадки иначе простудной, насморчюю или слезною дурною лихорадкою именуемой (§ 601), леченіе заключается въ такомъ, чтобы всякимъ образомъ способствовать обращенію мокротной матеріи къ наружнымъ частямъ, и сохранятьъ

въ порядкѣ испарину и наконецъ, чтобы уто-
лить острую, сѣрчистую и соленую матерію.

§ 1031. Первое совершается помощію умѣря-
ющихъ и легкой потѣ производящихъ ле-
карствъ; къ уменьшенію же мокротной матеріи
такъ какъ и самому изверженію оной изъ пѣла
поспѣшествуется грудными лекарствами; како-
ва есть теплая настойка изъ:

Солодковаго корня,	E rad. glycyrrhызe,
Бѣловопышника,	Herb. tuissilag. &
И винныхъ ягодъ пригото-	Fruct. ficum.
вленная.	

Изверженію мокроты хорошо пособляетъ и
грудной Мейбоймовъ бальсамъ, котораго со-
ставъ есть слѣдующій:

Возьми самаго чистаго Венеці-	RC. Therebinth. Venet.
анскаго перпеншина.	purissima.
Самаго чистаго и свѣжаго	Ol. amygd. d. recen-
масла сладкаго миндаля,	tissimi & purissimi,
Масла звѣробойнаго свѣжаго	Ol. hyperici recent.
же по 3 унца.	aa unc. II.
Самаго свѣжаго кипова мотга	Sperm. c. recentissimi
полунца	unc. f.
Самой чистой эминой крови.	Sang. dracon. purissimi.
Настоящаго перуанскаго баль-	Bals. peruvian. genu-
сана по 2 золотника	ini aa dr. II.
Опійнаго экстракта, посред-	Extr. opii ore aqua
ствомъ воды приготовленна-	præparati gr X.
го, 10 гранѣ.	
Смѣшай, свѣлай бальсамъ и	M. f. bals. dr. cum
давай по ползолотника либо	fero lactis vel infuso
сѣ свороткою, либо сѣ тра-	herbarum.
вяною настойкою.	

Котораго однакожъ бальсама, давать не дол-
жно, когда еще свирепствуетъ лихорадка, а
вмѣ-

вмѣсто онаго надлежитъ употреблять приличную пому эмульсію.

§ 1032. Чтобы уполинь острую сѣрчисную соленую матерію, то надлежитъ предписывать такъ называемыя усладительныя лекарства и тому подобныя молоки или эмульсіи. Такого рода молоко можно составить изъ сладкаго миндаля и сѣмян лотовой травы или кардовника (*C. card. marit.*). Ночной кисель въ семъ случаѣ также хорошее имѣетъ дѣйствіе.

Полезно также употреблять слѣдующее лекарство, а наипаче когда будетъ ощущаться перхотъ въ горлѣ:

Поэми масла сладкаго вин- RC. Ol. amygd. dulc.

для

Сиропъ женскаго волоса по 1
унцу.

Кипова мазга 2 золотника.

Смѣшай и давай по ложкѣ
всякѣ 3 часа.

Syr. capil. veneris aa
unc. I.

Sperm. ceti dr. II.

Melce. d. cochlear.
omni bihorio.

§ 1033. Практическія осторожности, при леченіи хорошей протрудной лихорадки употребляемыя, суть сіи: надлежитъ то есть вѣдать, что сѣ лихорадки чрезъ все теченіе оныя не должно лечить весьма горячительными и приводящими кровь въ сильное движеніе, также весьма крѣпкими проносными и рвотными лекарствами; ибо таковаго рода лекарства, въ лихорадочные припадки; каковы суть жаръ и жажда, гораздо больше еще умножаютъ. Еслии сдѣлается запоръ;

запорѣ; то должно спавить промывательныя, а наипаче тогда, когда причиною того будетъ оспановленіе мѣсячинъ у женщинъ.

Еслили будетъ мучить сильный кашель; то надлежитъ воздерживаться какъ отъ сладкихъ яствъ, такъ и отъ грудныхъ сладкихъ лекарствъ, а вмѣсто оныхъ употреблять эмульсіи, приготовленныя изъ сѣмянъ лотовой травы или жардовника, мажу и шафрану.

Еслили сія лихорадка возмѣла происхожденіе свое отъ оспавленнаго обыкновеннаго пусканія крови, или оспановленія гемоиднаго и мѣсячнаго кровопеченія, или отъ задержанія кровочищений у женщинъ; то въ такомъ случаѣ должно пустить кровь съ самаго начала лихорадки, въ противномъ же случаѣ, крови пускать никакъ не должно.

Чрезвычайной жаръ должно уполять лимоннымъ сокомъ, барбариснымъ сиропомъ и симъ подобными средствами.

Для уполенія жара хорошо употреблять Лохеревъ овсяной отваръ, которой готовится такъ:

Возьми очищеннаго овса 6 унцій.	RC. Aven. decoct. unc. VI.
Корня дикой цикорея полутора унца.	Rad. cichorei syziet f. unc.
Сандальнаго краснаго дерева полуунца.	Lig. fantal. rubr. unc. f.
Срубивъ, вари въ самой чистой и ключевой водѣ, взявъ оной фунтовъ 12, до тѣхъ	Recifa, coque cum aquæ font. libr. XII. ad consumptionem tertiorъ,

порѣ, пока до третьей части
выпрѣетѣ, остатокѣ слей въ
другой сосудѣ и придай
самой чистой селитры полу-
унца.

tis part. colaturæ ad-
de.

Nitri purissimi unc. f.

Бѣлаго сахара 2 унц.

Sachari alb. unc. II.

Вели употреблять вмѣсто обыкновеннаго питья.

Многіе похваляютѣ для утоленія жару и вол-
нованія крови сурьмяной киселѣ или сурьмяную
кислоту (*cluſſus antimonii*), которая естѣли бу-
детѣ недвоенная; то на одну мѣру воды или ка-
кого опшара можно брать ся кислоты 2 золоти-
ника, полунца и даже цѣлой унцѣ; а естѣли
будетѣ двоинная; то на одинѣ пріемѣ должно
брать 3, 5, 10, 15 или 20 капель.

Чтожѣ касается до содержанія больного; то
онѣ долженѣ больше находиться въ постелѣ,
нежели внѣ оныя.

ГЛАВА LIV.

О леченіи тридневной и четверодневной
безпрерывныхъ лихорадокъ *de curatione*
tertianæ & quartanæ continuarum febrium.

§ 1034. Способѣ леченія тридневной
(§ 605), и четверодневной безпрерывной же
(§ 609) лихорадокъ, совсѣмѣ сходствуетѣ со
способомѣ леченія и предосторожностями еже-
дневной безпрерывной лихорадки (§ 1030 . По-
чему лихорадки сіи такимѣ же образомѣ поль-
зовать должно, какѣ и ежедневную безпрерывную

лихорадку, исключая только то, чтобы не всегда употребляли одинъ пособный соли, но смѣшиваятъ оныя съ горькими лекарствами, для того, что одинъ соли большую еще причиняютъ слабость въ сихъ лихорадкахъ, а иначе въ четверодневной.

ГЛАВА LV.

О леченіи печеночной лихорадки *de causatione febris hepaticæ sive hepatitis.*

§ 1035. Послѣ причину печеночной лихорадки или ея паденія печени (§ 612) бываютъ кровяные застои въ печенкѣ, или засоренія и завады въ оной; для того все вниманіе свое должно обращать шуда, чтобы прежде разбить помянутые застои, а потомъ испребиить учинившіяся засоренія въ печенкѣ.

§ 1036. Кровяные застои испребляются кровопусканіемъ, растворяющими, разбивающими и легкій потъ производящими лекарствами, каковы супъ опвары приготовляемые изъ:

Коренья одуванчиковаго.	E rad. taraxaci.
Огуречнаго.	Borraginis.
Цикорияго и волчьяго корня.	Cichorei et scorzonerae.

Наилучше же употребляютъ слѣдующій опваръ:

Возьми коренья пирейнаго и одуванчиковаго.	RC. Rad. graminis et taraxaci.
Листовъ салатной сестры.	Fol. endiviae.
Огуречной травы по 1 унцу.	Borrag. aa unc. I.
Вари въ ключевой водѣ, взявъ оной фунтовъ 3, послѣ процѣди и придай:	Coq. in aqua font. libr. III. colat. adde:
Перечисленной селитры 2 ложника.	Nitr. d. dr. II.

Взваръ

Взвару красной споридины 6
золотниковъ.

Простата умсуснаго меда под-
тира унца.

Смѣшай и давай по 3 унца
теплаго всякѣ два часа.

Rhub. ribesiorum dr.
VI.

Oxymel. f. unc. I.
et f.

D. unc. III. caude
omni biborio.

§ 1037. Для испребленія запоровъ и заваловъ
въ печенкѣ хорошо употребляютъ горькіе экстрак-
ты съ жидко тѣю листовою виннокаменной зе-
млей (liquor terræ foliatæ tartari), ставятъ промы-
вательныя и дѣлають припарки.

Индѣйцы въ семъ случаѣ употребляютъ ртут-
ныя лекарства, но для насъ довольно будетъ
прикладываніе нарывныя, либо цихунныя или
лютиковыя пластыри (empl. de cicuta).

Вмѣсто промывательныхъ можно употреблять
слѣдующее соленое слабительное лекарство:

Возьми слабительной Глауберовой RC. Sal. mirab. Glauberi.
соли 1 унцѣ. unc. I.

Рвотнаго виннаго киния 2 Tart. emetici gr. II.
грна.

Водяныхъ речевыхъ капель
полтора унца. Tinctur. Rhei aquos.
unc. I. et f.

Ключевой воды 1 фунтѣ. Aq. font. libr. I.

Слази лельнаго розоваго сиро-
па 2 унца. Syr. ros. fol. unc. II.

Смѣшай и давай по 2 ложкѣ
всякой часѣ. M. dentur II. cochle-
ar. omni hora.

§ 1038. Впрочемъ должно избѣгать всякихъ
поострипелныхъ, волнующихъ кровь, вязатель-
ныхъ и опійныхъ лекарствъ.

Рвотнаго лекарства безъ очевидной причины
давать никогда не должно.

Кровь смотря по соспелости многокровія, привичкѣ, возрасту и крѣпости тѣла, либо совсѣмъ пускать не должно, либо пускатиь однажды, либо дважды, а больше никогда. Лучше же всего вмѣсто пусканія крови изъ руки или ноги, спавишь пиявицы къ золотымъ жиламъ.

ГЛАВА LVI.

О леченіи почечной лихорадки или бо-
слаленіи въ почкахъ *de curatione febris*
nephriticæ s. nephritidis.

§ 1039. Лечение почечной лихорадки или бо-
слаленія въ почкахъ (§ 616) производится такъ: сперва должно унять сильное спремленіе
крови; и разбить заспой оной въ почкахъ. На-
конецъ, виннокаменную матерію размягчить и
съ мочою вывести вонъ изъ тѣла.

§ 1040. Почему прежде всего надлежитъ пу-
стить кровь, а потомъ давать эмульсіи, со-
ставленныя изъ сладкаго миндаля и четырехъ
холодильныхъ сѣмянъ съ небольшимъ коли-
чествомъ селитры и камфоры. Также предписы-
вать порошки, изъ потовой сурьмы и противо-
судорожнаго Шнеллера порошка пригипиасиннаго.

Еслили необходимость потребуетъ слабитель-
наго лекарства; то паче прочихъ манну упо-
треблять должно. промывательныя же почти
всякой день спавишь поспребно, изъ числа коихъ
полезнѣе есть слѣдующее:

Возьми

Возьми ячиаго отвара 1 фунтѣ. RC. Dec. A. hard. libr. I.
 Венеціанскаго перченника, кѣ Theriacalh. venet. in
 личномѣ желткѣ распущен- vit. de ovi ferre de
 наго 3 золотника. III.
 Свѣтлаго хорошаго меда 1 унцѣ. Mel optima. unc. I.
 Сибшій и поставь. M. injiciatur.

Естьли будешѣ причину сея лихорадки на-
 клонность кѣ гемороеу; то надлежитѣ поста-
 вить пиявицы кѣ золотымѣ жиламѣ.

§ 1041. Чпожѣ касается до острой материи;
 то она сплгчается и принудяется мягче-
 пельными отварами, со палееными изѣ корень-
 екѣ и травѣ большаго дофрала, логви-
 рохѣ и солодкового корня; также средними со-
 лями составленными изѣ:

Распускаемаго виннаго камня.	E tartaro solub'i.
Двухсоставной или поликре- Arcano duplicato, five	
словой соли	sal. polycryst.
Съспавенной виннокаменной Et arcano tartari.	
соли.	

Снаружи можно прикладывать кѣ большому
 мѣсту сухіе мѣшечки, изѣ приличныхѣ кѣ тому
 нравѣ приготовленные, или мыльной Барбет-
 товоѣ глассьерѣ.

Вѣ вселеленіи мочеваго пузыря кромѣ обыкно-
 венныхѣ противовоспалительныхѣ лекарствѣ,
 полезно еще и снаружи намазывать лобковую
 сторону и заднепроходную промежность, та-
 кою обыкновенно называемую, нижеслѣдующею
 мѣслю:

Возьми деревяннаго масла 2 унца. RC. Ol. oliv. unc. II.	
Масла сладкаго миндаля 1 унцѣ.	Ol. mygd. dul. unc. I.

Камформ 20 гранъ.

Упокоительныхъ Готтфри-
выхъ капель 2 золотины.

Смѣшай, сдѣлай мазь и нама-
зывай показанныя части.

Camphoræ scrup. I.

Liquor. anod. m. Hoff.
dr. II.

M. f. ungu. inung.
institotæ partes.

§ 1042. Изъ внутрь употребляемыхъ лекарствъ
я примѣнилъ хорошее дѣйствіе слѣдующаго
пищья :

Возьми сиропа смягчительныхъ RC. Syr. rad. emollient.
или разбивательныхъ корень-
евъ. f. aperient.

Земляничнаго сиропа по 1 ун-
цу.

Syr. fragariæ aa unc.
I.

Раковыхъ жернововъ.

Lapid. cancer.

Виннаго кваса съ купоросомъ
приготовленнаго по 1 золоти-
ны.

Tartar. vitriolat. aa
dr. I.

Коричневой воды безъ вина при-
готовленной по требованію коли-
чество.

Aq. cinnam. f. v. q.
f.

Смѣшай и давай поведчашей
чайной всякѣе 3 часа.

M. d. dimidium va-
sculum thean. omni
triborio.

§ 1043. Во время свирепствованія болѣзни или
пароксизма, не должно употреблять соленыхъ
проносныхъ, поповыхъ и мочегонительныхъ ле-
карствъ, и лесучихъ и масленыхъ солей. Если-
ли будетъ находится опасность, чтобы не
учинилось какой либо раны въ почкахъ, что на-
ипаче тогда случается, когда находятся камни
въ почкахъ; то должно велѣть больнымъ упо-
треблять вѣшесой жей съ еодою или съ ворот-
кою, либо слѣдующую эмульсію :

Возьми варенгъ, и съ перегон- RC. Therebinth. coct. dr.
ки по ешъ остывшаго, шер- III.
пенища 3 золотины.

Склизн Арабской гуми пол-
унца.

Воды бузиновых цвѣтовъ 4
унца.

Присриряковаго ферментка
сирона 1 унцѣ.

Смѣшай и давай по большой
ложкѣ всякѣ 3 часа.

Mucilag. gum. Arabi-
ci. dr. f.

Aq. flor. sambuc. unc.
IV.

Syr. de althea F.
unc. I.

M. d. cochlear. majas
omni bihorio.

Чпужѣ принадлежитъ до содержанія больного,
по онѣ долженъ воздерживаться онѣ всякихъ
острыхъ, соленыхъ и сырныхъ яствѣ, также
долженъ часто вставать съ постели.

ГЛАВА LVII.

О леченіи безпрерывной лихорадки de cura-
tione febris synocha.

§ 1044. Въ безпрерывной лихорадкѣ (§ 622),
взирая на леченіе оной, все свое вниманіе обращать
должно наипаче нуда, чпобы отпратить спрем-
леніе и скопленіе крови къ часпямъ необходи-
мымъ для жизни, и совсѣмъ ушолить кипѣніе
крови. Наконецъ, чпобы учинить свободнымъ
круготеченіе крови во внутренностяхъ.

§ 1045. Почему съ самого начала сея лихо-
радки надлежитъ пустить кровь, что смотря
по обстоятельствуамъ, и повторить можно. По-
слѣ должно предписывать пропивооспаилель-
ныя пицья, каковы соспавипъ можно нѣ:

Керселевыхъ ж
Просвириковыхъ листовѣ.
Овся.

E fol. charifolii et
Alth. ж.
Avena.

Сыворотки.

Сели. пры и

Вавару красной спородины.

Sero lactis.

Nitro, et

Rob. ribescentum.

Хорошо также для упокоенія жара и отвращенія инфламмаціи употреблять слѣдующій отваръ:

Возьми очищеннаго ячменя 2 ун- RC. Hord. mundat. unc. II.

Чистой сели. пры и золотникъ.

Nitr. p. dr. I.

Вари въ довольномъ количествѣ воды до нѣк- нѣк поръ, пока разпреснется ячмень, послѣ процѣди отваръ, и къ одному фунту съ положенномъ прии- ший.

Coq. in f. q. aq. ad- cecaturam. dein col. libr. I. et f. adde:

Лимоннаго сиропа 1 унцъ.

Syr. de acetos. citri unc. I.

Медъ съ уксусомъ пригото- вленнаго полунца.

Oxymel. unc. f.

Смѣшай и вели пишь сколько угодно.

M. sumat pro lubi- tu.

А еспьли надобность потребуешь, чптобы и желудокъ былъ послабленъ, и чптобы отвращить имѣющую воспослѣдовать гниль во влагахъ; то надлежитъ употреблять сей отваръ:

Возьми чистаго жин. ларя 1 унцъ. RC. Hord. m. unc. I.

Тамариндовъ полунца.

Tamarind. unc. f.

Чистой сели. пры и золотникъ.

Nitr. p. dr. I.

Вари въ довольномъ количе- ствѣ воды, послѣ процѣди пол- поръ фунтъ отвара и прии- ший, маличоваго сиропа 1 унцъ, дай и вели употреблять когда угодно.

Coque in f. q. aq. col. libr. I. et f. ad- de syrop. rubi ide- unc. I. d. sumat pro- lubitu.

§ 1046. Кругопеченіе крови во внутренно- стяхъ свободнымъ дѣлается помощію отваровъ, лег-

легкій потъ производящихъ, вкупѣ съ лотовою сурьмою и сурьяною селитрою.

Хорошо также въ сей лихорадкѣ, наипаче когда она гнилою учинится, употреблять слѣдующее лекарство :

Возьми склизы Арапскаго клею	℞. Mucilag. g. Arab. unc
или камеди полуунца.	℥.
Камфоры ползолотника.	Camphor. dr. ℥.
Самого хорошаго уксуса полуунца.	Aceti optimi unc. ℥.
Лимоннаго сиропа 1 унцѣ.	Syr. acetositat. citri unc. ℥.
Вишневой воды 4 унца.	Aq. ceras. nigr. unc. IV.
Смѣшай и давай всякѣе два часа по двѣ ложки.	M. d. omni bihorie cocht. II.

Желудокъ всегда должно сохраняшь свободнымъ, къ чему весьма способны супиъ : тамариндовая кашница и чистой винной ламень.

А когда худой болѣзненной матеріи довольно уже изъ пѣла испражнено будетъ, то наконецъ должно приступить къ укрѣпляющимъ пѣло лекарствамъ, изъ числа коихъ весьма хорошее дѣйствіе имѣетъ, какъ въ разсужденіи отвращенія гнили, такъ и въ разсужденіи укрѣпленія слабыхъ частей, слѣдующее лекарство :

Возьми самой хорошей перуанской корки полуунца.	℞. Cort. per. select. unc. ℥.
Зифенцеваго корня 1 золотникъ.	Rad. serpent. virgin. dr. ℥.
Въри въ ключевой водѣ, взявъ оной унцовъ 8, до пѣхъ поръ, пока останется только 6 ун-	Coq. in aq. font. unc. VIII ad remanentiam unc. VI. colatu-

цовъ, проуѣдивши отвѣръ,
примѣшай.

Куинорской кислоты поштора
золотника.

Лимоннаго сирѣпа 1 унцѣ.

Смѣшай и дѣлай всякѣе два ча-
са по 2 ложки.

res adde :

Sp. vitriol. dc. I. et
f.

Syr. acetos. citri unc.
I.

M. d. omni bihorio
coch. II.

Чптожъ касается до содержанія больнаго; по-
оное само по себѣ довольно извѣстно. Почему
предписывать правила на оное я почишаю ненуж-
нымъ.

ГЛАВА LVIII.

О леченіи желчной лихорадки de curatione febris biliosæ.

§ 1047. Желчной лихорадки (§ 626) лече-
ніе производится такъ: во первыхъ надлежитъ
исправить и утѣшить острую и желчную мапе-
рію, а потомъ испраивить изъ пѣла вонъ, и
укрѣпить слабое пѣло.

§ 1048. Первое исполнить можно помощію
рвотныхъ лекарствъ; потомъ кровопусканіемъ и
употребленіемъ холодныхъ пиплевъ, а наипаче
холодной воды одной, или смѣшанной съ моло-
комъ либо лимоннымъ сокомъ и медомъ. Хо-
рошо также употреблять съ ключевою водою
юлелы, составленные изъ:

Барбарисоваго.

Лимоннаго.

Куинората и

Вишневаго сироповъ.

E syr. berberum.

Acetos citri.

Cydon et

Ceras. acid.

Dr. 17.

Эмульсии изъ кардовниковаго сѣмени, и студенъ оленьяго рога вкупѣ съ лимоннымъ сокомъ.

§ 1049. Еслили будетъ помитъ сильная жажда; то полезно употреблять слѣдующее лекарство: Возьми сладкой сыгоротки 2 мѣ-

ры.

Самзго чистаго виннаго спирта : золотникѣ.

Проходи немного, и давай чаще пить по немножку.

или сѣ :

Возьми щавеля : горсть.

Ржи : унцѣ.

Чистой селистры : золотникѣ.

Вари въ довольномъ количествѣ воды цѣлые полчаса, послѣ изцѣди фунтовъ 2 и приими.

Лимоннаго сиропа полшора унцѣ.

Бузиныка : унцѣ.

Смѣшай и вели пить какъ угодно.

Sp. vini purissimi dr. I.

Refrig. et d. crebrius parvis dosibus.

sive hoc :

RC. H. acetosellæ m. I.

S. fecalis unc. I.

Nitr. p. dr. I.

Coq. in f. q. aq. per dimidium horæ, col. libr. II. et adde.

Syr. acetos. citri unc. I. et f.

Rob. sambuc. unc. I.

M. sumat. pro lubitu.

§ 1050. Еслили учинится бредъ, то надлежитъ обрить голову и дѣлать прикладки изъ розовой воды, уксуса, селистры, розоваго спирта и не большаго количества камфоры, или изъ камфарнаго спирта и масла Родійскаго дерева.

Ноги должно спавить въ теплую воду или окупывать оныя сукномъ, обмочивъ прежде въ воду съ уксусомъ смѣшанную.

Иногда должно пускать кровь изъ затылка, или межъ лопатокъ помощію рожковъ.

На-

Наипаче же нужно давать размывательства, раз-
водишельныя, и уполяющія судороги лекарства.

Наконецъ, еслии бредъ воспослѣдуетъ по
примѣтамъ отъ низверженія болѣзненной матеріи
въ голову, когда по естѣ оная матерія сидитъ
въ головѣ, весьма нужно употреблять нарывные
мастыри, дабы такимъ образомъ вывести на-
ружу губительную матерію.

§ 1051. Когда въ сей лихорадкѣ учинится
кровотеченіе изъ носа безо всякаго умаленія бо-
лѣзненныхъ припадковъ; то должно приклады-
вать къ ноздрямъ слѣдующее лекарство:

Возьми квасцовъ ползолотника. *RC. Alumnis dr. f.*

Перегнастой придорожниковой *Aq. still. plantag. unc*
воды полуунца. *f.*

Смѣшай, и обмакнувъ претич- *M. aplic. madefactum*
ку въ оной, прикладывай къ *linteolum naribus.*
ноздрямъ.

или

five

Возьми обыкновеннаго купороса 1 *RC. Vitriol. com. dr. I.*
золотникъ.

Перегнастой розовой воды 1 *Aq. still. rosarum unc*
ундъ, смѣшай и прикладывай *I. m. applic. naribus.*
къ ноздрямъ.

§ 1052. Острая матерія исправляется упо-
требленіемъ, испарину производящихъ, лекарствъ;
почему около судебныхъ или пещеломныхъ дѣлъ
должно давать микстуру составленную изъ:

Водъ розовой	<i>Ex aqua rosarum.</i>
Вишневой и	<i>Ceras. nigr.</i>
Кардовниковой	<i>Cardui benedicti.</i>
Съ поточною сурьмою и простою	<i>Com an. m. diaphor</i>
микстуръ.	<i>et mixtur. simpl.</i>

§ 1053.

§ 1053. Естѣли около переломныхъ дней начнутъ приходить въ истощеніе силы; по кѣ приличнымъ сей болѣзни микспурамъ надлежитъ примѣшивати толной жермесотъ конфектъ и разносортной Гиацинтовой порошотъ (*confectio aikermes completa et species de hyacintho*), или давати пишь понемножку хорошаго ренскаго вина.

§ 1054. Естѣли пульсъ будетъ малъ и твердъ, вкупѣ съ гнѣшеніемъ въ груди и около сердца; по должно употреблять слѣдующее, въ таковыхъ случаяхъ весьма хорошее дѣйствіе имѣющее, лекарство:

Возьми ееріакальной камфарной RC. Aq. theriacal. campho.
воды полунца. rat. unc f.

Воды полчызго корня.

Scorzoneræ.

Кардобеніа по 1 унцу.

Cardui benedic. aa unc

Потовой сурьмы 20 гранъ.

I. Antimon. diaphor.

Порошка изъ пригомоеленныхъ раковыхъ жерновекъ позолотника.

Scrup. I. pulv. lap. cancr. dr. f.

Лепучей соли, оленья рога 10 гранъ.

Sal. volatil. c. c. gr. X.

Небеснаго ееріака 6 гранъ.

Theriac. coelest. gr. VI.

Сиропа, дикато яму 1 унцъ.

Syr. papaver. errat. pos. I.

Сибшай, и давай по дожкѣ вслѣдѣ 3 часа.

M. d. cochlear. omni trihorio.

Или сей отваръ:

Возьми салатныхъ листовъ 1 RC. H. lactucæ libr. I.
фунтѣ; сръжѣ и вари четверть часа въ сывороткѣ, валью оной полтора фунта, послѣ придай бѣлой каменной
dein adde; falis pru-
Селм-

селитреной соли : золотишка.
Сиропъ изъ 5. отваришальныхъ
кореньевъ полтора унца.

Сибай и давай по чашкѣ
всяке три часа.

nellæ dr. II.

*Syr. e. V. radicibz,
aperientibus unc. I.
& f.*

*M. d. vasculum omni
tr. horio.*

§ 1055. Еслии языкъ будетъ засыхать ;
то надлежитъ часто намазывать оный смалею
блочною сѣмянъ и хвощевъ, окулъ съ бл-
ною каменною селитреною солью (*mucilag f.
pulyi & cydon. sat sale prupel'æ*), или приклады-
вать къ языку лимонныя кружечки, посыпавъ
оные сахаромъ.

§ 1056. Еслии болѣного будетъ беспокоить
чрезвычайная бессонница ; то должно упопре-
блять риксальдующую эмульсію :

Возьми очищеннаго сладкаго *RC. Amygd. d. exsicc.*

миндаль

4. Холодильныхъ большихъ
сѣмянъ.

Сѣмянъ бѣлаго мака по 1 зо-
лотишка.

Лимонныхъ зеренъ ползо-
лотишка.

Бленочныхъ сѣмянъ 20 гранъ.

Вишней воды сколько по-
требно, сдѣлай эмульсію и
давай по чашкѣ всяке 4 час.

*S. IV. f. frigid.
mao.*

*Papaver. albi aa dr.
I.*

S. citri dr. f.

S. hyoscyam. gr. XX.

*Aq. ceras. nigr. q. f.
f. emulso d. omni
quad. horio vasculum.*

или

Вмѣсто сего эмульсіи давай по чашкѣ про-
стаго, изъ маку сдѣланнаго, молока.

§ 1057. Еслии къ сей лихорадкѣ прикину-
тся наконецъ судороги и разныя дерготы ; то
вдругъ должно предписать такое лекарство,

которо-

которое бы могло уполиить оныя. Изъ такихъ лекарствъ еспѣ слѣдующій порошокъ:

Возьми обыкновеннаго крѣпительнаго порошка 20 гранъ.	RC. Pulv. cordial. commun. scrup. I.
Бобровой струи.	Castorei.
Янтаря по 6 гранъ.	Electri aa gr. VI.
Опѣята.	Lavdan. opiat.
Сурьмяной киновари по I. грану.	Cinnabar. antim. aa gr. I.
Смѣшай, и давай всякѣ 3 часа по 10 грановъ съ водою дикаго маку.	M. d. gr. X. cum aq. pap. rheaddos omni triborio.

Весьма также хорошо употреблять въ семъ случаѣ нижеслѣдующую настойку:

Возьми померанцовыхъ листовъ 2 золотники.	RC. Fol. aurant. dr. II.
Перегнанной воды изъ полезаго маку 1 фунтъ.	aq. still. papaveris rhæaddos libr. I.
Закупоривъ хорошо сосудъ, дай постоять два часа въ духу, послѣ процѣди воду, и придай:	Vase bene clauso digerantur in balneo arena per II. horas, col. adde:
Маклаго, или пѣннаго сиропа, либо обѣихъ вмѣстѣ по золотнику, смѣшай и давай по чашкѣ, всякѣ три часа.	Syr. diacodii vel pœonice sive utriusque simul. aa unc. I. m. d. cumi trib po vaucolum.

§ 1058. Еслили сдѣлается у больного запоръ; то должно поставить промывательное, изъ молока, меда и небольшого количества виннокислой соли составленное.

§ 1059. Когда лихорадка спанетъ умаляясь и проходить; то хорошо употреблять легкія слабительныя лекарства, каковы суть: тамаиндовыя, мацныя и рвотныя, соединенныя.

ненные съ небольшимъ количествомъ распускаемой епикламенной соли.

По прѣшествіи лихорадки, должно всякія принять мѣры укрѣпить надлежащимъ образомъ изнеможенное и изнуренное тѣло.

§ 1060. Больные, которые кромѣ жажды и жару не чувствуютъ ни боли, ни гнѣшеній въ груди и давленій около сердца, также здоровыя имѣютъ легкія, могутъ когда захотятъ, употреблять холодную воду. Напротивъ страждущіе чахоткою, сильнымъ кашлемъ или поносомъ, употреблять не должны, а вмѣсто оныя другія тому приличныя пищія. Наконецъ должно замѣтить, что во время или около пераема никогда не должно пускать крови, но напротивъ насильственному такому напуры дѣйствію всякимъ способствовать образомъ, предписывая приличныя къ тому лекарства.

ГЛАВА LIX.

О леченіи жабной лихорадки или жабы
de curatione febris angino-deæ five anginae.

§ 1061. Жабной лихорадки или просто жабы (§ 630) лечительныя мѣры состоятъ въ томъ: чтобы первѣ остановить стремленіе и скопленіе крови къ пищепріемному и дыхательному горлу и язычнымъ мышцамъ; а потомъ чтобы успокоить и укрѣпить остроу, находящуюся во влагахъ.

§ 1062.

§ 1062. Почему съ самаго начала воспослѣдовавшей жабы надлежитъ пустить кровь, какое кровопусканіе иногда и повпорить должно. Желудокъ сохранятъ надлежитъ всегда свободнымъ либо помощію настѣйки изъ манны и тамаринда, либо сычоротки, либо промывательныхъ, составленныхъ изъ молока, меда, масла и сладкаго миндаля.

§ 1063. Для утоленія воспаленія и боли въ зѣвахъ, около глотки и пищепріемнаго горла нужно употреблять полосканье, приготоовленное изъ розовой воды, жевотыхъ сѣмянъ, жевота моза, яичнаго бѣлка и розоваго меда.

или сіе:

Возьми яичнаго ошара 1 фунтѣ.	RC. D. hord. libr. I.
Розоваго меда.	Mel. ros.
Самаго лучшаго укуса по 1 унцу.	Acet. optim. aa unc. I.
Горчицы 6) 1 ложку, сдѣлай полосканье.	S. finar. scch. I. fiat gargarisma.

6) Горчицу не всегда предписывать можно, но развѣ тамъ, гдѣ въ оной надобность будетъ.

§ 1064. Хорошо также употреблять розовой медъ въ сѣрную кислоту, которыми, растворявъ прежде въ придорожниковой водѣ, надлежитъ полоскать больныя части.

§ 1065. Для укрощенія случающагося иногда сильнаго печенія крови изъ носа полезно употреблять слѣдующій составъ:

Возьми свинцоваго сахара 1 эс- RC. Sachari saturni dr. I. лотникѣ.

Придорожниковой и	И	Ag. plantaginis &
Чиста V.		Ро-

Розовой годи по полуца.

Распусти, и, обмкнувъ по-
лощено, прикладывай къ ноз-
дрямъ, дважды или трижды
въ день.

Rosarum aa unc. f.

S. & mades. linteol.
applic. naribus bis vel
ter de die.

§ 1066. Снаружи можно прикладывать при-
кладки къ шеи, составленные изъ розоваго
укуса, льнянаго сѣмян, масла бѣлыхъ ли-
лей, листовъ водянаго лалунника (fol. nymphae)
бѣлаго мѣху, и просфирняка, отваривъ все
вкупѣ въ ключевой водѣ.

Или употреблять сію проникательную мазь:

Возьми деревяннаго масла 2 RC. Ol. oliv. unc. II.
унца.

Спирта оленяго рога съ янта-
ремъ приготовленнаго,
Нашатырной соли по 6 золо-
тениковъ.

Spir. c. c. succiniat.

Sal. ammon. aa dr.
VI.

Камфоры 20 гранъ.

Camphor. scrup. I.

Смѣшай, сдѣлай мазь, и, на-
мочивъ суконку, прикладывай
къ шеѣ.

M. f. linimentum, quo
inung. pannos & co-
lo applicetur.

Еслили будетъ опасность, чпобы не заду-
шился больной; то должно приложить нарыв-
ной пластырь къ запылаку.

Когда воспаление будетъ клониться къ загно-
енію; то хорошо ставить ноги въ теплую во-
ду, смѣшанную съ уксусомъ, отваривъ прежде
въ оной не много леруинской корки съ ромаш-
ковыми цвѣтами, а къ шеѣ прикладывать слѣ-
дующую смягчительную припарку:

Возьми просфирняковаго корня RC. Rad. altheae unc. II.
2 унца.

Безовой муки 1 унцъ.

Farin. fabar. unc. I.

Испол-

Исполченнаго сѣмянн волос-
скаго укропа полуица.

Вари въ довольнойъ количе-
ствѣ воды, пока сдѣлается
кашица, послѣ придай:

Камфоры ползолотника,
сдѣлай припарву и прикла-
дывай къ шеѣ.

Sem. saepingræci cop-
tuf. unc. f.

C. in f. q. aq. ad
pultis consistentiam,
postea adde:

Campor. dr. f.

F. cataplasma et ap-
plica solo.

Когда жаба соединилась съ ранами; то поле-
зно употреблять сіе полосканье:

Возьми известной води 8 ун- RC. Aq. calcis unc. VIII.
цовъ.

Розоваго меда 1 унцъ.

Mel. ros. unc. I.

Смирновыѣ капель или шин-
ипуры 2 золотника.

Tinctur. myrrhæ dr.
II.

Смѣшай, сдѣлай полосканье,
которымъ почаще горло по-
лоскашь должно.

M. f. gargarisma, quo
sæpius colluatur gut-
tur.

Въ гнилой жабѣ надлежитъ неопшменно употре-
блять прошивогнильные отвары, каковъ есть
сей:

Возьми чистой перуанской кор- RC. Cort. per. f. unc. I.
ки 1 унцъ

Вари въ водѣ, валаѣ омы
унцовъ 8.

C. in aq. f. ad unc.
VIII.

Послѣ процѣдивъ, придай:

Colatur. adde:

Растворенной вупороской ки-
слоты 2 золотника.

Spir. vitriol. d. dr.
II.

Камфоры, распущенной въ до-
вольнойъ количествѣ скилизи
Арабской гумми, 20 гранъ.

Camphoræ c. f. q. mu-
cilag. g. ambic. solut.
scrup. 1.

Лимоннаго сирова 1 унцъ.

Syr. acetos. citri.
unc. I.

Смѣшай, сдѣлай отваръ, ко-
торой пусть пьетъ больной до
2 унцовъ всякіе 2 часа.

M. f. decoctum de
quo capiatur omni bi-
hario unc II.

§ 1067. Въ прочемъ при леченіи жабы не должно предписывать рвотныхъ лекарствъ, которыми мало или и совсѣмъ неучившіеся лекари, обыкновенно шарлатанами называемые, употребляютъ для прорванія учинившагося въ зѣвахъ нарыва. Также не должно давать сильныхъ проносныхъ и опіянныхъ лекарствъ, но вмѣсто оныхъ употреблять селипреныя и легкія камфарныя лекарства.

Горлопрободеніе (brunchothomia) рѣдко употребляютъ оправдывающіе практику врачи, развѣ когда крайняя нужда будетъ требовать необходимости.

ГЛАВА LX.

О леченіи съ колотьемъ соединенной лихорадки или колотья *de curatione febris pleuricae five pleuritidis.*

§ 1068. При леченіи колотья или лихорадки съ колотьемъ соединенной (§ 635) должно поступать такъ, чтобы первѣе утолить острую и сѣрчистую матерію, въ спирающей части находящуюся, а потомъ разбить стоячую кровь въ подреберной плевѣ (pleura), или между реберныхъ мышцахъ; наконецъ, чтобы сѣрчистыя части вывести изъ шѣла вонъ натуральными путями."

§ 1069. Первое совершается помощію кровопусканій, которыхъ должно производить изъ той

той руки, въ которомъ боку находится боль, и которыя иногда и неоднократно производить должно.

Иные для опведенія крови отъ больной части, сперва пускаютъ кровь изъ какой нибудь ноги, а потомъ изъ руки, что и бесполезно дѣлаютъ.

Послѣ пущенія крови вдругъ надлежитъ предписывать проотивовоспалительные отвары, каковъ можно сдѣлать изъ:

Кервелевой и
Просфирняковой травы.
Цвѣтовъ фѣяковыхъ.

Диклаго полевого яну,
Тамариндовой кашицы и

Ex herb. cherefolii

Et althex.

Flor. violar.

- Pap. erractici,

Pup. tamarindorum
et

Кассіи, дивныя медомъ :
называемой.

Cassia.

§ 1070. Снаружи должно дѣлать припарки изъ смягчительныхъ и разбивательныхъ веществъ на пр. изъ ромашковыхъ цвѣтовъ и небольшого количества шафрана, отвариши въ молокѣ, или сію припарку:

Возьми порошка изъ ромашко- RC. Pulv. flor. chamomill.
выхъ цвѣтовъ.

Донной травы по 1 золотнику
Муки льнягаго сѣяния пол-
золотника.

Melilot. aa unc. I.

Farin. f. lini unc. f.

Смѣшай. и съ надлежащимъ
количествомъ молока сдѣлай
припарку, послѣ придай ма-
сла царской свѣчи 1 унцѣ.

M. f. cum f. q. lact.
cataplasma, cui adde:
ol. verbacci unc. I.

Естьли же не поможетъ сіе средство; то должно приложить къ больной части нарывной пластырь.

§ 1071. Для споспѣшествованія же изверженію дурной матеріи и очищенію легкаго хорошо употреблять слѣдующую кашницу:

Возьми розоваго вина или юле-	RC. Julep. ros. unc. I. &
па полшора унца.	femis.
Масла сладкаго миндаля пол-	Ol. amygd. dolo. unc.
унца.	f.
Киповитаго мозга 2 золотника.	Sperm. ceti dr. II.
Шафрана 4 грана.	Croci gr. IV.
Каперскаго сахара 1 унцѣ.	Sachari c. unc. I.
Смѣшай и давай по чайной	M. d. coch. theanum
ложкѣ всякой часѣ.	• omni hora.

Или сіе молоко:

Возьми сладкаго миндаля,	RC. Amygd. dolo.
Кардовиннаго стѣянн,	S. cardui mariae,
Сосновыхъ верхушекъ по 2 зо-	Pinearum aa dr. II.
лотника.	
Воды моростной.	Aq. scabiofoe.
Кервелевой.	Chærefolii.
Бѣлокопычниковой по 1	Aq. tuſſilaginis aa
унца, сладкаго молока, послѣ	unc. II. f. emulſio,
придай:	cuſi dein adde:
Профиріяноваго феррелѣва	Syr. de althea F. unc.
сиропа 2 унца, и давай по чай-	II. d. vasculum the-
ной кашкѣ всякѣ 2 часа.	anum omni bihorio.

§ 1072. Что принадлежитъ до содержанія больного, то онѣ не долженѣ быть ни мяса, ни одувающихъ и раждающихъ вѣтры яствѣ, но вмѣсто оныхъ употреблять ячныя и овсяныя похлебки или кисели.

Вмѣсто обыкновеннаго питія полезно употре-
блять ячной отваръ со щаселевымъ и солодко-

вымъ

вымъ жарнемъ пригопвленной, или вмѣсто она-
го слѣдующій:

Возьми груднаго опшара 2 фун-	RC. Decoct. pectoral. libr.
та.	II.
Сиропъ женскихъ волосѣвъ,	Syr. capilli veneris.
Физалковаго по полтора	Violarum aa unc.
унцъ, смѣшай и вари нить,	I & f. m. bisat pro
когда ажоченся.	lobitu.

§ 1073. Опносительно до предосторожностей, наблюдаемыхъ при пользованіи колошья и соединенной съ онымъ горячки, надлежитъ въ-давать, что еспли послѣ пуценія крови боль не уймется, то должно опять кровь пустить однажды, дважды и болѣе, пока не утихнетъ боль, что однакожъ перваго, втораго, третьяго и четвертаго дня дѣлать должно, а послѣ почти никогда, исключая, когда крайнія будутъ претрбовать того необходимости.

Желудокъ должно сохранять свободнымъ помощію промывательныхъ, составляемыхъ напр. изъ масла сладкаго миндаля, или льнянаго либо яичнаго съ небольшимъ количествомъ ви-нокіменной соли.

Седитренныя лекарства либо осторожно, либо и во все употреблять не должно; ибо примѣчено, что оныя въ семъ случаѣ дѣлаютъ перхоту въ горлѣ, возбуждаютъ кашель и причиняютъ сильную боль въ обдержимомъ болѣзнію бока.

Также не должно давать пить холодной воды и горячительныхъ и сильно слаблящихъ желудокъ лекарствъ.

Снаружи для утоления боли никогда не должно употреблять масленныхъ и жирныхъ лекарствъ, исключая одну профирняховую мазь, которая, поелику не запираетъ испарительныхъ проходовъ, приноситъ иногда хорошую пользу.

Когда колюще свирепствуетъ въ народъ персально, то не должно пускать крови, или пускать но весьма осторожно, а вмѣсто сего употреблять разбивательныя и противосудорожныя лекарства.

Еслибы случилось, что Хиругъ при пусканіи крови укололъ какимъ либо кровопускательнымъ орудіемъ сухую жилу, что не безъ причиненія жесточайшей боли и сильныхъ припадковъ производится, то въ такомъ опасномъ случаѣ надлежитъ часто дѣлать припарку изъ слѣдующаго состава:

Возьми луковицъ бѣлой лилеи *RC. Rad. lil. alb. unc. IV.*
4 унца.

Вари, въ коровьемъ молокѣ, взявъ онаго фунтовъ 2, до тѣхъ поръ, пока разварится, послѣ придай льняной жух.

Овсяной муки по 3 унца.

Вари въ опваренномъ съ бѣлолилейными луковицами въ молокѣ до тѣхъ поръ, пока огустиетъ, послѣ прикладывай въ страждущей части теплую.

C. in libr. II. lactis vaccini ad teneritudinem, de in adde, farin. lini.

Avenæ aa unc. III.

C. ad cataplasmatiss consilietium, applica sæpius ad partem affectam calide.

Хорошо также дѣйствуетъ въ семъ случаѣ и скипидаръ или терлеитинное масло (*oleum theberinthinum*), либо перснатое ландышевое или нардовое масло (*ol. fill. lavendulæ*).

ГЛА-

ГЛАВА LXI.

О леченіи воспаленія въ легкомъ, или горячки съ воспаленіемъ въ легкомъ соединенной *de curatatione peripneumoniarum sive febris peripneumoniacae.*

§ 1074. Воспаленіе или холотье въ легкихъ и соединенная съ онымъ горячка (§ 639) лечатся кровопусканіемъ, которое и неоднократно производится, разводишельными, противовоспалительными и очищающими легкое опѣдурной мокроты лекарствами. Желудокъ въ семъ случаѣ всегда надлежитъ сохранять свободнымъ помощію промывательныхъ лекарствъ, или отваровъ напр. отвара, приготовленнаго изъ солодового хоря и хоря ангельской сладости (*radix polypodii*), кассіи или диваго меда и манны.

§ 1075. Снаружи нѣкоторые совѣшуютъ дѣлать къ груди мягчительныя и разбивательныя припарки, какова есть ниже слѣдующая:

Возьми муки льняного сѣ- RC. Farin. sem. lini.
мени.

Волосскаго укропа.

Порошка изъ бузиновыхъ цвѣ-
товъ по 1 унцу.

Смѣшай и слѣлай съ яичнымъ
желткомъ и довольномъ ко-
личествомъ молока кашницу,
послѣ придай:

Бѣлолилейнаго масла 1 унцъ.
И дѣлай припарку къ больно-
му мѣсту.

Foenugraeci.

Polv. flor. sambuc. aa
unc. I.

M. f. cum vitello oui
et s. q. lactis cata-
plasma, cui adde:

Ol. lilior. alb. unc. I.
Et applica ad partem
affectedam callide.

И 5

§ 1076.

§ 1076. При леченіи сея болѣзни не должно употреблять никакихъ крѣпкихъ, весьма сепитренныхъ горячительныхъ и сильныхъ проносныхъ и съ опіемъ приготовленныхъ лекарствъ.

Въ сей болѣзни капли или эссенціи, такъ называемыя противодныя, суть безполезны такъ, какъ и крѣпкія камфарныя лекарства; почему ихъ или совсѣмъ оставляють, или весьма осторожно предписывать должно.

Для очищенія легкаго отъ дурной мокроты должно употреблять слѣдующій отваръ:

Возьми очищеннаго житарки или RC. Herd. m. m. I.

ячменя и горсть.

Корня волчьего зуба.

Rad. scorzomera.

Сарсанарилловаго по гунду.

Rad. saraparilla: aa
onc. I.

Волгесскаго укропа подунца.

Foeniculi onc. f.

Срубивъ, смѣшай, и вари въ

Incis. m. coqu. cum.

чистой водѣ и давай пить,

aq. per. d.

Къ сему отвару можно прибавлять понемножку для пріянности лимоннаго или просфирняковаго сиропа. Еслии хорошо пойдетъ мокрота; то для пособія оной полезно предписывать крѣпкія микстуры, какова естъ сія:

Возьми девятильныхъ канель 3 RC. Ess. helenei dr. III.

золотника.

Кашкарилловыхъ.

✓ Castorilla.

Подсѣченной сепитреной кислой по 1 золотнику.

Spir. vitri d. aa dr. I.

Смѣшай и давай по 40 канель, накалавъ изъ сахаръ, послѣ чего заливаете настойкою слѣдующихъ веществъ:

M. d. 40 gutt. in
fructillo lachari, po-
stea mox superbibere
jubeas sequent. Infus.

Взьми

Возьми корни сарсапарилловаго	RC. Rad. sarsaparillae unc.
полунца.	℥
Солодкового : солошникъ.	Liquirit. dr. I.
Вероникъ.	Herb. veronicae.
Букоицы по полгёрсти.	Betonicae aa m. f.
Цѣтловъ по дваго мѣру : щипотъ, срубивъ, теги изъ пан-	Flor. pa. rheador p.
завать такъ, какъ чай и пить	I. unc. inf. ut thea,
теплую настойку.	b. calide.

А когда колотье будетъ ненастоящее, то есть не будетъ соединенное съ лихорадкою ; то въ такомъ случаѣ должно предписывать потогныя лекарства.

ГЛАВА LXII.

О леченіи распалительной лихорадки или рожи *de curatione febris erisipelaceae siue eripelatis.*

§ 1077. *Распалительной лихорадки или рожи* (§ 643) леченіе производится такъ: во-первыхъ надлежитъ припустить острую матерію и учинить способною къ испражненію, а наконецъ, выгнать болѣзненную матерію изъ тѣла вонъ потомъ или испариною.

§ 1078. Къ прищупленію и утолненію острой матеріи полезно употреблять размывательные и утолительные отвары и молоки. Кровь пускашь должно въ довольномъ количествѣ. Въспію же обыкновеннаго пинья надлежитъ предписывать отваръ изъ:

Сладко-

Солодкового и сарсанарилова-
го коренья. .
Кориинки. .
Взвѣшу и
Лимонныхъ корей.

E rad. farfapar. et li-
quiritiae.
Passulis minor.
Anis. stellar. et
Cort. citri.

§ 1079. Принаступленіи ночи надлежишь
давать слѣдующее крѣпительное лекарство:

Возьми сладкаго миндаля.

RC. Amygd. dalc.

И толчената сѣянни бѣлаго
маку по 6 золотниковъ.
Лимонной воды.

S. papaver. albi. con-
tus. aa. dr. VI.

Воды полевата маку по 3 ун-
ца.

Aq. citri.

Сдѣлай молоко, послѣ придай:
Перловаго сахара или
Общаго сердечнаго или крѣпи-
тельнаго порошка з золотни-
ка.

Pap. rhocados aa unc
III.

F. emul. adde:

Sachari perlati five

Pulv. cordialis com-
munis, dr. II.

Давай всякой часъ по ложкѣ.

D. omni hora. coch. I.

§ 1080. Снаружи къ обдержимой рожею части
должно прикладывать мѣшечки, изъ горькихъ
разбавительныхъ травъ, шафрана, камфоры
и бобовой муки приготовленные.

Масленныхъ напротивъ и жирныхъ лекарствъ
опиудъ употреблять не должно.

Хорошо также прикладывать къ рожѣ слѣду-
ющій порошокъ:

Возьми крохмалу 1 унцѣ.

RC. Amili unc. I.

Бѣлакъ з золотника.

Cernisse dr. II.

Свинцоваго сахара 20 гранъ.

Sachari latic. scr. I.

Бѣлаго ибду ползолотника.

Cretæ albæ dr. f.

Смѣшай, сдѣлай порошокъ.

M. f. pulv.

Которымъ должно посыпать полотенцо и прикладывать
дважды или трижды въ день къ больному мѣсту.

§ 1081.

§ 1081. Чпо принадлежитъ до кровопуска-
нiя; по пусканъ кровь должно съ самаго начала
лихорадки, а послѣ производить хорошую ис-
парину.

Всякихъ горячительныхъ лекарствъ избѣгать
должно, куды относятся противоядныя и про-
тивогнильныя капли или эссенціи.

Прежде выхода наружу рожиной матеріи не
совсѣмъ безопасно слабить желудокъ, а когда
начнетъ умаляться лихорадка, то таковое сла-
бленіе желудка не бесполезно и не безнужно бы-
ваетъ.

Крѣпкихъ камфарныхъ, свинцовыхъ и всякихъ
вяззательныхъ лекарствъ, также и опіатовъ
наипаче въ жидкомъ видѣ, употреблять не дол-
жно, или покрайнѣй мѣрѣ великую имѣть осто-
рожность при употребленіи оныхъ.

Естьли бы рожа перемѣнилась въ тузую олу-
холь (scyrhus), или загноеніе, чпо наипаче ошѣ
неприспойнаго употребленія вяззательныхъ ле-
карствъ приключается, и чпо узнается изъ
того, когда рожиная опухоль неспадаетъ, но
всегда одинакова пребываетъ: краска начинаетъ
блѣднѣть и боль ощущаться глубже; по въ
таковомъ случаѣ надобно возъмѣть прибѣжище
къ лекарствамъ, пособляющимъ загноенію и про-
пивающимся или оспанавливающимъ гниль; ка-
ковъ есть Диакильной простой пластырь, смѣ-
шанной съ небольшимъ количествомъ камфоры

и шафрана (empl. diachilon s. cum rauxillo camphor. et essci). По выжатии гною изъ вереда, должно впускать въ оной составъ изъ ячм. отвара, розоваго меда и водяной или винной смирновой тинктуры, либо известную воду съ розовымъ медомъ, или отваръ изъ лешаховаго уха (sulfuratum) съ перуанскимъ бальзамомъ.

§ 1082. Еслили будетъ находиться опасность, чтобы невозпослѣдовало померивѣніе обдержимой рожеею части; то въ такомъ случаѣ для отвращенія поль пагубнаго приключенія надлежитъ употреблять слѣдующіе составы: Возьми негашенной известки 1 RC. Calc. viv. unc. I.

унцъ.

Папаша 3 унца.

Ciner. clavellat. unc. III.

Камфарнаго спирта довольное количество, смѣшай и прикладывай къ больной части.

Sp. camphor. sufficent. quant.

M. et apl. ad. part. affect.

Возьми глеетоваго укуса 2 унца. RC. Acet. lithargyr. unc. II.

Камфарнаго спирта 4 унца.

Sp. v. camph. unc. IV.

Перегнашей изъ бузиновыхъ цвѣтовъ воды 6 унцовъ.

Aq. still. flor. sambuc. unc. VI.

Тинктуры или настойки зверобоевыхъ цвѣтовъ.

Tinctur. flor. hyperic.

Смирновыхъ капель по 2 золотника.

Essent. mysh. aa dr. II.

Смѣшай и прикладывай къ страждущей части.

M. apl. ad partem male vexatam.

§ 1083. Еслилибы по какимъ либо или неосторожностямъ или другимъ неизвѣстнымъ причинамъ рожа перемѣнилась въ антоновъ

огонь,

огонь, то должно предписать слѣдующую прикладку:

Возьми листовъ большаго про- RC. Fol. altheæ m. I.

сиріяна 1 горсть.

Дюника 2 горсти.

Цѣлновъ увѣчной травы,

Просфирковыхъ по 1 унцу.

Ври въ уксусѣ, пока сдѣ-
лается каша, послѣ при-
дай:

Льняной муки 3 унца.

Льнянаго масла 1 унцѣ

Нашатырной соли 1 золот-
никѣ.

Meliloti m. II.

For. lavendulæ;

Altheæ aa unc. I.

C. in aceto ad cata-
plasm. cui adde:

Farin. lini unc. III.

Ol. lini unc. I.

Sal ammon. dr. I.

Но сіе зло никогда случиться не можетъ,
если для предосторожности велѣтъ больному
употреблять опваръ перуанской жорки съ не-
большимъ количествомъ ренскаго вина, а сна-
ружи не употреблять масленыхъ и жирныхъ
лекарствъ, какъ уже о томъ сказано подъ §
1080.

ГЛАВА LXIII.

О леченіи бѣшенной или буйственной ли-
хорадки de curatione febris phreniticæ.

§ 1084. Бѣшеной или буйственной лихорадки
(§ 648.) способъ леченія есть сей: первѣе над-
лежитъ остановить сильное стремленіе крови
къ голоствѣ, и потомъ разбить спячюую уже
кровь въ мозговыхъ оболочкахъ.

§ 1085. Таковыя дѣйствія исполнить можно,
довольнымъ выпусценіемъ крови, которую можно
пу-

пускать либо изъ лобной, либо изъ шейной жилы.

Еслили же воспаление въ мозговыхъ оболочкахъ воспослѣдовало отъ оспановленія и задержанія мѣсячныхъ кровей или кровоочищеній у женщинъ, либо гемороя у мужчинъ; то въ такомъ случаѣ должно спавить ноги въ теплую воду, и кровь пускать изъ ноги, или спавить пиявицы къ золотымъ жиламъ.

Еслили больные будутъ очень сердиты, и свирѣпы; то лучше кровь пускать изъ руки, нежели изъ шейныхъ жилъ, или, сдѣлавъ насѣчку на запястьѣ, либо между лопатокъ, пьнуть кровь банками или рожками.

§ 186. Для сохраненія крѣпости силъ попрежнему давать больнымъ слѣдующую кашницу:

Возьми барбарисной приправы *RC. Conservæ berberum*
2 унца *unc. II.*

Приправы дикого шиповника *Cynosbati unc. f.*
полунца.

Распускаемаго виннаго камня *Sal. tact. solabil. dr.*
1 золотникъ. *I.*

Лимоннаго сиропа сколько потребно *Syt. limon. q. f.*

Сдѣлай кашницу и давай по чайной чашкѣ всякой часъ. *M. f. elect. d. coct. t. eanum omni hora.*

§ 1087. Желудокъ надлежитъ сохранять свободнымъ либо помощію промывательныхъ лекарствъ, либо настойкою, составленною изъ манны и тамариндовой кашницы.

§ 1088. Снаружи, обривши всю голову, можно дѣлать слѣдующую къ оной прикладку:

Рѣзаніе

Возьми розового уксуса 2 унца.	RC. Aceti rosae. unc. II.
Розового спирта 2 золотника.	Spir. ros. dr. II.
Распусти въ ономъ	Solve in eo
Камфоры 8 грановъ.	Camphor. gr. VIII.
Самой чистой селитры 40	nitri. purissimi. scrup.
грановъ.	II.
Масла Родійскаго дерева 15	Ol. ligni Rhodii g.
капель.	XV.

Смѣшай, и дѣлай что принадлежитъ.

Нарывные пластыри тогда развѣ полезно будетъ прикладывати къ головѣ, когда воспаление въ мозгъ восплаждуетъ не отъ спячей въ ономъ крови, но отъ другой, тамъ осѣдшей, острой и ѣдкой матеріи.

Небезполезнаго иногда по совѣту Фонъ-Швинна дѣлать къ подошвамъ и мокропонастягивающія прикладки. (сѣрафіса).

§ 1089. Что касается до предосторожностей, какія должно имѣть при пользованіи сея болѣзни; то надлежитъ вѣдать, что естли должно будетъ пустить кровь, то первѣ надлежитъ пустить изъ руки, а послѣ изъ шейной или лобной жилы. Далѣе нарывные пластыри и пиявицы безъ вышеозначенныхъ необходимости никакой не приносятъ пользы, но еще дѣлаютъ и вредъ; пренія же по кожѣ и баночное кровопусканіе всегда приносятъ хорошую пользу.

Впрочемъ больного должно всегда такъ класть на постелѣ, чѣобы голова у него всегда выше находилась, дабы такимъ образомъ опшвратитъ

сильное крови стремление къ мозгу, а внутрь между прочимъ давай слѣдующее молоко:

Возьми 4 хлѣбительныхъ боль-	RC. S. IV. frig mai. unc.
шихъ сѣмянъ полуница.	f.
Сѣмянъ кардовниковыхъ 2 зо-	S. cardui mariae dr.
лошника.	II.
Сладкаго очищеннаго минда-	Amygd. dule. decoct.
ля полуница	unc. f.
Сдѣлай съ ячмынъ отваромъ	C. d. hordei f. emul-
молоко, послѣ процѣди, при-	sio, col. unc. VIII
готовь унцовъ 8 и придай:	adde:
Слизни Арабской гумми сколь-	Mucilag. g. Arab q.
ко потребно	℥.
Перечисленной салистры 1 зо-	Nitri d. dr. I.
лошникъ	
Простатаго меду съ уксуномъ	Oxymel. f. dr. X.
составленнаго 10 золотниковъ.	
Давай по 2 унца всякіе два	Cap. omni bihorio
часа.	unc. II.

ГЛАВА LXIV.

О леченіи лихорадки соединенной съ во-
спаленіемъ въ грудобрюшной перепонкѣ
de curatione paraphrenitidis s. febris
paraphreniticæ.

§ 1090. Воспаленіе грудобрюшной перепонки (§ 652.) лечится такъ: во первыхъ должно имѣть стараніе разбить стоячую кровь въ грудобрюшной перегородкѣ, а послѣ разбившую ма-
терію вывести вонъ изъ тѣла натуральными
пустьями. }

§ 1091. Почему прежде всего надлежитъ пу-
снуть кровь, каковое кровопусканіе до тѣхъ
поръ

порѣ продолжати должно, пока не уймется жарѣ и боль въ споронѣ грудобрюшной преграды.

Что когда учинено будетѣ, то надлежитѣ предписывать легкое проносное лекарво, каковое составить можно изѣ:

Тамариндовой кашицы,	E pulpa tamarind.
Французскаго чернаслива	Prun. acidodulc.
Манин, и	Manna &
Цикорнаго съ рвениемъ при-	Syr. de cichoreo cum
готовленнаго сиропа.	rheo.

Хорошо также спавитѣ и промывапельныя лекарства.

§ 1092. Внутрь должно давати эмульсию изѣ:

Сладкаго миндаля.	Ex amygd. dulc.
Кардовинаго сѣмянн.	S cardoi mariae.
Листашковыхъ ядрышекъ.	Nucl. pistac.
Терновой и земляничной воды	Aq. flor. acaciagum,
	fragarum et
И сиропа дикого яману	Syr. rap. rheados.

§ 1093. Снаружи кѣ околoloжечной споронѣ должно прикладывати камфарной элиртъ или слѣдующую микстуру:

Возьми опійной наслобки, съ RC.	Tincturae opii cum
уксусныхъ элиртонъ пригото-	sp. aceti preparat. dr.
вленной, 2 золотника.	III.
Перегнашой воды изѣ бузич-	Aq. stillat. flor. sambuc.
ныхъ и розовыхъ цѣтвовъ по	et rosarum aa
3 унца.	unc. III.
Бузичнаго и розоваго уксуса	Aceti sambuc. et ros.
по 3 золотника, смѣшай.	aa dr. III. m.

Еслили же опѣ сконившейся въ грудобрюшной перепонкѣ дурной матеріи воспослѣдовало воспа-

леніе, що должно прикладывати кЪ ляшкамЪ или рукамЪ нарывные пластыри.

§ 1094. Относительно до предосторожностей, предпринимаемыхЪ при пользованіи сего воспаления, надлежитЪ знать, что безЪ кровопусканія, которое неоднократно учинять должно, не можно и не должно ожидать никакого спасенія, попому, что одно только кровопусканіе въ состояніи совершенно отвратить загное-ніе, которое всегда бываетъ пагубно. Ибо еслии гной послѣ нарыва прольется въ грудь; то причиняетъ чахотку, а еслии въ брюхо, то гнойную брюшную водяную болѣзнь (*ascites purulenta*).

КакЪ всякихЪ рвотныхЪ, такЪ и сильныхЪ проносныхЪ лекарствъ и холодного пищья въ сей болѣзни избѣгать должно.

ГЛАВА LXV.

О леченіи кроволоносной лихорадки или кроваваго поноса *de curatione febris dysentericæ sine dysentericæ.*

§ 1095. ОтЪ кроволоносной, съ кровавымъ по еснѣ поносомъ соединенной лихорадки, словомъ кроваваго поноса (§ 656) вылечиваются боль-

больные, естли острую, жигучую и весьма бродильную матерію прищипить и умѣрить, и наконецъ смягчить кишечныя судороги.

§ 1096. Почему при леченіи больныхъ опѣ кроваваго поноса лекаръ впервыхъ долженъ предписать рвопное лекарство изъ илехакуанны или рвопнаго жорня и распускаемаго виннаго камня: напр.

Возьми порошка изъ рвопнаго RC. Polv. rad. ipesacuan.
корня 20 гранѣ. scrup. I.

Рвопнаго виннаго камня : Tart. ement. gr. I.
гранѣ.

Распускаемаго виннаго камня Tart. solubil. gr. XV.
15 гранѣ.

Смѣшай и дай на одинъ прѣ- M. d. prodoſi cum aqua
емѣ въ мятной водѣ. menthæ.

Возьми рвопнаго виннаго камня 3 Tart. emet. gr. III.
грана.

Перегнашой мятной воды 3 ун- Aq still. menthæ unc.
ца, сдѣлай рвопное питье на III. f. potio pro naa,
одинъ или на два прѣема, ко- vel duabus doſibus,
торое черезъ часъ принять quæ hora elapſa ſoma-
должно наощакѣ, или когда tur mane, vel alio
нужда попревуетъ. tempore urgente ne-
cessitate.

Послѣ рвопнаго лекарства надлежитъ пу-
стить кровь, что и неоднократно дѣлать дол-
жно, когда пульсъ будетъ твердъ и полонъ,
и когда воспаленіе еще продолжаться будетъ,
что узнается, чрезъ ощущение сильной боли
въ животѣ; въ противномъ случаѣ крови пу-
скасть не должно.

§ 1097. Желудокъ сохранять надлежитъ всегда свободнымъ помощію весьма легкихъ слабительныхъ лекарствъ; каковы естъ настойки изъ :

Манны.	Infusa e manna.
Ревеня.	Rhabarba o
Сейгнетовой соли и	Sale feignetti et
Слабительнаго розоваго сиро- па.	Syr. ros. solutiv.

Или вмѣсто такихъ настоекъ можно давать по ложкѣ еодиную ревеневую тинктуру (tinctura rhei aquosa).

§ 1098. Въ вечеру должно давать слѣдующее утолительное лекарство :

Возьми сѣмянъ бѣлаго маку 2	RC. Sem. pap. albi unc.
унца.	II.
Утолительныхъ Зиденгамс- кихъ капель 15.	Lavd. liq. sydent. gutt. XV.
Сиропъ подлѣгаго маку полно- ра унца.	Syr. pap. rhocaddes unc. I. et f.
Смѣшай и давай по ложкѣ чрезъ полчаса.	M. d. cochl. per semi- horam.

§ 1099. Острогу и жигучую матерію, причиняющую кровавой поносъ, утоляютъ съваромъ изъ съ растущенною въ оной манною, которую до тѣхъ поръ продолжать должно, пока испражнения перестанутъ имѣть зеленой цвѣтъ: также овсяной или ячной отваръ, или такъ называемой бѣлой отваръ, которой готовится слѣдующимъ образомъ :

Возьми скобокъ оленя рога.	RC. Roruga c. c.
Мякиша бѣлаго хлѣба по 3	Micx panis albi aa
здобощини.	dr. III.

Ключе-

Ключевой воды 3 фунта.

Aq. font. libr. III.

Вари, а послѣ придай бѣлаго

Postea adde sacchari

Сахара сколько похребно.

alb. q. s.

Хорошо также употреблять настойку лян-
наго свѣяни, или теплое молоко съраствен-
нымъ въ ономъ воскомъ.

§ 1100. Еслили жестокость болѣе не будетъ
утихаетъ, но свирѣпствовать и продолжаться
равномѣрно; то должно животъ намазывать
слѣдующею мазью:

Возьми бѣлолилейнаго масла 1 RC. Ol. lilior. alb. unc. I.
унцѣ

Пальмннаго масла.

Ol. absynthil.

Мушкатнаго пополазолни-
ка.

Ol. nucistæ aa dr. f.

Арабскаго клею 20 гранѣ.

Gum. Arabic. scorp.
I.

Камфарнаго спирта сколько
похребно, разпусти все, сдѣ-
лай изъ и напирай животъ.

Sp. camphor. f. q.
solve omnia, f. un-
guentum, quo in un-
gatur venter.

Еслили же сія мазь не принесетъ никакого
пособія, то надлежитъ употреблять оный или
приложитъ къ животу легкой нарывной пла-
стырь, наипаче когда поносъ будетъ свирѣпство-
вать повально.

§ 1101. Когда больной придетъ въ великую
слабость, то должно предписать крѣпительное
лекарство, каково есть сіе:

Возьми вышеуказанной воды.

RC. Aq. ceras. nigr.

Воды лимонныхъ корокъ по 2

Aq. cort. citri aa dr.

золотника.

II.

Кориценой 3 золотника.

Cinnamomi dr. III.

Цвѣтовъ уѣвчнкой и пчельной
травы по полуница.

Раковыхъ жернововъ : золот-
никъ.

Малинового сиропа сколько по-
требно, сладкаго юленъ и да-
вай по ложкѣ всякой часъ.

*Flor. lavendulae me-
lissae* qae aa unc. f.

Lar. sacra. dr. I.

Syr. rubi ideii q. f.
f. julepus, d. cochl.
omni hora.

§ 1102. А дабы утолить частой позывъ
на судно (*tenesmus*); то должно почаше ста-
вить способныя къ тому промывательныя. Чпо
также дѣлать должно и тогда, когда болѣзнь
униматься станеть. Способныя къ утоленію
нѣю частаго позыва на судно, иначе силенье и
или натугою при испражненіи называемаго, про-
мывательныя сущь слѣдующія:

Возьми сыворотки подфунта. *RC. Seri* I. libr. f. febi
оленя и козы сала по 2 зо- *cerv. et hircini* aa
лотниина. *dr. II.*

Масла сладкаго миндаля пол- *Ol. amygd. d. unc. f.*
унца.

Яичнаго : золотникаъ.

Локателлова бальсама 20 ка- *Ol. ovorum* dr. I.
пель. *Bals. Locatelli* gutt.
XX.

Смѣшай, сладкаго промыватель- *M. f. crema, infun-*
ное и поставь. *datur.*

или

Возьми Венеціянскаго терпекти- *RC. Therebinth. v. dr. II.*
на 2 золотника.

Одинъ яичной желтокъ.

Андроманова ерѣяна полуница.

Vitell ov. n. I.

Theriac. Andromach.
unc. f.

Свѣжаго, чистаго милона 5
уницъ.

Lact. puri. recentis
unc. V.

Льнянаго масла : уницъ.

Ol. f. lini unc. I.

Сладкаго промывательное и по-
стави.

M. f. clystma, infun-
datur.

§ 1103.

§ 1103. Принимаемый при леченіи кроваво-поносной лихорадки или кроваваго поноса предосторожности суть слѣдующія : чтобы то есть кровь пускать съ самаго начала кровавопоносной лихорадки, тѣмъ наипаче больнымъ, кои бывають многокровны, и таковое кровопусканіе повторяють на другой день, когда жаръ и боль не уймутся, а сіе потому, что все умирающіе кровавымъ поносомъ больные, умирають единственно отъ антонова огня и помертвѣнія кишокъ. Также вдругъ должно давать пособляющія испаритѣ лекарства, прежде то есть, нежели воспослѣдуютъ судороги, соединенныя съ жестокою болью и рѣзомъ въ животѣ. Въ противномъ случаѣ должно избѣгать испариногонительныхъ лекарствъ.

Въ сей болѣзни всякія сладкія вещества причиняють вредъ.

Еслили кровавой поносъ свирепствуетъ перекривально; то хорошо курить больныхъ дымомъ изъ янпари и мастики.

Въ столчакѣ, въ которой испражняется больной, прежде испражнения, должно вливать отваръ изъ лечельной травы и просвирыяковыхъ и ромашковыхъ цвѣтовъ сдѣланный, или какъ скоро испражнится больной, вдругъ вымывать судно уксусомъ простымъ или противозаразительнымъ (*acetum bezoardicum*). Излишнее упо-

требленіе опіяповѣ, въ семѣ числѣ употребляемыхъ, причиняетъ великой вредъ.

Еспли приступитъ икота, которая всегда почти смертоноснымъ бываетъ предзнаменованіемъ; то вдругъ должно возвѣмѣть прибѣжище къ противоядному Фракторіеву лекарству, охутивъ съ укротнымъ сѣмянемъ, (*discordium Fracis Rocii cum f. anethi*), или даватъ внутрь веріякъ съ маковою и хоришневою водою или уксусомъ.

Хорошо также употреблять внутрь въ семѣ случаѣ отваръ изъ :

Душицы или материнки.	Ex herb. origani.
Пчельной травѣ.	Melissæ.
Багульника.	Rosimarini.
Укропного сѣмени и	S. anethi.
Ландыша съ мастиковымъ	Ex spica nardi cum
спиритомъ и можжевеловыми	spir. masthic. et ess.
каплями.	juniperi.

А снаружи:

Пластырь изъ лавровыхъ ягодъ, хлѣбной коржи или Галбановой шафранной Минзихтозъ (empl. de baccis lavri, crusta panis, f. de galbano croeato Myrsichti).

Мускусъ съ бѣлымъ сахаромъ, будучи употребленъ до 2 или 3 грановъ на одинъ пріемъ, въ семѣ случаѣ весьма хорошую приноситъ пользу. Впрочемъ прилѣжно смотрѣть должно, куда бѣлѣзнь наклонность имѣть будетъ, дабы влѣдомъ явленія онаго удобнѣе можно было поступать съ больными.

ГЛАВА LXVI.

О леченіи оспенной лихорадки или оспы
 de curatione febris variolosæ sive variolarum.

§ 1104. Оспенной лихорадки или оспы (§ 661) лечительныя мѣры туды устремлены, чтобы первѣе оспирую и жигучую матерію, находящуюся въ крови сколько можно смягчить, и уполитъ, и такимъ образомъ пособить какъ хорошему высыпанію, такъ загноенію и подсыханію оспы; и наконецъ, чтобы очистить кровь при умаленіи и оступленіи оспенной лихорадки.

§ 1105. Еслили больной будетъ уже семи лѣтъ; то вдругъ должно пустить кровь изъ руки, что наипаче тогда дѣлать должно, когда больной будетъ многокровенъ, біеніе въ жилахъ сильное, лице красное, боль въ головѣ и нысницѣ жестокая. Еслили жаръ и горячка не уймутся; то опять кровь пустить должно, и сіе продолжати до тѣхъ поръ, пока не придетъ лихорадка въ надлежащій порядокъ. А какъ нерѣдко случается, что родители, заняты будучи худыми предразсудками, не позволяютъ малымъ дѣтямъ отворять крови; для того лекаръ вмѣсто отворенія крови, долженъ по крайнѣй мѣрѣ спавить пиявицы къ вискамъ или къ запятку либо къ мышцамъ.

Оспода являюще, что самопроизвольныхъ кровопеченіи изъ носа, которыя замѣняютъ кровопусканіе, останавливать не должно.

Послѣ

Послѣ пущенія крови, естѣли потребуемъ необходимость, должно послабить желудокъ, либо слабительною Вѣнскою водою, либо сыороткою съ раслущеною въ оной манною.

Для уполненія жара должно давать селиитренныя лекарства, холодительныя эмульсіи, ячной отваръ съ лимоннымъ сиропомъ, или слѣдующую микстуру:

Возьми купоросной услажденной	RC. Sp. vitriol. dulc. dr.
Кислоты 2 волошника.	II.
Фіалковаго сиропа 3 унца.	Syr. violar. unc. III.
Смѣшай и давай по дождѣ всякие три часа.	M. d. omni triborio cochlear.

На третій или четвертый день должно давать крѣпительныя лекарства, дабы такимъ образомъ пособить высыпанію оспы налр: составленныя изъ оленья рга, философически приготовленнаго, потовой сурьмы, шафрана и жинговри, или лучше давать барбарисовой и малиновой взаръ, либо хорицневоу конфектъ; употребляя теплыя ванны и припарки, а для отвращенія оспеннаго высыпа на лицѣ спавить ноги въ теплую воду всякой день, смотря только, чтобы отъ того не ослабѣла больной.

Естѣли больные будутъ слабы, слѣдственно и оспа слабо высыпаетъ будетъ; по должно также давать крѣпительныя лекарства, между коими отваръ перуанской корки съ примѣшеніемъ къ оному небольшого количества вина, Первое имѣетъ преимущество.

По-

Поносъ, утихившійся во время оспеннаго высыпанія, останавливать должно *бѣлымъ отвара- ромъ* и промывапельнымъ, составленнымъ изъ известной воды и молока, взявъ обѣихъ по равной части.

Случается, что во время оспеннаго высыпанія приступаютъ сильныя судороги и рвота; почему въ такомъ случаѣ, для утоленія то есть судорогъ, надлежитъ употреблять *мускусъ съ бѣлымъ сахаромъ*; а для унятія рвоты *противорвотное Риверіево лекарство*, которое составляется такъ:

Возьми растительной или плаш- RC. Sal. plant. dr. I.
ной соли 1 золотникъ.

Лимоннаго сока 1 унцъ.

Succi citr. unc. I.

Смѣшай и по окончаніи кипѣ- M. perfecta effervescentia adde.

нія придай:

Aq. still. menthæ unc. III.

Перегнатой мясной воды 3 унца.

D. cochl. omni biho-
rio.

Давай по ложкѣ всякѣ 3 часа.

Когда же выплестъ оспа, что побольшей части 7 дня послѣ нападенія оной случается; то должно давать больнымъ по вечерамъ по 1 унцу на одинъ пріемъ *маковаго сырола*, что продолжать надлежитъ почти до десяти дней; а естли сей сиропъ не уймётъ спремленія въ крови; то вмѣсто онаго надлежитъ давать *утолительныя Зиденіамовы капли съ маковою водою по 10 или 15 капель на одинъ пріемъ*.

§ 1106. Поутру хорошо давать Гофманскія утолительныя капли, отъ 12 до 15 капель на одинъ примѣсъ водою содѣянаго яллушиила (aqua pumpræz). Ибо сіи капли не только утолѣютъ боль, но и весьма великую имѣютъ силу выгонять наружу оспенную матерію. Сіи капли можно примѣшивать и къ обыкновенному питью.

§ 1107. Еслили слина, текущая во время загношенія, будетъ очень клейка и вязка, что всегда худое означаетъ болѣзни состояніе; то должно употреблять полосканье изъ:

Медунишниковато и	E rad. ulmarizæ et.
Солонковаго кореннѣзъ.	Liquiritizæ.
Коринки.	Pastulis minor.
Сухихъ красныхъ розъ и проснаго меда съ укусомъ при- готовленнаго.	Rosiz siccis rubris et oxymelle simpri.

§ 1108. А дабы избавить больного отъ задушенія, то надлежитъ взять рутнаго масла и намазывать онымъ шею, или сдѣлать изъ рутныхъ листовъ холцо и надѣть на шею впуская впрочемъ помощію маленькаго насоса въ зѣвы понемножку вышепомянутаго отвара съ тѣмъ только, чтобы вмѣстѣ проснаго съ укусомъ сдѣланнаго меда, употреблять розовой медъ, или при чрезвычайной крайности употреблять рвотныя къ тому приличныя лекарства.

§ 1109. Еслили съ рукъ и лица спадетъ нечаянно опухоль, что предзнаменуетъ весьма худыя

худыя слѣдствія : то должно предписывать
крѣпительныя лекарства изъ :

Кардовниковой и	Ex aq. cardui bened.
Коричневой безъ вища пригото- вленной воды.	Et aq. cinnamom f. v.
Утолительныхъ Гофмано- выхъ и	Liq. anod. m. Hoff. et
Изъ оленья рога съ янтаремъ	Liq. cornu c. succi-
составленнымъ капель.	nato.

Сие лекарство можно давать и въ томъ слу-
чаѣ, когда оспа опять вступишь внутрь, упо-
требляя при томъ и наружныя лекарства, какъ-
то нарывные пластыри и припарки, къ кислямъ
ручнымъ прикладываемыя.

§ 1110. Глаза охраняются отъ оспы прикла-
дываніемъ полощенищъ, обливаемыхъ въ розовой
и бузиновой водѣ съ камфарнымъ эфиромъ
смѣшанной, или вмѣсто сей примочки, копо-
рая инымъ больнымъ великую причиняетъ боль,
должно употреблять теплое молоко съ ша-
франомъ.

§ 1111. Когда подсохнетъ оспа ; то должно
употреблять снаружи примочку изъ :

Розовой воды и	Ex aq. ros. &
Воды такъ называемой Вен- герской Королевы.	Sic dictæ Reginæ Hun- garicæ.
Синяго купороса	Vitriol. de cypro,
И свинцовой извести или са- хара.	Et saccharo saturni.

Естьли же оспины очень крѣпко засохнутъ ;
то должно примачивать оныя маслянымъ отва-
ромъ skullsъ съ молокомъ или намазывать мас-
ломъ

ломъ сладкаго миндаля, либо личнымъ масломъ.

Учинившіяся же раны промывать либо личнымъ отваромъ съ розовымъ медомъ и смирновою тинктурою, либо розовымъ масломъ, смѣшаннымъ съ жугороною кислотою.

§ 1112. По окончаніи оспенной лихорадки, должно спараться очистить тѣло, помощію слабительныхъ лекарствъ. Для истребленія рубцовъ оставшихъ на тѣлѣ послѣ оспы, весьма хорошо употреблять либо мазь составленную изъ:

Мясла сладкаго миндаля,	Ung. de ol. amygd. dule.
Китова шозга.	Sperm. ceti.
Бѣлаго воска и	Cera alba &
Кондайскаго бальсма.	Balf. de copaica.
либо	
Наширать оныя мукольнымъ масломъ.	Oleum. behen.

§ 1113. Въ оспѣ съ самаго начала лихорадки не должно содержать больного въ тепломъ и закушанномъ мѣстѣ, ниже давать горячительныя лекарства. Когда приступаетъ оспенная лихорадка, то не должно давать проносныхъ крѣпкихъ лекарствъ. Во время же загноенія надлежитъ употреблять приличные къ тому промывательныя. Еслили едѣляется какой поносъ не обезсиливаетъ больного; то его останавливать не должно, а спараться поспѣшествовать оному помощію такъ называемыхъ уладительныхъ лекарствъ.

По окончаніи же болѣзни полезно давать нѣсколько разъ ршупныя слабительныя лекарства, дабы такимъ образомъ отвратить, могущія воспослѣдовать отъ остановившейся гдѣ либо болѣзненной матеріи, затверденія въ желѣзахъ, которыя естли воспослѣдуютъ, то вдругъ должно спараться привести оныя въ созрѣніе. Поостраннѣе о семъ смотр. сочиненіе Г. Траллеса оправдающаго прививаніе оспы, такъ какъ единственное средство избавленія отъ вторичной оспенной лихорадки.

ГЛАВА LXVII.

*О леченіи корьной лихорадки или кори de
scurione febris morbillosæ s. morbillorum.*

§ 1114. Способъ леченія корьной лихорадки или кори (§ 669.) весьма много сходствуетъ со способомъ леченія оспенной горячки. Почему корь лечится размягчительными и уполяющими жаръ лекарствами, а во время настоящаго высыпанія кори легкими, испаринѣ пособляющими, средствами.

Естли у больныхъ будетъ твердой и скорой пульсъ; то должно пустить кровь, а внушрь давать слѣдующую грудную эмульсію:

Возьми сѣмто свѣжаго давлен- RC. Ol. express. recent.
наго миндальнаго масла, съ amygd. d. solut. in
личнымъ желткомъ курица- vitello ov. unc. I.
наго, 1 унцѣ.

Часть I.

К

Водя-

Водяного раствора Арабскаго клея а золотишка.	Solution. gum. Arab. aqvos. dr. II.
Маковаго сиропа а унцѣ.	Syr. diacodi. unc. II.
Проефирняковаго Фереллѣва сиропа а унцѣ.	Syr. de a'thea F. unc. I.
Смѣлай и давай всякѣ а ча- са по ложкѣ.	M. d. omni b'horio cochlear. I.

Первыя пупи всегда должно содежать чистыми и удобопроходными.

Если же корь не хорошо высыпаетъ будеть; то въ такомъ случаѣ надлежитъ употреблять перуанскую коку, камфору и мускусъ, а иногда и растворъ рвотнаго винаго камня, прикладывая между тѣмъ нарывные пластыри къ ящкамъ.

§ 1115. Для уполенія сильного кашля, такъ какъ самаго досаднѣйшаго припадка въ сей болѣзни, попребно давать масло сладкаго миндаля, или питье, приготовленное изъ вишневой и прудорожниковой воды съ маковымъ и женскаго волоса сиропомъ.

Впрочемъ въ семъ случаѣ похваляется слѣдующій порошокъ:

Возьми двухсоставной соли 10	RC. Arcani duplicati gr.
гранѣ.	X.
Не мытой потовой сурьмы 3	Antimon. diaphoret.
грамма.	illot. gr. III.
Чистаго винаго камня.	Cremor. tartari.
Сѣрнаго молока по 10 грановѣ.	Lact. sulphur aa scr. f.
Смѣшай, сдѣлай 6 порошковѣ,	M. f. p. f, p. n. VI.
и давай всякѣ а часа по порошку.	d. omni b'horio unus.

§ 1116.

§ 1116. Если бы надъ чахліе воспослѣдова-
ли черномочныя движенія (*epileptici motus*); то
въ такомъ случаѣ должно употреблять либо
Мирхіоновъ, либо нарочитой противочерномоч-
ной *Горьмановъ порошокъ*, котораго составъ
есть слѣдующій:

Возьми земляныхъ червей, въ Мѣ RC. <i>Lumbr. terrestr.</i> Majori- мѣнѣе ловленыхъ, очень хо- рошо перемытыхъ въ вин- номъ спиритѣ, и послѣ высу- шенныхъ, с пертыхъ въ по- рошокъ и просѣянныхъ, 1 унцѣ.	сaj. t. sp. vini bene le- torum, postea liccato- rum, contrit. in pul- ver. & cribratorum unc. I.
Площаго корня полунца.	Rad. pennis unc. f.
Сурьмяной киновари 20 гранъ.	Cinnabar. antimon. scr. I.
Смѣшай, сдѣлай порошокъ и давай грановъ по 5, 6 и 10 съ зѣрбойнымъ отваромъ.	M. f. p. d. gr. V. VI. & X. cum d. hyperici.

Хорошо также употреблять для уполенія
помянутыхъ движеній катмъ отъ ладучей бо-
лѣзни *Тимары* (ess. epilep. Timari), либо кашицу
или электуарій противочерномочной *Крато-
новъ*, а снаружи прикладывать къ животу су-
ховичной пластырь, или пластырь такъ назы-
ваемой опѣ черной немочи *Минзихтовъ* или
Кратоновъ. (empl. antipilepticum Mynsichti live Cra-
tonis).

§ 1117. Если бы случился поносъ или мытъ,
то его такъ какъ переломнаго дѣйствія напурь
не должно останавливать вяззательными или
опійными лекарствами, но еще споспѣшество-
вать оному, уполяющими жаръ, промывательны-

К 2

ми;



ми; но если бы поносъ сей продолжался даже и послѣ лихорадки; то въ такихъ крайностяхъ надлежитъ давать безоардической лоромъ съ однимъ граномъ небеснаго веріаха, или спавить промывательное, приготовленное изъ крохмала, Арабскаго клея, Андромачова веріаха и молока.

Впрочемъ хорошо давать ревенъ и магнезію съ отваромъ завязной коры Американскаго дерева (*descothum tinctoria*), во время же подсыхания кори надлежитъ употреблять слабительную Венскую воду и давать приличныя грудныя лекарства. Глаза промывать теплымъ молокомъ съ розевою водою смѣшаннымъ, или, если чрезвычайно краснѣть будутъ, спавить лѣваци къ вискамъ.

Въ главоболѣніи, послѣ кори воспослѣдовавшемъ, должно дѣлать прикладки къ глазамъ изъ леченаго яблока, небольшого количества камфоры и шафрана, съ прикладываніемъ къ запятку нарывныхъ пластырей или учиненіемъ на рукѣ апертуры.

Въ прочемъ съ сею болѣзнію такъ поступать должно, какъ того требовать будутъ обстоятельства.

ГЛАВА LXVIII.

О леченіи красновазювой или багрянно-
цвѣтной лихорадки *de curatione febris*
purpuratae.

§ 1118. Способъ леченія красновазювой лихо-
радки (§ 673), состоитъ въ томъ, чтобы перъве
знятъ и умѣрить кислопу, находящуюся въ крови
и происходящій опшуда жаръ, и наконецъ, чпо-
бы оспрыя чашницы выгнать изъ тѣла помо-
щію испарины и такимъ образомъ очистиить
кровоавой составъ отъ болѣзненной матеріи.

§ 1119. Къ уполенію въ кровѣ находящейся
кислопы и происходящаго опшуда жара поле-
зно употреблять умѣряющія, всасывающія и
разводящія лекарства, а наипаче къ селъ случаъ
полезны сунть кровопусканія, когда біеніе жиаъ
будетъ сильное, лице красное и боль жесткая
въ головѣ.

Для уполенія жара надлежитъ предписывать
кисловащія пищья, и селифренные съ попо-
вою сурьмою порошки, каковъ напр. есть сей:

Возьми двухсоставной соли 10	RC. Arcan. duplicat. gr.
гранъ.	X.
Немытой потовой сурьмы 3	Stib. diaphor. illot.
унца.	unc. III.
Чистаго виннаго камня.	Cremor tartari.
Сѣрнаго молока по 10 грановъ.	Lact. sulphur. aa gr.
	X.
Смѣшай, сдѣлай 6 поршковъ	M. f. p. da unus om-
и давай всякіе 3 часа по по-	ni biborio.
рошку.	

§ 1120. Кровь очищается отъ худыхъ иностранныхъ частицъ помощію легкихъ, испаривъ пособляющихъ, лекарствъ. Если бы приключилась одышка или захватченіе духа (*suffocatio*); то въ такомъ случаѣ должно давать янтарныя капли екулъ съ каплями оборовой струи (*eff. electri cum eff. sulfuris*), а снаружи прикладывать нарывныя пластыри, не вдругъ много, но переменнo одинъ за другимъ, первѣе то есть къ груди или между лопатокъ, а потомъ къ икрамъ или лямкамъ.

§ 1121. Если въ сей лихорадкѣ учинился сильной поносъ, великую слабость причиняющій; то надлежитъ предписывать упокоительныя лекарства напр. изъ:

Сѣмянъ колокольчиковыхъ.	<i>E sem. aquilegæ.</i>
Конопляныхъ.	<i>Canabis.</i>
Мизовыхъ съ граномъ опьяна, съ квашами пригото-	<i>Papav. alb. et I. gran-</i>
вленнаго.	<i>no landani cydoniati.</i>

Если бы будущъ опасность, чтобы не вступила внутрь высыпавшая наружу матерія; то надлежитъ давать противодной слиртъ Вуссеевъ екулъ съ утoлительными Гофмановыми каплями.

Если бы нападесть на больного великая сонливость; то надлежитъ употреблять промышательныя лекарства.

Если бы началъ показываться брѣдъ у больного; то для отвращенія онаго должно давать

ванъ лотовую сурьму съ безоардическимъ порошкомъ С-ниертвымъ, мыть голову розовымъ уксусомъ съ желѣзняковою водою смѣшаннымъ (aceto rosaceo cum aqua verbenæ), и ноги ставить въ теплую, съ ароматными шравами настоянную, воду.

Еслили сія лихорадка случится у родильницъ; то должно смотрѣть, не отъ остановленіяли кровоочищенія приключилась она? Ибо въ такомъ случаѣ безъ всякаго закоснѣнія надлежитъ пустить кровь изъ ноги, а послѣ давать умѣренныя, испарину производящія, лекарства съ добровою струею и шафраномъ; также отваръ изъ оленья рога съ лимономъ приготовленный.

Впрочемъ слабымъ больнымъ, также и въ то время, когда болѣзненная матерія выступаетъ, пускать крови или вовсе не должно, или весьма осторожно, а вмѣсто кровопусканія употреблять кровепищельныя и легкія камфарныя лекарства.

ГЛАВА LXIX.

О леченіи лютносильной заразной лихорадки *de curatione febris perenchialis.*

§ 1122. Чтобы отъ лютносильной заразной лихорадки (§ 678) излечить больного; то впервыхъ надлежитъ растворить и умѣрить весьма острую и жгучую матерію, а

наконецъ, растворивъ и умѣривъ оную, во время перелома вывести зонъ изъ шѣла.

§ 1123. Острыя и жигучія частицы притупляющія и уполащаются помощію растворительныхъ и утилипелельныхъ настоекъ.

Съ самаго же начала леченія сея лихорадки полезно и нужно давать рвотныя лекарства и пускать кровь, когда то есть будетъ пульсъ твердъ и полонъ, и великая тощиота около сердца; въ противномъ случаѣ, когда пульсъ будетъ слабъ и подобныя тому обстоятельства, пускать крови не должно, но еще употреблять лекарства умножающія біеніе жилъ, каковое лекарство есть сіе:

Возьми лютарныхъ оденъ рта RC. Liquef. c. c. faciat.

и

et

Утилипелельныхъ Гомфизовыхъ
капель по 2 золотника.

Anad. m. Hoff. aa
dr II.

Смѣшай и дай дражы или
прижмы въ день по 42 капель
съ водиче или барбариснымъ
сиропомъ.

P. d. bis vel ter de
die XL. gutt. cum
aq f. fyr. berberom.

Ночью, когда болные будутъ ложиться спать, должно давать питье, составленное изъ:

Воды, приготовленной изъ цвѣ-
тѣвъ параличѣй шрвы и ди-
нѣго ману.

Ex aq. flor. paralyse-
os et par. ergat.

Ячмѣно ошваръ.

Decoct. Hordei.

Уксуса и

Aceto et

Манов.го сиропа.

Syr. de mosconio.

§ 1124. Около переломныхъ дней надлежитъ предписывать легкія противоядныя лекарства. Напротивъ, когда затвердеетъ желудокъ и у
боль-

больныхъ не будетъ нанизъ, должно ставятивъ промывательныя лекарства напр. пригошовленные изъ:

Молока.	E lacte.
Цвѣтовъ садовой ромашки.	Flor. chamomil Romanæ.
И фюלקоваго сиропа вк. пѣ	Syr. viol. et
Съ просфирняковымъ Ферни- левымъ сиропомъ.	De althea Fernellii.

Жаръ, продолжающійся даже и послѣ пущенія крови, должно упиюлять молокомъ, соспавлен-нымъ изъ:

Сѣмянн солнцевой сестры.	E s. endivia.
Салата.	Lactuca.
Квишовъ.	Cydon.
Бѣлаго маку.	Par. alb.
Сладваго миндаля съ при- мѣшеніемъ изволышата коли- чества селитры и леденца.	Amygd. dolc. cum raumillo nitri et sach- candi.

Поносъ, во время выступленія пятенъ продол-жающійся, надлежитъ унимать либо краснымъ ланноническимъ порошкомъ (pul. rannonicus ruber), и легкими опіянами, каковъ на примѣръ еспъ слѣдующій опъ Линда похваляемый:

Возьми весьма мѣлко испече- наго галмея 10 грнѣ.	RC. Pulv. subtilissimi lap- sa aminaris gr. X.
Чистаго опія полграва.	Opii puri gr. f.
Смѣшай и давай прижиди въ день.	M. cariat ter de die.

Либо опваромъ дикой гречухи или известною водою, смѣшанномъ съ молокомъ.

§ 1125. Чтожъ касается до предосторожно-стей, наблюдаемыхъ при леченіи пятносыпной

заразительной лихорадки; по должно знать слѣдующее: что по есть кровь въ сей лихорадкѣ должно пускать съ самаго начала, и такое кровопусканіе повторять неоднократно, когда того потребовать будетъ необходимость. Начинаящій у больного бредъ надлежитъ уничтожать нарывными пластырями, къ спинѣ и икрамъ прикладываемыми, а настоящій, отъ возженія по есть мозговыхъ оболочекъ воснослѣдовавшій, унимать салипреными и камфорными лекарствами, изъ числа коихъ особое мѣсто занимаетъ слѣдующій порошокъ:

Возьми камфоры 2 грана.	RC. Camphor. gr. II.
Перечисленной салипры 10 гранѣ.	N tr. d. gr. X.
Чистого виннаго камня 15 гранѣ.	Cremor. tart. gr. XV.
Приготовленныхъ раковыхъ клешней 5 гранѣ.	Chol. cancr. preparat. gr. V.
Смѣшай, сдѣлай 10 порошковъ и давай всякіе 2 часа по порошку.	M. f. p. n. X. d. unus omni bñorio.

Ставить ноги въ теплую, съ уксуомъ смѣшанную, воду въ семъ случаѣ весьма полезно и нужно.

Скрежетъ зубовъ, судороги и икоту надлежитъ укрощать хорошимъ мускусомъ, нѣскольکو разъ въ день употребляемымъ въ опварѣ, въ микстурахъ или порошокъ, каковъ есть сей:

Возьми восточнаго мускуса 10 гранѣ.	RC. Moschi orient. gr. X.
Бѣлаго сахара 20 гранѣ.	Sach. a'b. gr. XX.

Смѣ-

Смѣшай, сдѣлай 6 порошковъ,
и давай всякіе 3 часа по по-
рошку съ липовою водою.

M. f. p. n. VI d. omne
omnitribus horis cum aqua
flor. lilae.

Впрочемъ и кисловатыхъ пищевъ въ осмъ
случаѣ пренебрегать не должно.

ГЛАВА LXX.

О леченіи моровязвенной, повѣтренной или
прилипчивой лихорадки, или чумы de
curatione febris pestentialis sive pestis.

§ 1126. Моровязвенную, или прилипчивую
лихорадку, словомъ, чуму (§ 682.), удобнѣе
отвратить можно способными къ тому сред-
ствами, нежели пользоваться оную.

Предохранить отъ оной можно удаленіемъ
отъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ она свирепствуетъ,
учиненіемъ ручейковъ или апершуръ, веселымъ
и бодрымъ духомъ, опіедаленіемъ зараженныхъ
отъ здоровыхъ людей, хорошею діетною и при-
виваніемъ чумы, что самое полезно дѣлалъ
Г. Виспремъ въ Лондонѣ 1055. года.

А естли какіе люди, или Г. Доктора и
другіе врачи должны будутъ ходитъ за боль-
ными; то для предосторожности и охраненія
своего отъ столь погубительной, единственно на
казнь преступникамъ закона Божія низпосылае-
мой матеріи, во первыхъ должны избѣгать
усталости, сырости, прохоложенія, жара, и
избѣгать всякимъ образомъ любострастія. По-
ло-

лоскать ротъ простымъ или пропивояднымъ уксу-
сомъ, каковъ на пр. есть рутной, ноготковой
(*acetum calendulatum*) и симъ подобные, однимъ или
смѣшавши съ жоричневою или рутною еодю, и
принимать спакже и внутрь одинъ или съ хо-
рошимъ виномъ по одному унцу въ день. Же-
вать иногда ревеня, пробой корень или смир-
ну, курить умеренно табакъ, носить ладанки
(*amuleta*) на шеѣ, изъ камфоры и ароматныхъ
веществъ составленныя, обмывать шѣю хоро-
шимъ уксусомъ, и прежде нежели пойдуть къ
больнымъ, пить понемножку хорошаго вина, и
закусывать бѣлымъ хлѣбомъ, намазаннымъ свѣ-
жимъ коровьимъ масломъ.

Съ зараженными же чумою и уже спраждуци-
ми оною надлежитъ поступать слѣдующимъ
образомъ:

Во первыхъ воздухъ, въ которомъ находятся
больные, должно очищать всякимъ образомъ,
что наипаче совершать можно днемъ и ночью,
помощію нѣсколько разъ производимыхъ куреній
изъ сахара, янтаря, гумми души, элени,
лаха, можжевеловыхъ ягодъ, и ноготковыхъ
цвѣтковъ.

Попомъ смотрѣть, не должно ли будетъ
употреблять легкихъ слабительныхъ и рво-
тныхъ лекарствъ; ибо еслии не будетъ обсто-
ятельствъ, пребующихъ сего способа леченія,
то ихъ никогда употреблять не должно, а
вмѣ-

вмѣсто оныхъ надлежитъ давать легкiя проптивогнильныя и проптивоядныя лекарства, каковы суть *перуанская жоржi*, *рутной* и *ноготной укусъ* съ водою смѣшанные, *лимонадъ* изъ цитроннаго, гранатнаго, бѣлоризнаго и лимоннаго соковъ, воды и сахара приотпоявленнiй; къ чему можно прибавлять по нѣскольку капель и соляной подслащенной кислоты. (*spiritus salis dulcis*).

Изъ бальсамическихъ проптивогнильныхъ и проптивоядныхъ лекарствъ особливую заслуживаютъ похвалу: *яитарныя*, *ирочныя*, *змѣзиковныя*, *смирновыя*, *рутныя*, и *хотеза чеснока* (*scordium*) *капли*, *улотресляемыя* либо съ *рутною* водою, либо *сахаромъ*, либо съ приличнымъ какимъ либо *сиропомъ*, отъ 20 до 30 и 40 капель на одинъ приемъ.

Когда больные потѣютъ, что обыкновенно продолжается почпи 2, 3, или 4 часа, то въ то время не должно давать имъ ни пищи, ни ѣспы, и не останавливать потѣнiя холодительными пищьями.

Еслили начнутъ приходипь обмороки; то должно прохладить и ободрять больныхъ благотонными водами, или *розевымъ* и *ноготковымъ* *укусомъ*, давая и внутрь понемножку *коричневой* воды съ *розвою* *приправою* (*succ. ros. conferva*) или *лимоннымъ* *сиропомъ*.

Еслили будетъ чрезвычайная жажда; то надлежитъ давать по ложкѣ *розеаго* и *фѣлехоса-*

то взвара вмѣстѣ съ хоростною и кардовникою водою. (jaler. cum aq. scabiosa et card. benedict.).

Чего однакожъ дѣлать не должно, то есть не должно употреблять вышеозначенныхъ лекарствъ, пока больные не попопѣютъ часа два.

Самыя лекарства надлежитъ давать теплыя, а не холодныя.

Перваго дня заразы не должно давать спать больнымъ, дабы опъ того не проникнулъ ядъ къ сердцу, но тереть тѣло гречкою изъ кою, обмоченною въ уксусъ.

Потъ надлежитъ опирать тонкими теплыми полошницами, а простуженія всякимъ беречься образомъ.

Еслили во время потѣнія сильно разгорячилась голова у больного; то должно обмоченное пололошницю въ розовомъ и бузиновыхъ цвѣтовъ уксусъ прикладывать къ головѣ.

Послѣ потѣнія надлежитъ подкрѣплять больныхъ зурною похлѣбкою, со старжею и цикорнымъ корнемъ карею, однако не много есть давать должно.

Въ пишу надлежитъ употреблять легкія похлѣбки, со щавелемъ, озурчникомъ, шпинатомъ, волоховымъ языкомъ (buglossa), и солнцевую строю или индивіемъ лѣтомъ, а зимою съ шалфеемъ, маеранномъ, чаберомъ (atureja) и лет, ушкою сваренныя.

Сыра

Сыра же и молока, крупныхъ яицъ, сладкихъ плодовъ, и сему подобнымъ яствъ совсѣмъ употреблять не должно.

Передъ обѣдомъ можно давать больнымъ по немножку вина, съ полынію, багульникомъ, (colmaginus), жердовникомъ, рутю и шалфеемъ настоеннаго.

Въ пищу кромѣ вышесказанныхъ лекарствъ можно употреблять ячной опваръ съ коричневою водою и лимоннымъ сокомъ.

Если же выступятъ моровики, то ихъ должно лечить приличнымъ къ тому способомъ, а бубоны всякимъ образомъ приводить въ созрѣніе, помощію діакильнаго или зеленого просяго, или съ гуммами смѣшаннаго пластыря, либо галбановымъ съ шафраномъ приготовленнымъ Минзихтовымъ (empl. de galbano crocatum Mynsichti).

Впрочемъ паковыя моровыя паховики, вышедшіе на шеѣ и около ушей, лучше приводить въ созрѣніе легкими смягчительными, нежели сильными лекарствами, и учинившуюся гнойную матерію скорѣе выводить изъ оныхъ вонъ.

Пространствѣ о сей матеріи видѣть можно у Тома Зиденгама на стр. 63 — 77. и у Гофмана въ систематической его медицинѣ. R. I. т. 4. стр. 291. — 302.

ГЛАВА LXXI.

О леченіи медлиной или тихой и сухотной лихорадки *de curatione febris lentæ et hecticæ.*

§ 1127. Медлиной и сухотной лихорадки (§ 686, 690) лечение слѣдующимъ производиться образомъ: во первыхъ надлежитъ острую, сѣрчистую, гнилую и испорченную матерію натуральными вывести изъ тѣла путями, и наконецъ разбить и истребить завалы, учинившіеся во внутренностяхъ.

§ 1128. Острыя и сѣрчистыя части припухаютъ и растворяются посредствомъ отваровъ, приготовленныхъ изъ:

Корня волчьего зуба.	<i>E rad. scorzonera.</i>
Скоровѣ однихъ рога.	<i>Rafur. s. e.</i>
Зубяга.	<i>Rad. cichor.</i>
Сладкаго.	<i>Liquiritia.</i>
Сарсапариллового и	<i>Sarsaparilla et</i>
Ренейнаго кореньевъ.	<i>Bardana cum</i>
Вѣсмѣ съ корицею.	<i>Past. minor.</i>

Также студнями, эмульсіями и тонкими похлебками, употребленіемъ шоколада, сыворожки, постояннымъ воздухомъ насыщенною (*ser. aëre fixo saturato*) и лицами, въ смятку сваренными.

§ 1129. Испорченная и гнилая матерія выводиться изъ крови тамариндными и реве евыми лекарствами, и катышками, составленными изъ золототысячника и листовой винно-каменной земли, или распускаемому винного камня, либо слѣдующимъ лекарствомъ:

Возьми

Возьми ревеневыхъ капель 2 RC. Animæ thei unc. II.

унцъ.

Жидкоспи листовою виннока-
менной земли полуница.

Liq. terr. foliat. tart.
unc. f.

Сифшай и давай по подложитъ
всякѣе два часа.

M. d. semi-coch. omni
bihorio.

Хорошо также употреблять Зелницерскую со-
ду, съ молокомъ сифшанную.

§ 1130. Естли будетъ беспокоить больныхъ
сильной кашель; шо должно давати часто сіи
лепешечки:

Возьми леденца подшора фунша. RC. Sanch. cand. libr. I.
et f.

Вари въ довольнойъ количе-
ствѣ ключевой воды до тѣхъ
поръ, пока спанетъ приста-
вати къ пальцамъ, послѣ при-
дай:

Coq. in f. q. aq. font.
donec digitis ad hære-
scere incipiet. de-
in adde:

Порошка изъ солодкового кор-
ня.

Pulv. Liquiritiæ.

Порошка изъ девясила.

Pulv. enulæ.

Фіалкового корня по полу-
нца.

Pulv. iridis florent.
aa unc. f.

Анисаго сѣмянни.

Sem. anil.

Сѣрныхъ цѣтшвъ по подшо-
лошника.

Flor. sulphur aa dr.
f.

Сифшай, сдѣлай лепешечки и
давай.

M. f. tabellæ d.

Или вмѣсто сихъ лепешечекъ должно давати
стираксовыя глиюли до 2 или трехъ грановъ
въ шо время, когда больные ложатся спать.

Когда сіи не пособяютъ средства; шо должно
пустить кровь, или дать легкое слабительное
лекарство, либо взять 10 капель Перуанскаго

Часть V.

Л

баль-

балъсама и одну ложку плющеваго сиропа (syr hederæ terrestris), смѣшать и дать по утру на однѣ или на два пріема.

Если же кашель будетъ мокротной, и матерія будетъ выходить гнилая, зеленоватая или желеноватая; то въ такомъ случаѣ весьма хорошо употреблять постоянной воздухъ, такимъ образомъ, какъ показано при способѣ лечить каменную болѣзнь.

§ 1131. Если бы сухотная лихорадка приключилась отъ останоженія перемѣжающейсѣ лихорадки, посредствомъ вязательныхъ лекарствъ, то должно опять произвести такого же рода лихорадку: что исполнить можно помощью сильнѣйшихъ слабительныхъ лекарствъ. Если задержаніе мѣсячнымъ кровей у женщинъ будетъ причиною сѣ лихорадки; то надлежитъ пустить кровь изъ ноги, и предписать развязательное лекарство изъ:

Пирейнаго.

Спаржеваго и
Цикорияго кореневъ.
Бархатныхъ цвѣтосовъ.
Вероники и
Кориини.

E rad. graminis.

Asparagi.

Et cichorei.

Flor. bellidis.

Herb. veronicae et

Uvis corinthiacis.

§ 1132. Когда причины лихорадки будутъ находится въ сыростяхъ, содержимыхъ въ желудкѣ; то въ такомъ случаѣ надлежитъ прежде давать щелочную соль съ лимоннымъ сокомъ и не большимъ количествомъ Руландовой воды, а послѣ дать легкое рвотное напр. сіе:

Возьми

Возьми рвотнаго виннаго камня RC. Tart. emet. gr. III.

з грана.

Перегнапой жияной воды з
унца.

Смѣшай и дай на одинѣ прѣ-
емѣ или на два.

или

Возьми рвотнаго корня 10 гранѣ.

Рвотнаго виннаго камня 1
гранѣ.

Бѣлаго сахара 10 гранѣ.

Смѣшай и дай на одинѣ прѣ-
емѣ.

Aq. still. menth. unc.
III.

M. d. pro una vel du-
abus dosibus.

vel.

Rad. ipecacuanhæ gr.
XX.

Tart. emet. gr. I.

Sachar. alb. gr. X.

M. d. pro dosi.

Естьли причина чахотной лихорадки будеть
находишься въ тугой опухоли или какомъ ни-
будь наростѣ легкомомъ, что узнается изъ
частаго сухаго кашля и выплевыванія весьма
малаго количества легкой и вязкой матеріи;
то въ такомъ случаѣ надлежитъ употреблять
ѣзду на лошадяхъ, и жить на чистомъ возду-
хѣ, а внутрь употреблять разбивательныя ле-
карства; изъ числа коихъ хорошо употреблять
опваръ изъ жорня свиной стрѣлы или бедрен-
ца (radix pimperellæ) съ нашатырною гуммою и
желбаномъ, либъ черною сурьяною тинктурою,
или соки изъ разныхъ разбивательныхъ травъ.

Естьли будеть причиною сухотной лихорад-
ки одна дурная мокрота; то должно употре-
блять Зельцерскую воду съ молокомъ, а въ
пищу употреблять раковую уху

Естьли причиною сея болѣзни будеть учини-
вшійся болдырь въ лѣтомъ; то должно вѣ-

Л а

ратъ

расть въ себя мягчительные пары, ѣздитъ въ коляскѣ, а иногда принять и рвотное лекарство, дабы такимъ образомъ прорвать вередъ, коимъ естѣли прорвется, что можно узнать изъ дурной выплевываемой материи; то должно употреблять свѣжіе, выжатые, соки изъ:

Золототушиника.	<i>E virga aurea.</i>
Бѣлокопытника.	<i>Tussilagine.</i>
Аgrimоніи.	<i>Agrimonia.</i>
Бѣлой шаншы.	<i>Macrubio.</i>
Вероники.	<i>Veronica.</i>
Зѣробоя и .	<i>Hyperico et</i>
Тысячелистника или дикой	<i>Et millefolio.</i>
гречухи.	

Съ маковымъ сиропомъ, или естѣли сія болѣзнь случится зимою, отварить помянутыя оныя травы и употребляютъ отваръ изъ оныхъ съ розовымъ медомъ и сиропомъ, съ сѣрою свареннымъ.

Ослабшія же силы должно подкрѣплять слѣдующимъ питьемъ:

Возьми капель дягилевыхъ.	<i>RC. Ess. angelic.</i>
Балдырьяновыхъ.	<i>Ess. valerian.</i>
Виннаго камфирнаго спирта.	<i>Sp. vini camph.</i>
Капель изъ оленья рога, съ	<i>Liqv. cor. c. succ. aa</i>
лишарейъ приготовленныхъ,	<i>dr. I.</i>
по 1 золотнику.	
Самаго хорошаго Ренскаго	<i>Vini rhenani optimi</i>
вина 6 унцѣвъ.	<i>unc. VI.</i>
Смѣшай и давай всякой часъ	<i>M. d. omni hora coch.</i>
по ложкѣ.	<i>I.</i>

Случается иногда, что страдающихъ чахоткою лихорадкою принимаетъ поносъ; почему въ
такомъ

такомъ случаѣ надлежитъ предписывать ревеневую настойку, которая приготавливается изъ ревеня, настояннаго въ млечной противоядной, спародубковой сложной, и мясной водахъ.

§ 1133. При леченіи медлинныхъ и сухопныхъ лихорадокъ не должно часто пускать крови, употреблять безнужно рвотныхъ, проносныхъ, потовыхъ и вяззательныхъ лекарствъ. Также противочахотныхъ хлелъ Гофмановыхъ и противочахотнаго Потери^{ова} состава. Наконецъ не должно предписывать опійныхъ и селитренныхъ лекарствъ.

Еслили больные будутъ весьма много потѣть ночью; то надлежитъ взять 15 хлелъ, изъ основныхъ верхушекъ приготовленныхъ, и дать въ хорошемъ вицѣ, или давать пить опшваръ Перуанской корки съ противояднымъ уксусомъ, либо сіе лекарство :

Возьми розоваго конфекта.	RC. Conserv. rosarum.
Очищенаго сладкаго миндаля по 1 унцу.	Amygd. dulc. decor- ticat. aa dr. I.
Плющеноваго и	Pulv. hæder. terrestr.
Кудряцеваго порошка по 2	Botryos, aa dr. II.
зодоптника.	
Сахара розоваго.	Sachar. rosac.
Сахара млечнаго по 2 унца.	Sach. lactic aa unc. II.
Смѣшай, сдѣлай конфектъ и	M. f. confectio, de-
давай на одинъ прѣмъ по зодоптнику, чепырежды въ день.	qua capiat dr. I. qua- ter de die.

О прочемъ надлежитъ исправляться съ хороши-
ми сочинителями.

КОНЕЦЪ ПЯТОЙ ЧАСТИ.



Ч А С Т Ъ Ш Е С Т А Я

О

Практической Хирургіи или наукѣ, показывающей средства врачевать всѣ наружные припадки и болѣзни, отъ разныхъ причинъ и въ разныя времена случающіяся всякаго состоянія, пола и возраста людямъ.





ЧАСТЬ ШЕСТАЯ.

О леченіи наружныхъ болѣзней.

ГЛАВА LXXII.

О Хирургіи вообще и о леченіи вывиховъ
de Chirurgia in genere et curatione
luxationum.

§ 1134. Древніе врачи, обращаясь съ больными людьми, увидѣли, что всякихъ болѣзней, терзающихъ человѣчество, есть двоякія причины, однѣ внутреннія, а другія наружныя; почему взглядомъ сихъ двухъ причинъ раздѣлили они и всѣ болѣзни на внутреннія и наружныя. Внутреннія болѣзни поелику требуютъ глубокаго познанія строенія человеческого тѣла, и подробнаго свѣдѣнія о лекарствахъ, могущихъ испробовать помянутыя болѣзни; для того осплавлены сушь однимъ только врачамъ или медикамъ; а наружныя, такъ какъ болѣзни меньшее заслуживающія вниманіе, описаны къ однимъ Хирургамъ, то есть такимъ врачамъ, которые одни токмо наружныя пользуютъ припадки, ни мало почти не кающъ внутреннихъ.

Таковое раздѣленіе болѣзней было причиною, что и вся врачебная наука первоначально раздѣлена была на двѣ части, на *Медицину* по естѣ или *Науку*, показывающую причины внутреннихъ болѣзней, и способъ пользоваться оныя, и *Хирургію* или *Науку*, предлагающую о наружныхъ болѣзняхъ и средствахъ лечить оныя.

Сколь полезна естѣ сія часть врачебной науки, и сколь необходима въ обществѣ земножителей, всякъ довольно видѣти можетъ. Почему я не стану говорить, коль много уроку дѣлаютъ врачебному искусству тѣ, кои часть сію медицины почитаютъ маловажною, и утверждають, якобы Хирурги не обязаны вѣдать другихъ для сей науки весьма нужныхъ частей врачебнаго искусства, каковыя части въ семъ разѣ нужнѣйшія суть: *Анатомія*, *медицинскія матерія* и *Фармакологія* или наука о содѣланіи лекарствъ, ниже упомяну о томъ, какую трудность и досаду чувствовать будутъ при пользованіи наружныхъ болѣзней, какъ Врачи, не имѣющіе довольно свѣдѣнія о сей части врачебной науки, такъ и Хирурги, мало имѣющіе понятія о правилахъ врачебнаго искусства, но только скажу, что хирургія всегда въ уваженіи была, и едва неполезнѣе естѣ, какъ говоритъ Горперъ, всѣхъ прочихъ частей врачебной науки, когда никакіе столь часто не случаются припадки, какъ наружные.

Откуда явствуетъ, что предметъ какъ Теоретической, такъ и Практической Хирургіи составляютъ наружныя болѣзни, которыя раздѣляются на два рода, на болѣзни такъ называемыя худаго частей собранія, и болѣзни разрушеннаго соединенія частей; о причинахъ которыхъ говорили мы въ четвертой части сего сочиненія, а о способѣ лечить оныя въ сей шестой части, *Практическою Хирургіею* называемой, теперь говорить имѣемъ, и впервыхъ о вывихахъ, что по еспь: всякой вывихъ, какъ по носовыхъ костей, нижней челюсти *), осповой кости, дужки или ключика (claviculae), позвонковъ, реберъ, плечевой кости, локтя, ручной кисти, пальцевъ, бедра, голени, дужки или берцовой меньшей кости, ноги и ножныхъ пальцевъ врачуется: 1) возстановленіемъ и приведеніемъ въ естественное положеніе, 2) удержаніемъ и укрѣпленіемъ и 3) приличнымъ и удобнымъ болѣзненнымъ приладновъ леченіемъ.

-) Нѣкоторые Хирурги хвалятся, что они чрезъ потщину вывихнутую сію челюсть весьма скоро и удобно привели въ натуральное состояніе. Справедливое ли и приличное ли дѣйствіе сіе благотворному и имѣющему нѣжную чувствительность и состраданіе къ переняцимъ таковую участь людямъ, всякъ ясно видѣть можеть! когда не рѣдко случается, что вѣздеобразной вывихнутой челюсти опростокъ столь крѣпко упир.еися въ скуловой отрешокъ, что шѣмъ причиняетъ самыя мучительнѣйшіе и жесточайшіе припадки.

§ 1135. Къ воспановленію вывихнутой кости требуется выпяженіе вывихнутой кости, и приведеніе оной въ обыкновенное и натуральное мѣсто; самое же выпяженіе тихо и поспепенно, а нескороспѣшно и нагло производить должно.

Почему неправы суть въ словахъ пѣ Хирурги, копорые звукъ, воспослѣдовавшій при наглѣ и скорѣмъ воспановленіи кости, за хорошій почитаютъ признакъ. Потому, что вывихнутая кость, будучи нагло и скороспѣшно вдвинута въ свое мѣсто, не только причиняетъ звукъ, но и ушибаетъ какъ пріятпилице свое, такъ и надхрящевую оболочку, хрящъ, окружающій членосоединеніе, и желѣзы находящіеся въ членосоединеніи, отъ чего наконецъ послѣдуютъ сращеніе и не подвижность члена.

§ 1136. Къ удержанію и укрѣпленію принадлежатъ: перевязка и приличное положеніе. Для учиненія перевязокъ потребны суть повязки, копорыхъ прежде трехъ, семью, девяти и одиннадцати дней перемѣнявъ и развязывая не должно, естли обстоятельства того требовать не будутъ.

§ 1137. Снаружи прикладывать должно охранительныя (defensiva) пластыри, на пр. составленный по сему предписанію:

Возьми Арапской камеди, называемой трагаканша.

Маслики.

Maſſichis.

Ладана.

Ладава.

Эмѣиной крови.

Порошка изъ Армянскаго бо-
леса или жирной Армянской
глины по 1 золотнику.

Роснаго ладава.

Смола, назъ взятой оппопо-
ланса 1 грановиныхъ цѣ-
пковъ по ползолотника.

Сабуръ 1 золотникъ съ по-
ловиною.

Черничнаго, или изъ чер-
ники и дикаго льна полу-
ченныхъ маселъ, также лична-
го масла по 1 золотнику.

Терпентина.

Смола по 6 золотниковъ.

Соку изъ чистлика или л-
стовичнаго корня 7 золотни-
ковъ.

Смѣшай, прибавля воска,
сколько потребно, сдѣлай
пластырь.

Или охранительный зеленый пластырь, ко-
шорой составляется слѣдующимъ образомъ:

Возьми порошки львовой лапы 3 унца R. C. pulv. alchimil. unc. II.

съ половиною.

Просфироу 3 унца.

Смирны,

Ладава по полуунца.

Ромашки.

Розы.

Буковицы по 3 золотника.

Сотри все въ порошокъ.

Терпентина.

Воска.

Смола по 6 унцовъ.

Смѣшай, и сдѣлай пластырь.

Olibani.

Sanguinis draconis.

Pulver boli Armenicæ.

aa dr. I.

Benzoës.

Oppoponacis, flor. balas-
stiorum, ana dr. semis.

Alcës dr 1 & semis.

Olei myrtillorum, linea-
ris, atque ovorum aa dr.
I.

Terebinthinæ.

Resinæ aa dr. VI,

Succi chelidonii drachm.

VII.

Misc. f. cum ceræ q. s.
fiat emplastrum.

& semis.

Malvæ unc. II.

Mirrhæ.

Olibani aa. unc. semis.

Chamomillæ.

Rosar.

Betonice aa. dr. III.

Terebinth.

Ceræ.

Resin. aa unc. VI.

M. f. emplastrum.

Либѣ

либо красной охранительной пластырь, который составляется слѣдующимъ образомъ:

Возьми воска 6 унцѣй.

RC. Cereæ unc. VI.

Козья сала 3 унца.

Sevi hircini unc. III.

Масла льняного.

Ol. lini.

Розевого по 2 золотника.

Ol. rosarum aa. dr. II.

Спусти, процѣди, и послѣ опишь распусти на легкомъ огнѣ и придай:

Solve, filtra, postea iterum leni igne solve & adde:

Порошка, приготовленнаго изъ свиновой жавести или бѣлилъ.

Pulveris cerussæ,

Глеши или серебряной пѣны по 1 унцу.

Lithargyrii aa. unc. i.

Маслики.

Masticis.

Ладана по ползолотника.

Olibani aa. dr. i. & sem

Смирны 2 золотника.

Myrrhæ dr. II.

Сурика 3 унца.

Minii unc. III.

Камфоры полунца.

Camphor. unc. semis.

Смѣшай и составь пластырь.

M. f. emplastrum.

§ 1138. Къ намачиванію перевязокъ должно употреблять слѣдующій составъ или примочку:

Возьми корни амбассевого или сабельниковаго. RC. Rad. bistoffæ.

себельниковаго.

Семилапочниковаго, или такъ называемаго завязанаго по полтора унца.

Tormentillæ aa unc. I. & semis.

Корня фѣяльноваго 1 унцѣ.

Irid florent. unc. i.

Гранатовыхъ корокъ.

Cortic. granat.

Кипарисныхъ орѣшковъ по 1 унцу.

Nucum cupressæ aa. unc. i.

Цвѣтовъ красной розы.

Flor. ros. rubr.

Гранатовыхъ.

Flor. balavstiorum.

Звѣробойныхъ по полгорсти.

Hyperici aa. m. f.

Черники полунца.

Baccarum myrtillorum unc. semis.

Срубнѣ, отваривъ въ красномъ винѣ, и дѣлай примочку.

Concis. c. in vino Rubro f. humectatio.

§ 1139. Что касается до приличнаго положенія, то кровать или постель должна быть мягка и ровна; поврежденная же и вывихнувшая часть должна всегда содержима быть въ покой, смотря при томъ, чтобы оную ни весьма сгибать, ни весьма много протягивать.

§ 1140. Приличное и надлежащее болѣзненныхъ припадковъ леченіе состоитъ въ томъ, чтобы прежде всего разбить воспалительную опухоль, которому разбитію поспѣшествуется мѣшечками и прикладками, изъ смягчительныхъ и разбивательныхъ веществъ составленными, на пр:

Изъ фйяковаго корня.

E rad : iridis florentinæ

Гребниковаго корня.

Caryophyllatæ.

Корня Соломоновой печати,

Sigilli salamonis.

Изъ травъ: какъ-то:

Ex herbis :

Душицы или маіерана.

Majoranæ.

Шалфеа.

Salvix.

Буковицы.

Betonicæ,

Багульника.

Roris marini.

Ландыша.

Spicæ.

И иссопа или синяго звѣробоя.

Et hyssopi.

Изъ цвѣтовъ, просфирныхъ, ромашковыхъ и мелиловыхъ или донниковыхъ.

Et floribus malvæ, chamomillæ, & meliloti.

Что все выше должно отвзрять въ винѣ и прикладывать къ вывихнутой части.

Если же не будетъ опухоли, но только вывихъ застарѣетъ такъ, что оного удобно возстановить никакъ не можно будетъ; то въ такомъ случаѣ надлежитъ сперва размягчить окрѣплой членъ помощію припарокъ и мазей, а

по-

потомъ приводитъ кость въ натуральное местоположеніе. Какъ-то, такъ и другое можно приготовить слѣдующимъ образомъ:

Возьми травъ свѣжей лебеды. RC. *Herb. atriplicis recent.*

Щавель.

Acetosa.

Просфириковъ по 1 горсти.

Malvæ aa. m. I.

Просфирниковаго корня 1 унцѣ.

Rad. althææ unc. I.

Вари въ небольшомъ количествѣ воды, пока огустѣетъ, послѣ придай:

C. in parva q. aq. ad spissitudinem. dein adde.

Просфирниковою сложной мази, бѣлолѣйнаго масла по полуунца.

Ung. de althæa comp. ol. liliorum. aa unc. semis.

Линной муки сколько необходимо,

Farinæ lini q. s.

Сдѣлай припарку и прикладывай дважды въ день.

F. cataplasma et applica- calide bis de die.

Возьми свѣжаго не соленого ко- ровья масла,

RC. *Butyr. recent. in sols. vaccini.*

Тополевой мази по 2 унца.

Ung. popul. aa unc. II.

и Яичные желтки.

Vitel. ovorum n. II.

Масла бѣлолѣйнаго.

Ol. liliorum a b.

Розоваго по полуунца

Ol. ros. aa. unc. semis.

Камфоры 1 золотничкѣ.

Camphoræ dr. 1.

Сдѣлай мазь и намазывай

F. unguentum, inung.

окрѣпленную вывихнутую часть.

obrigescens pars luxata.

§ 1141. Внутрь давать можно укротительные, ушопительные и противосудорожные порошки: на пр. порошокъ составленный изъ перечищенной селитры, лѣннаго жорня, хаскариловой горки и ромашовыхъ цветковъ; въ содержаніи же или діетѣ надлежитъ избѣгать всякихъ кислыхъ и одувающихъ яствъ; также умѣрять душевныя страсти.

§ 1142. При леченіи вывиховъ, естли боль-
ной будетъ многокровенъ, за нужное почипается
пустить кровь; въ прошивномъ же случаѣ, а
особливо когда больной придетъ въ крайнее изне-
моженіе, крови пускать не должно. Также бе-
речься надлежитъ, чшобы не весьма крѣпко пе-
ревязывать спраждуція части, дабы такимъ
образомъ не причинишь ангионова огня, либо и
самаго помертвѣнія. (gangraena & sphacelus). Естли-
либы была рана; то прежде всего должно ле-
чить оную; а естли будетъ нарывъ, то над-
лежитъ открыть оной, прежде нежели предпри-
нято будетъ леченіе вывиха. Естли сдѣлается
на членахъ и связяхъ мозоль (callus); то дол-
жно притрѣвать оную мягчительнымъ какимъ
нибудь декокшомъ, и связъ намазывать либо мазью,
составленною изъ просфирняка, либо приклады-
вать къ оной *пластырь дяхильной съ гумми*,
или составленной изъ уксуса и шафрана (oxusco-
seum) съ масломъ сладкаго миндаля. Естли при-
ключится весьма досадная и почти нестерпимая
почесота или зудъ; то перевязанной членъ дол-
жно намачивать либо *теплогою водою*, либо *теп-
лымъ молокомъ*, либо такъ называемою *расти-
тельно-минеральною водою*. (aqua vegeto-mineralis).

ГЛАВА LXXIII.

О леченіи выпаденій и болервыхъ задняго прохода. de curatione prolapsuum & imprimis ani.

§ 1143. Выпаденія задняго прохода леченіе производится

1. удержаніе (retentio).

2. Урезъ вставляваніе, вкладываніе или сложеніе (herobitio) и

§ 1144. Вспанавливаніе (herobitio) производится, когда прямая или заднепроходная кишка полагается на прежнее свое мѣсто, а больной лежитъ головою ниже, имѣя крестецъ и задницу нѣсколько возвыщеніе.

§ 1145. Удержаніе совершается помощію:

Форесшовой мази.

Per pignvent. Foresti.

Отвара изъ гранатовыхъ
Корей.

Decoctum e corticibus
granatorum.

Цвѣтотъ попутниковыхъ.

Florum plantaginis.

Гранатовыхъ,

Balavstiorum.

Красной розы,

Rosarum rubrarum.

Чижеваго глаза съ виномъ
прѣготовленнаго; также
поощію перевязокъ, на
поясниду и крестецъ по-
ложенныхъ; или употребленіе.

Bursae pastoris cum
vino paratum.
suffetus.

Куренія изъ маслики,

E mastiche.

Ладана.

thore.

Чернильныхъ орѣшковъ

Gallia.

Лавровыхъ ягодъ.

baccis lavri.

Кореньиъ сепиалапчнковаго
и дѣвцанаго.

E radicibus tormentillæ
et bistortæ.

Выжатнаго сока изъ кашеху,

Succo de catechu.

Зѣи-

И амѣиной крови.

Et sanguinis draconis.

Изъ коихъ веществъ можно также сослѣпить и мазь съ розовыхъ масломъ и намазывать прожодъ.

§ 1146. Естли выпаденіе воспослѣдовало отъ почечуйныхъ или геморойныхъ движеній; то не должно употреблять вязательныхъ лекарствъ, но прикладывавъ и всегда употреблять въ такомъ случаѣ:

Мазь составленную изъ цар- Unguentum verbasci et
ской сѣчи или медвежья lavendulae.
уха и уѣичной травы.

или

five

Изъ дикаго льна;

Unguent. de linaria.

Либо употреблять куренія.

Изъ мастики.

E mastiche.

Шалфея.

Salvia.

Богородской травы.

Seppillo.

Багуна.

Rore marino.

Маерана.

Majoranze herba.

И тимионнаго сѣмени,

et semene carvi.

Избѣгая всякаго простуженія, какъ въ пищу такъ и въ питье.

Упадшій язычекъ въ небѣ пользоваться должно крѣпительными полосканьями, изъ коихъ можно употреблять сіи:

Возьми занязнаго корня 7 унцъ. RC. rad. tormentil. unc. I.

Цвѣтотъ красной розы.

Flor. ros. rubrarum.

Квишовыхъ по полгорсти.

Flor. balavstiorum aa.
m. f.

Краснаго вина 8 унцотъ.

Vini rubri unc. VIII.

Отвари, придай иѣснотко розоваго меду и вели поло-
скачь ротъ.

C. dein adde melis
ros. pava. q. col-
luatur ea.

Часть VI.

M

или

или

vel.

Возьми дѣтство красной розы.	RC. Flor. ros. rubr. m. I.
Полторы горсти.	et semis.
Квиновыхъ дѣтство з зо-	Granatorum dr. II.
допника.	
Красцовъ з золотника.	Aluminis dr. III.
з чернильные орѣшка.	nucum gallarum n. II.
Придорожниковой воды сколько по- требно.	Aq. plant q. s.
Отвари, и отвари, съ- шанный съ небольшимъ ко- личествомъ розоваго меда и водной смирной тинкту- ры, вели полоскаешь ротъ.	C. et decocto cum p. q. melis rosarum et tincturæ myrrhæ aqvo- sae jubeas collui os.

Чтожъ касается до леченія выпавшаго ма-
тина румава или самой выпавшей мапки, что
отъ разныхъ причинъ воспослѣдовать можетъ;
то должно замѣтить слѣдующее:

Еслили рукавъ не давно выпалъ, не прохо-
дился и не возгорѣлся; то, положивъ женщину
больную спиною такимъ образомъ, чтобы кре-
стецъ у нее находился выше, вдругъ должно
съ великою осторожностію положить рукавъ
помощію пальцевъ на свое мѣсто; а еслили
онъ проходилъ и загорѣлся; то сперва дол-
жно согрѣть онъ, разбить воспаление и по-
томъ положить на свое мѣсто, употребляя
снаружи вазелиныя прикладки, каковы есть
тѣ, которыя показаны при леченіи упавшаго
язычка въ небѣ, и изъ которыхъ не только снару-
жи должно дѣлать теплую припарку, но и впу-
скавъ въ рукавъ или влагалище помощію насоса.

Me:

Между тѣмъ не худо употреблять куренія изъ мастики; янтаря, смирны, ладана, сабура и симъ подобныхъ веществъ. ЕСТЬЛИ же таковое выпаденіе рукава уже задавилось такъ, что рукавъ на мѣстѣ своемъ никакъ держаться не можетъ, то въ такомъ случаѣ надлежитъ употреблять перевязки, которыя однако всякой день перемѣнять должно, дабы отъ небреженія не сросся натуральной рукава проходъ, и тѣмъ не учинился бы причиною всегдашняго неплодія.

Отъ сего способа леченія выпадащаго рукава не различествуетъ способъ пользованія и выпавшей машки, изключая только то, что, когда то есть выворотившися машка дномъ наружу, что нерѣдко случается, наипаче отъ неосторожнаго изъятія, дѣтскаго мѣста, сначала должно безъ всякаго закоснѣнія согрѣть оную приличною, то есть мягчительною припаркою и намазать такою же мазью, и потомъ вложить въ сие мѣсто.

Мягчительныхъ припарокъ и мазей составъ есть слѣдующій.

Припарки:

Возьми листовъ фіялковыхъ. *RS. Fol violacum.*

Блещиныхъ по 2 горсти. *Hyoscyami aa. m. II.*

Сладкаго коровья иолока 2 *Lac. dulc. vaccini p. II.*
кружки.

Вари, и, процѣдивши от- *C. cola & tepide applica.*
варъ, дѣлай припарку.

или	five
Возьми цвѣшовъ ромашковыхъ. RC. Flor. chamomil.	
Розъ выхъ.	Flor. rosarum.
Царской свѣчи по 1 унцу.	Flor. verbasci aa unc. 1.
Сопри въ порошокъ и вари въ	Conver. in pulv. coq. in
молокъ, и ка огустѣетъ,	lacte ad spissitudinem,
послѣ придай:	dein adde:
2 яичныя желтки.	Vitell. ovor. n. 11.
Шифрача 2 золотики.	Croci dr. ii.
Дѣлай припарку.	Fac. fomentatioiatem.

М а з ь :

Возьми масла фѣяковаго.	RC. Ol. violæ
Масла вуншиничковаго по	Ol. nymphaeæ aa unc.
полтора унцъ.	1 & semis.
Сѣжато, чистаго и несоле-	butyri insulsi recent.
наго коровья масла.	vas.
Склизи изъ блошира сѣмяни	Mucilag. f. psyllii aa.
по 1 унцу.	unc. 1.
Розоваго масла полунца.	Ol. rosarum unc. f.
Камфоры 1 золотики.	Camphoræ dr. 1.
Смѣшай, одѣлай мазъ и на-	M. fiat. unguentum,
мазывай издажающую часть.	quo rars affecta inun-
	gatur.

Г Л А В А LXXIV.

О леченіи корчи или сведенія de curatione
Contracturæ.

§ 1147. Сведеніе лечится 1) размяченіемъ, 2) укрѣпленіемъ, 3) вытягиваніемъ или протяженіемъ спржадущаго члена.

§ 1148. Размягаютъ сведенные или скорченныя члены: 1) бани или баненія, составленныя изъ мягчительныхъ травъ и цвѣшовъ; 2) теплицы (thermæ) и жирныя матеріи; какъ-то ку-

куриное и оленье сало. Въ семъ случаѣ употребляются также живыя разрубснныя животныя, въ коихъ вкладывается болѣзнующая часпи

§ 1149. Для укрѣпленія страдающей часпи употребляется съ пользою лекарства, называемыя *умѣрныя жилокрѣпительныя* (*pervina moderata*).

Еслили страдающая часть онѣмѣетъ, или потеряетъ чувствованіе; то въ такомъ случаѣ должно употреблять лекарства, называемыя *краснодѣтельныя*, то есть краску и рдѣне на кожѣ производящія (*rubefaciencia*), нѣрвыныя ллястыри (*vesicatoria*), кроливозжаліи (*usticationes*) и банки или поспавленіе рожекѡвъ (*corbitulae coeae*).

§ 1150. Въ Леченіи сведенныхъ и скорченныхъ членѡвъ должно воздерживатися отъ вязательныхъ, теплыхъ или горячительныхъ и лѣпучихъ, также оспрыхъ и ѣдкихъ лекарствъ; притомъ надлежитъ избѣгать ваннъ и баненій, приготовляемыхъ изъ мѣди, сѣры и желѣза. Впрочемъ употреблять можно умѣренно размягчающія лекарства.

ГЛАВА LXXV.

О леченіи ушибѡвъ *de sanguine contusum.*

§ 1151. Ушибы пользуются чрезъ разбиваніе крови и спячей платки, или водяности; или чрезъ испражненіе и надлежащее болѣзненныхъ припадковъ леченіе.

§ 1152. Лекарства, которыя для разбитія даются внутрь, похваляются слѣдующія: какъ-то опшваръ изъ бараньей травы или Иванова цвѣта (*descurtia agnosc*), бычачей желчи, Венеціанской или Грецкаго мыла, и другія разбивательную силу имѣющія лекарства.

Снаружи поспѣшествуется разбитію кровопусканіемъ и прикладываніемъ мѣшечковъ и различныхъ припарокъ.

Кромѣ сего внутрь давать должно противовоспалительныя слабительныя лекарства, каковъ есть сей опшваръ:

Возьми тмаизриндовъ 1 унцѣ.	RC. Tamarind. unc. 1.
Французскаго чернослива 3 унца.	Prun. acidodolc. unc. III.
Очищеннаго изюма.	Uvar. passac. f. gigart.
Корины по 2 унца.	Cosinb acarum unc. II.
Одуванчиковыхъ цвѣтовъ.	Flor. taraxaci.
Дикой цинорѣи по 1 унцу.	Cichorei sylvestr. aa. unc. 1.
Корня волчьяго зуба 4 унца.	Rad. scorzonerae unc. IV.
Вари въ водѣ почти цѣлой часъ, послѣ нацѣди кружокъ 2 и придай.	C. in aq. per totam pene horam col. pint. II. et adde:
Полихрестовой соли 1 унцѣ.	Sal. polychrest. unc. 1.
Цикорнаго, съ ревенемъ приготовленнаго, сиропа полшора унца.	Syr. de cichoreo cum rheo unc. 1. et f.
Веди пить пока слабиль станеть желудокъ.	Bibat, donec alvus ducatur.

§ 1153. Наконецъ къ испражненію прибѣгать должно, естли разбитіе опѣ употребленія имѣющихъ силу разбивать лекарствъ надлежаче не производится, при томъ испражненіе должно на-

начинають производишь чрезъ прорѣзаніе ; а послѣ дѣлають инъекцію изъ бальсамическаго отвара, каковы суть слѣдующіе :

Возьми травы вероники или со- RC. herbæ veronicæ.

бачекъ.

Аgrimoniѣ.

Лечухи.

Травы называемой гробъ по 2 горсти.

Львовой лапъ.

Попутиника по одной горсти.

Смѣшай, вари въ закупоренномъ горшкѣ съ двумя частями воды и одною частію крѣпкого виннаго укуса до трехъ мѣрѣ ; послѣ процѣди и придай :

Порошка изъ бычачей желчи. Кизлярской марѣны по 3 золотника смѣшай и составь отваръ :

Agrimoniæ.

Sapiculæ.

Vincæ per vincæ aa manip. II.

Alchymillæ.

Plantaginis aa m. I.

Misc. coquantur vase clauso cum aquæ et partibus, æti cerevis. fort. parte una ad mensuras tres ; postea filtra & adde :

Pulv. bilis taurini.

Rubiæ tinctorum aa drch. iij. m. f. decoctum.

Возьми корня серпентарій или RC. Radicis serpentariæ.

амѣной травы.

Семилипочника или зазланого корня по 1 унцу.

Травы называемой мышья уши, 2 горсти.

Цѣтловъ аѣрбейныхъ. цѣтловъ красной розы по одной горсти.

Ладана.

Мастини по 2 золотника ; срузи и составь отваръ.

Въ леченіи ушибовъ должно наблюдать все то, что сказано въ § 1150.

Чтожъ касается до головныхъ ушибовъ, то должно знать слѣдующее :

Головные ушибы весьма великія причиняютъ припадки, почему ихъ весьма скоро и лечитьъ должно.

Если случится, что отъ ушиба проломится черепъ, и слѣдственно кровь либо вытечетъ изъ своихъ сосудовъ, либо остановится въ своемъ крутообращеніи, что познается изъ хрипѣнія, звенѣнія въ ушахъ, судорогъ, блеванія желчью, паралича, онемѣнія или лишенія рѣчи и произвольныхъ испрѣженій; то въ такомъ случаѣ, вдругъ возымѣть должно спараніе первѣе поднятъ вломленную кость въ полость черепную, помощію либо тягучаго пластыря, либо воздушнаго нагеса, либо посредствомъ такъ называемаго подъемнаго орудія (*elevatorium*), а потомъ употреблять разбивательныя головныя какъ снаружи, такъ и внутрь даваемые лекарства, пускать кровь и давать проносныя. Изъ наружныхъ разбивательныхъ лекарствъ есть слѣдующая припарка:

Возьми листовъ коневаго чеснока. *RC. Fol. scordii.*

Шалфейныхъ.

Salviae.

Табашныхъ.

Nicotianæ.

Батульниковыхъ.

Roris marini.

Казанскаго можжевельника
по полгорсти.

Sabinæ aa m. f.

Цвѣтовъ донниковыхъ.

Flor meliloti.

Бузиновыхъ.

Sambuc.

Ноготковыхъ по 1 унцу.

Calendulæ aa unc. 1.

Вари въ водѣ, купишь уксу-
сомъ, приготовай фунтовъ 3
и придай:

*C. in aq. сom aceto
mixta, colatur. libr. 111.
adde:*

Мор-

Морской соли.

Нашатырной соли по 2 унца.

Винного есѣткальнаго спирта
2 унца. (дѣлай припарку.

Изъ внутри употребляемыхъ разбивательныхъ
лекарствъ есѣть слѣдующій, съ превеликою поль-
зою употребляемый, отваръ:

Возьми релейнаго корня.

Сарсапарилловаго.

Хины по 3 унца.

Вари нѣ довольносмѣ коли-
чествѣ воды, послѣ придай:

Сасафроваго дерева 3 унца.

Дай: закипятъ, послѣ и мѣ-
ди 2 кружки отвара и при-
дай: сиропа 5 пропусковыхъ
или разбивательныхъ ко-
реньевъ 3 унца. Давать дол-
жно отваръ сей дважды два
часа по чашкѣ.

RC. Rad. bordane.

Sarsaparil.

Chinæ aa unc. III.

C. in f. q. aq. dein adde:

Ligni sassafras unc. III.

Et si ut, deinde adde
pintis II adde: suc-
e 5 rad. aperient. unc. II.

Есѣтьлиже ни сѣи лекарства, ни кровопусканія,
ни слабленіе желудка не пособятъ больному; то
должно прсбуравить черепъ, вынявъ закипелую
кровь, стоячую подъ черепомъ, и сдѣлать над-
лежащую перевязку, изъ надерганныхъ илѣ чи-
стой вепощки нитокъ, обмоченныхъ въ розовомъ
меду и мастиковомъ или винномъ спиртѣ, и
вложенныхъ въ апертуру такъ, чтобъ они нахо-
дились подъ краями апертуры, также хотѣй и въ
лодушечекъ (plustaffan) называемыхъ и другихъ къ
тому потребныхъ матерій и перевязокъ, кото-
рую однакожъ перевязку дражды въ день пере-
мѣняшь должно, пока сывѣтъ не заживетъ рана.

Между пѣмѣ, не должно дѣлать излишняго послабленія мозгу, дабы отъ того не сдѣалось дикаго мяса и другихъ тому подобныхъ наростовъ, испребляемыхъ послѣ жигучими лекарствами: каковы суть синея хулорозъ и жжыныя квасцы.

ГЛАВА LXXVI.

О леченіи переломовъ de curatione fracturatum.

§ 1154. Переломъ лечится 1) чрезъ встанавливаніе, либо приведеніе концовъ или конечностей переломленной кости въ натуральное положеніе; 2) укрѣпленіе и зжелезненіе и 3) чрезъ надлежащее болѣзненныхъ припадковъ врачеваніе

§ 1155. Къ встанавливанію принадлежатъ: растягиваніе и выщипленіе.

Растягиваніе (extensio) должно производимо быть взглядомъ величины костей и естественнаго или противоестественнаго оныхъ положенія; довольное же учинено бываетъ растягиваніе, когда нѣкоторая яма, или впадина около болѣзнующаго мѣста усматривается.

§ 1156. По учиненіи растягиванія и соображенія должно обращать вниманіе свое труды, чпобы сокрушенные члены сохранять въ натуральномъ ихъ положеніи, а наипаче посредствомъ перевязокъ; для учиненія чего должно приложитъ

жить охранительной или дефенсивной пластырь и употреблять перевязки; также тщательно наблюдать надлежащее тѣла, а наипаче сломленного члена, положеніе.

§ 1157. Что касается до леченія болѣзненныхъ припадковъ; то прежде всего взиращъ должно на укрощеніе боли, къ чему служитъ мурашковой камфорной спиртъ и спиртъ богородской травы (*Spiritus ferpilli*).

§ 1158. Въ переломахъ не должно употреблять мазей, также и тѣхъ средствъ, о которыхъ сказано при леченіи сведеній или скорченій.

ГЛАВА LXXVII.

О леченіи ранъ *de curatione vulnerum.*

§ 1159. Раны (§ 755) лечатся: 1) чрезъ очищеніе, 2) залечиваніе или заживаніе оныхъ и 3) чрезъ приличное болѣзненныхъ припадковъ врачеваніе.

§ 1160. Чтобы достигнуть первой цѣли; то прежде всего должно стараться о томъ, чтобы находящіяся постороннія въ ранѣ вещи приличными изъять орудіями, а потомъ огуснѣлаую кровь превратить въ сукровицу; а ту, которая глубже находится въ ранѣ, надлежащимъ разбить образомъ, и слѣдственно отворачивать надлежащимъ большее къ ранѣ крови и другихъ влагъ припеченіе.

§ 1161.

§ 1161. Сукровица или гной производится чрезъ прикладываніе дигестивной или россобной, разводящей то есть вязкости, мази (per digestivum), составленной изъ личнаго желтка, меда, ладана, мастики, гумми или калмеди, называемой *влемми* (gummi elem.) и небольшого количества *терлентина* (resilla terentina); также чрезъ отвары, составленные изъ заживлятельныхъ ранъ травъ, смѣшанные съ перечисленнымъ или перешоленнымъ медомъ; а наконецъ въ семьъ разу съ пользою употребляется липы курительнаго табаку съ жиробойнымъ масломъ (cum oleo hypericis).

§ 1162. Кровь, находящаяся глубже въ ранѣ, разбивается чрезъ заживлятельныя или охранительныя средства, приготовленные изъ жабьей слезы (e spermate ranarum), ладановъ (palmarum) и дольки вмѣстѣ съ глетомъ (melilotocom lytargurio); также чрезъ корень, на пр: *фіялковъ корень* (iridis florentina), *ластовичей корень* или *корень чертовой бороны* (radix viciae), ромашки и бѣлыя, вкупѣ съ липовымъ камфарнымъ спиртомъ.

§ 1163. Заживленіе производится посредствомъ balsamiceskix тинктуръ (per tinctoras balsamicas), каковы сунтъ:

Винная масть или черная масть изъ куркумы	Per essent. bals. Stallii. G.
Сѣбяной мастицы	empl. de minio nigricans, alias Noriberger-
Мастицы сѣбяной мастицы	le camphoratum.
Берберкой.	

Или

Или живучей Кролѣевъ пла-
стырь, который соотвѣщается
такъ :

Мозги дѣлного и деревяннаго ма-
сла по 1 фунту.

Лавроваго масла 3 унца.

Порошка изъ сурика и галмее
приготовленнаго по 6 унцовъ.

Воска 3 фунта.

Глеипа 12 унцовъ.

Кинифолїи.

Смола или резины по 1 фунту.

Терпентина полфунта.

Гумми Аммонїаческой яди на-
шатырной.

Оппопонакса.

Галбана.

Саганена

И бѣлїи или Индейской каме-
ли по 3 унца.

Приготовленнаго яшара 2
унца съ половиною.

Смирны.

Сабура.

Авалана.

Корни киркизовата или конар-
няковаго по 3 унца.

Приготовленнаго матиша.

Кровавика также пригото-
вленнаго по 5 унцовъ.

Красныхъ и бѣлыхъ пригото-
вленныхъ коральковъ.

Зѣбной крови.

Печашной земли.

Бѣлыхъ ивасцовъ.

Желѣзней ржавчины.

Камфоры по 1 унцу съ медѣ-
лей пластырь.

Vel emplastr.ript. Cro-
lii. quod sic paratur :

RC. Olei lini & olivarum aa
libr. i.

Lavr. unc. iiii.

Pulveris minii lapidisque
calaminaris aa unc. VI.

Ceræ libr. iiii.

Litargyrii unc. XII.

Colophonii.

Resinæ aa libr. i.

Terebinthinæ libr. i.

Gummi ammoniaci.

Oppoponacis.

Galbani.

Sagapeni &

Bdelii aa unc. iiii.

Succini præparat. unc.
ii. & semis.

Morrhæ.

Aloes.

Olibani.

Rad. arctilochiæ aa
unc. ii.

Lapid. magnet. præ-
parat.

Haemotitis præparat.
aa unc. V.

Corall. rubr. et alb.
præparat.

Singulis draconis.

Terræ sigillatæ.

Vitrioli albi.

Croci martis.

Campbor. aa unc. i.
m. f. l. a emplastrum.

§ 1164. Для отвращенія рубца послѣ заживленія раны случающагося, надлежитъ употреблять сушищельные порошки.

§ 1165. Болѣзненные припадки лечатся слѣдующимъ образомъ: вопервыхъ должно спарить уняшь кровотеченіе, а наипаче смотрѣть, чтобы не весьма скоро оное оспанавливать.

§ 1166. Потомъ должно промывать рану и очищать винными отварами, изъ корня красной генціаны или старадубки (*gentianæ rubræ*), въющагося жиркизоха (*aristolochiæ rotundæ*), мауна или балдырьяна (*valerianæ*), чертовой бороды (*vincetoxici*), травы называемой коневій чеснокъ (*herba scordii*), руты, и симъ подобныхъ прозябеній.

§ 1167. Послѣ очищенія раны надлежитъ уняшь теченіе крови, что можно учинить прожимъ образомъ: или по естѣ залираніемъ истохоуъ (*exitia*), или сущеніемъ, или влаженіемъ.

§ 1168. Истоки запираются прикладываніемъ хирургическаго гриба, называемаго дождевижъ (*serpitus lupi*). Большую же силу уполенія имѣетъ слѣдующій порошокъ, которой вкупѣ съ дождевиками прикладывавать должно:

Возьми смолы, которою чер- RC. Resinæ scriniariæ.
нитъ сундуки, или вару.

Арапской камеди.

Gummi Arabici.

Трагакантны.

Tragacanthæ.

Корня дошакова уха по 2 ун-
ця.

Radicis consolidæ ma-
joris aa unc. II.

Оуѣ

Опія или соннаго зелья; въ
золу пережженного, 4 скрупе-
ля, стѣшай и составъ поро-
шокъ.

Opii ad cineres usti
secur. IV. m. f. pul-
vis.

§ 1169. Сгущеніе производится помощію
двоякой водки, или весьма усиленнаго виннаго
спирта (per spiritum vini rectificatissimum) и купоро-
сной и сѣрной кислоты (per vitrioli et sulphuris
spiritum). Самымъ же удобнымъ и самымъ луч-
шимъ средствомъ почитается прижиганіе рас-
каленнымъ желѣзомъ.

§ 1170. Для вязанія съ пользою употре-
бляется порошокъ, составленный изъ черниль-
ныхъ орѣшковъ (pulvis gallarum), жерки грано-
витыхъ яблокъ (cort. pomorum granat.), заязвлаго
корня или седмилалочника (rad. tormentillæ),
корня лошакова уха (fumphii), травы назы-
ваемой змѣевъкъ или сабельникъ (bistortæ),
животныхъ цвѣтовъ (flor. balaniflorum), и сѣмян
жонскаго щавеля или чистотѣла.

§ 1171. И сіи-то средства снаружи упо-
треблять должно; внутрь же предписывать над-
лежитъ удобныя къ большому сжиманію волок-
новъ, или укрѣпляющія сердце (cardiaca) и
студенистыя лекарства (gelatinosa).

§ 1172. Впрочемъ надобно беречься, чтобы
прежде времени не остановить кровоотеченія, а
наипаче въ многокровныхъ и напильхъ людяхъ;
ибо такимъ образомъ изъ простой припадочной
(symptomatica), прикинувшейся то есть ошъ при-

чиненной раны, лихорадки можетъ сдѣлаться воспалительная. Кровопускание производить должно, когда кровотечение скоро остановится и воспаление угрожать будетъ. А еслили кровотечение происходитъ отъ поврежденія бѣющихъ и крововозвратныхъ жилъ; то въ такомъ случаѣ кровопускание оставить должно. Прижиганіе же бѣющихъ жилъ ни дѣйствительное, ни такъ называемое *могутное*, имѣющее то есть силу прижигать, никакого мѣста не имѣетъ; для того, что такимъ образомъ можно ввернуть больного въ жесточайшее бѣдствіе.

ГЛАВА LXXVIII.

О леченіи вередовъ de curatione ulcerum.

§ 1173. Способъ лечить вереды мало различуется отъ способа лечить раны; совершается же оной 1) чрезъ очищеніе, 2) чрезъ заживленіе.

§ 1174. Очищеніе какъ снаружи, такъ и изнутри производить должно. Наружное очищеніе пребудетъ вычищенія и извѣтія нечистотъ, находящихся въ вередѣ; для достиженія чего хорошо присыпать вередъ порошкомъ, составленнымъ изъ *жюна Ариновой оброды* (с radice Ari), *жархизохи* (aristolochiae) и *старубжи* (gentianae rubrae), наконецъ пребудетъ отнятія и истребленія наростовъ, нарастающаго то есть дурнаго мяса, и укрѣпленія поврежденныхъ частей,

что

что совершается помощію бальзамическихъ пособныхъ, варенію то есть пособляющихъ и разводящихъ вязкость лекарствъ, составляемыхъ изъ личнаго желтка, смирны и небольшого количества терпентина и меда.

§ 1175. Внутреннее очищеніе производится испраженіемъ. Къ чему служатъ легкія слабительныя лекарства и употребленіе бальзамическихъ средствъ. Для обыкновеннаго же отвара или пипья, можно употреблять траву, называемую лечуха (*herba faniculae*), жерель (*chierrefolii*), львоу лапу (*alchimillae*, тысячелетникъ (*millefolii*), бурду или котятникъ (*haedra terrestris*) и грушовку (*pyrolae*).

Впрочемъ естли вереды будутъ мокротные и гнусные, то полезно употреблять извѣстную воду съ розовымъ медомъ и водяною тинктуурою смирноюю, а послѣ лождолиной или шліаутовой пластырь (*emplastrum Diapompholigos*).

О лекарствахъ, которыя спосѣшествуютъ къ заживленію вередовъ уже сказано въ предыдущихъ — §. §.

§ 1176. Естли страждущіе вередомъ будутъ многокровны, то должно пустить кровь или поставитъ рожки. Напротивъ тщательнo беречься надлажитъ, чтобы неупотреблять изъ ртути составленныхъ лекарствъ, а наипаче избѣгать нужно минеральнаго турлета (*turgetum minerale*), сулемы или возвышеннаго ртути

(mercurium sublimatum), мышьяка (arsenicum) и купоросныхъ, съ купоросомъ то есть приготовленныхъ, лекарствъ (vitriolata).

ГЛАВА LXXIX.

О леченіи костоѣды или гнили въ костяхъ de curatione cariei.

§ 1177. Гниль въ кости или костоѣда лечится бальзамическими лекарствами и ѣдкими маслами напр. жоричевымъ масломъ (oleum cicutarum), звездичнымъ масломъ (oleum caryophyllorum); также тинктурою, составленною изъ сабура (per tincturam aloes) и другими сильнѣйшими сопроотивляющимися гнили лекарствами, каковы суть Вурцьева и Египетская мази (Unguenta Wurtzii et Aegyptiacum).

§ 1178. Еслили же сіи средства не пособятъ; то должно рѣшиться на произвѣденіе слинопеченія или саливацію, и наконецъ срѣзаніе и прижогу гнилой кости.

§ 1179. При леченіи гнили въ костяхъ должно воздерживаться отъ употребленія жирныхъ матерій и ѣдкихъ, въ любострастной, или сказать яснѣе, въ Венерической болѣзни употребляемыхъ, лекарствъ. А еслили гниль прикинулась отъ любострастной жизни, то надлежитъ употребить древесной отвара (decoctum lignorum), изъ сассафрового дерева (e ligno sassafr.), зваяковаго

де-

дерева и сарсапарилловаго корня (e radice sarsaparillae), избѣгая при томъ употребленія твердыхъ, соленыхъ и раждающихъ вътры кушаньевъ.

ГЛАВА LXXX.

О леченіи тугихъ олухолей или скирровъ
de curatione scirrhorum.

§ 1180. Тугія олухоли лечатся 1) испражненіемъ и 2) разбиваніемъ.

§ 1181. Испражненія производить должно легкими слабительными лекарствами; а разбиваніе предпринимать надлежитъ помощію опваровъ, каковы напр. супъ: опваръ изъ корня бѣлаго лимонелла или совиной стрѣлы (e radice raprínellae albae), че товой бороды или ластовичьяго корня (vincetoxici), лнтаря (succino) и лоспѣшнестеющей испаринѣ сурьмы (antimonio diaphoretico).

§ 1182. Снаружи употребляя надлежитъ разбивательныя и мягчительныя лекарства какъ то: изъ просфирняка (e malva), дикой жожи или просфирохъ (althaea), изъ цвѣтовъ садовой ромашки (e floribus chamomillae romanae), маерана и зѣвробя (Majorana et hyperico), каковыя вещества должно варить въ мѣшечкахъ въ винѣ, и теплые прикладывающъ къ болѣзнующему мѣсту; а еспѣли больной будетъ многокровоной, то нужно пустить кровь.

§ 1183. Наконецъ если разбить не можно будетъ, то должно разрѣзать опухоль крестообразно; но прежде нежели сіе учинено будетъ, надлежитъ перевязать сосуды, и послѣ разби- ванія прикладывать дигестивныя или пособныя лекарства.

§ 1184. Мягчительныя лекарства съ осторожностію употреблять должно, дабы непричинить большаго гніенія; пластырь Выгононъ изъ лягушекъ вкуиѣ со ртутью соспавленной, съ осторожностію употреблять должно: потому, что блага по причинѣ вхожденія лягушекъ въ соспавъ помянутаго пластыря, больше еще стущающа и затвердѣвающъ; лучше въ семъ случаѣ способствуетъ мыльной Барбеттовъ пластырь (едр. Barbett. saponatum), или свинцовой Града Дигбы, которой составляется такъ:

Возьми сурика.	RC. Minii.
Вѣшнѣ.	Cerussae.
Грѣзата Венетъ 3 унцѣ.	Saponis Veneti aa unc. V.
Деревяниаго масла 2 фунтз.	Olei olivae lib. II
Свинцоваго 1 унцѣ.	Axungiae porcinae unc. I.
Смѣшай и сѣлай съ примѣ- сомъ 1 золотника камфоры пластырь.	M. f. l. a. cum cam- phorae dr. I. emplā- strum.

Наконецъ должно смотрѣть, чтобы не произвѣсти слѣдствіи и неупотреблять оліа; ибо употребляя средства сіи въ леченіи тугихъ опухолей, не пользу какую либо принести, но

по-

помертвѣніе (sphacellum) ускорить можно. Не должно также употреблять прикладокъ, съ молокомъ приготовляемыхъ.

ГЛАВА LXXXI.

О леченіи паховиковъ или бубоновъ de tigatione bubonum.

§ 1185. Желваки или паховики лечатся разбиваніемъ и отвореніемъ нарывовъ; а послѣ заживленіемъ оныхъ.

§ 1186. Для споспѣшествованія разбитію употребляются мѣшечки, сдѣланные изъ травъ, кореньевъ и цвѣтсовъ, силу разбивать имѣющихъ, вкупѣ съ камфорнымъ спиртомъ; также дягильной пластырь съ гуммиами (emplastrum diachylum cum gummitibus), пластырь изъ морского лука и хитоза мозга составленный (empl. de cicuta et sperm. ceti.)

§ 1187. Еслили не можно будетъ разбить оныхъ; то должно стараться произвестъ нарывъ чрезъ прикладываніе припарокъ и мягчительныхъ пластырей, и по учиненіи загноенія отворить оный.

§ 1188. Заживеніе разрѣзанныхъ паховиковъ должно предоставить одной натурѣ.

Еслили нарывъ откроется; то должно употреблять бальзамическія лекарства.

Въ морюхахъ или моровой язвой причиненныхъ паховикахъ (in bubonibus pestilentialibus)

можно употреблять дѣйствительныхъ прижогъ (*cavteria actuaia*), но въ любострастныхъ половикахъ должно давать вкупѣ и отварѣ изъ геалковаго дерева (*descoctum e gvaiaeo*), сасафрового дерева (*sassafras* и сарсалириловаго корня (*et radice saraparillae*).

§ 1189. Въ леченіи паховиковъ должно воздерживаться отъ употребленія опшбивательныхъ, внутрь то есть вгоняющихъ болѣзненную матерію, лекарствъ (*epellantia*).

ГЛАВА LXXXII.

О леченіи раковъ *de curatione cancerorum.*

§ 1190. Въ леченіи рака надобно взирать наипаче на то, сокрытъ ли онъ еще находящся, или уже открытъ и обращенъ въ вередъ.

§ 1191. Въ сокрытомъ ракъ полезенъ супъ кровопусканія, въ приличное время производимая, употребленіе слабительныхъ лекарствъ: изъ ревеня (*rhabarbarum*), Ангельской сладости (*polypodium*) и гриба или волжанки (*et agarico*) составленныхъ, всасывательныхъ или утоляющихъ кислоту лекарствъ (*absorbentia*) и легкихъ, испарину гонящихъ, средствъ; также и бальзамическихъ лекарствъ (*balsamica*).

При наружномъ леченіи рака не много лекарствъ употреблять должно, но вмѣсто оныхъ надлежитъ употреблять виинной жемчужной

ной спиртъ, или опваръ изъ морскаго лука
(*decoctum cicutæ*).

§ 1192. Открытые или обращенные въ раны и разгнившіяся раки лечатся 1) очищеніемъ, 2) отгаращеніемъ и восплащеніемъ гнили, 3) заживленіемъ или заживленіемъ и 4) наконецъ вырѣзываніемъ.

§ 1193. Къ очищенію раковъ способствуетъ жирличное масло вкулъ съ яичнымъ масломъ (*oleum laterinum cum oleo ovorum*) употребляемое.

§ 1194. Препятствуется же умноженію гнили тогда, когда препятствуется большому мокротѣ припеченію къ спржающему мѣсту; печему въ шаквомъ случаѣ должно приклады-
вать весьма хрѣлкй и весьма усиленной вин-
ной спиртъ, коротко двоеную воду со смир-
новою и янтарною эссенціею (*spiritus vini rectifi-
catissimus cum essentia mirrhæ et succini*); хорошо
также употреблять масло и соль, получен-
ныя изъ сажи, а внутрь давать цикутныя
лилюли (*pilulæ de cicuta*).

§ 1195. Заживленіе производится помощію
бальзамическихъ лекарствъ.

§ 1196. Вырѣзываніе рака имѣетъ мѣсто въ
пѣхъ только путей опухоляхъ, которыя
суть посвѣже, а когда учинено будетъ вырѣ-
заніе; то тогда должно будетъ остановить
кровотеченіе, помощію спитическихъ, живу-

чихъ по есть или вязательныхъ средствъ (stripta), или учиненіемъ дѣйствительной прижогы (actuale cauterium).

Въ леченіи рака похваляется также масло Гёфен-рефферова (oleum Hefenrefferi), вода Вейхардова, (aqua Weichardi), масло изъ липничныхъ цвѣ-
тѣвъ Преоцѣво (oleum flor. tritici Praevotii), масло изъ лунной фіалки, или богородской травы, иначе называемой хуцрлвцемъ (oleum linnariae s. battrydis); наконецъ масло изъ ежи и ея соль (oleum fuliginis et ejus sal) все что снаружи употребляется.

§ 1197. Внутрь давать должно въ леченіи рака всасывательныя или уполяющія кислоты (absorbentia) и съ ревенемъ приутовляемыя лекарства, причемъ надлежитъ избѣгать всякихъ кислыхъ и твердыхъ яствъ, также крѣпкихъ напитковъ и душевныхъ спростей, какъ-то гнѣва и любострастія.

§ 1198. Впрочемъ должно воздерживаться при леченіи рака отъ употребленія жирныхъ и гноющихъ, ускоряющихъ по есть нарывъ вреда лекарства (maturantia), и приутовляемыхъ съ опіемъ или сгущеннымъ сокомъ изъ маковыхъ головокъ (ab opiatia). Также сколько возможно воздерживаться должно отъ камфарнаго эли-
рти въ леченіи превращеннаго въ рану рака, и какъ заразы избѣгать употребленія съ мышьякомъ, ртутью и оперментомъ (cum avigmento) составленныхъ лекарствъ. Въспо-
обыкновеннаго питія полезно и нужно предписы-

ватнѣ отварѣ изъ корня: *лемпинеллы* или *соеиннѣ стрѣлы* (*decostum radicis peripollae*) и *корня Лароновой бороды*. (*agum*).

ГЛАВА LXXXIII.

О леченіи кровонабітій или Аневризмовъ *de curatione Aneurisimatum.*

§ 1199. Аневризма или кровонабітіе (§ 774) лечится помощію вязапелельныхъ лекарствъ (*per. cemed. adstringentia*), перевязкою и дѣйствіемъ или операціею хирургическою, то есть чрезъ разрѣзываніе и изыятіе огустѣлой крови.

§ 1200. Надобно беречься, чтобы вышепомянутой опухоли не привестъ въ загноеніе или неопважиться на дѣйствительную прижогую, по причинѣ артеріозныхъ или несущихъ кровь во всеѣ части тѣла, сосудовъ.

ГЛАВА LXXXIV.

О леченіи жилонатраженій *de curatione varicum.*

§ 1201. Жилонатраженіе или напукхлыя жилы лечатся разбивательными лекарствами, (*resolv.*) или чрезъ отвлеченіе или отбиваніе, еспли таковая напукхлость причиняетъ боль и жаръ, которое отбиваніе производить можно

помощію пластыря, изъ жабыей спермы состав-
ленную (empl de spermate gargarum), или чрезъ
прорѣзаніе, когда послѣ можно будетъ при-
ложить вязательной или живучей пластырь
Кроліевъ (empl. siptic. Crolii).

§ 1202. Когда напухлыя жилы мокнутъ; по-
въ такомъ случаѣ должно промывать оныя
весьма хрѣпкимъ виннымъ спиртомъ, однако
такъ, чтобы неостановить безвременно теку-
щей вредоносной матеріи. Внутрь же для упо-
ленія боли надлежитъ предписывать укрощающія
жаръ лекарства, и ставить промывательныя.
Напропивъ сѣрныхъ, съ сѣрою по естѣ пригото-
вованныхъ, лекарствъ всякимъ образомъ избѣ-
гать должно.

§ 1203. При леченіи кровонабитій не должно
употреблять ни прижогъ, ни вырѣзываній.

Г Л А В А LXXXV.

О леченіи грыжей или килъ de curatione herniarum.

§ 1204. При леченіи килъ должно взирать на
спраждующую часть; ибо кила иная естѣ пу-
пошная (hernia umbilicalis), иная мошонковая
(scrotalis), иная брюшная (ventralis).

§ 1205. Пупошная кила лечится чрезъ вкла-
дываніе или встановленіе и удержаніе. При
чемъ можно употреблять прикладки и мягчи-
тель-

тельные припарки. Наконецъ при безуспѣшномъ дѣлѣ должно учинить операцію, въ которомъ случаѣ пухлина крестообразно разрѣзывается.

§ 1206. Мошковую и брюшную грыжи такимъ же образомъ пользовапъ должно, какъ и пулошные.

§ 1207. Въ леченіи пулошной килы или грыжи не должно употреблять птянущихъ влаги средствъ, дабы такимъ образомъ не причинить антонова огня. *Килорѣзніе* (*herniothomia*) всегда есть опасное; къ заживленію не должно употреблять вязательныхъ пластырей; *ц-либуку* (*strychnos f. nux vomica*), хотябы она съ электурѣиъ, изъ лица сдѣланнымъ, *Максимилиановымъ* называемымъ, смѣшана была, не совсѣмъ есть безопасно употреблять. Пищи одувающей, раждающей вѣтры и швердой избѣгати нужно; также чрезвычайнаго движенія и упаденія; припомъ не худо употреблять промывательныя, вѣшрогонительныя или унимающія вѣтры лекарства, и желудокъ всегда сохранять свободнымъ.

ГЛАВА LXXXVI.

О леченіи отековъ de curatione oedematum.

§ 1208. Отекъ лечится размягченіемъ и разбиваніемъ. Въ семъ случаѣ хорошо мягчитъ и вкупѣ разбиваетъ *мелиотной* или *доннико-вой* пластырь, естли къ нему не много камфоры

форы примѣщено буденѣ; также мѣшечки, въ винѣ и уксуѣ отваренныя, конырыя можно прикладывать теплые кѣ опекѣ; можно также прикладывать корень Соломоновой печати (*radix sigilli Salomonis*) и трату, на нѣмецкую лѣстовичную траву или небесный даръ (*chelidonii herba majoris*).

Внутри неопимѣнно надлежитѣ давать крѣпительныя лекарства, какова естѣ сѣя кашица:

Возвѣи конфекта садовой до- жечной травы подипора унца.	RC. Conserv. cochl. hort. unc. i et semis.
Степной полыни.	Ab ynthu romani.
Померанцевыхъ корокъ по 1 унцу.	Flaved. cort. avrant. aa unc. I.
Дягилеваго приправленнаго корня.	Rad. angelic. cond.
Приправленнаго мушкатнаго орѣха по полуунца.	Nucis moschatæ cond. aa dr. f.
Андроманова ерѣжа 3 золот- ника.	Theriac. andromach. dr. III.
Померанцеваго сиропа сколько потребно.	Syr. avrant. q. f.
Стѣшай и давай по чайной ложкѣ нѣсколько разъ въ день.	M. d. cochlear. ali- quoties de die.

§ 1209. Въ леченіи опёковъ надлежитѣ воздерживаться отѣ насѣченія на кожѣ или екарификаціи (*scarificatio*), отѣ плавленія, ей весьма клмедистыхъ (*empl. valde gummosis*) и смолянистыхъ, отѣ перегонныхъ маселъ (*oleis distillatis*) и отѣ жирныхъ вязательныхъ и сумнительныхъ лекарствъ. (*ab exsiccantibus*).

ГЛАВА LXXXVII.

О леченіи сухожильныхъ желваковъ de
curatione gangliorum.

§ 1210. Сухожильные желваки лечатся раздробленіемъ и разбиваніемъ.

Въ семъ случаѣ хорошо разбиваютъ пластыри изъ Аммоніаковой или нашатырной гумми или камеди, изъ галбана (gálbano), сагалена (sagaréno) и Индейской камеди, бдели называемой (bdeli), соспавленные. Но прежде прикладыванія пластырей надлежитъ намазывать сухожильной желвакъ масломъ сладкаго миндаля. Разбиваются сухожильные желваки и прижиманіемъ, что производится помощію бляшекъ, изъ свинца и желѣза сдѣланныхъ. Особенныя же суетѣрныя опъ таковыхъ желваковъ лекарства, впрочемъ споль много хвалимыя, не заслуживаютъ того, чтобъ оныя здѣсь вычислять.

ГЛАВА LXXXVIII.

О леченіи мясныхъ наростѣній de curati-
one carniū luxuriantium.

§ 1211. Дикое мясо или мясное наростѣннѣе лечится легкими съѣдательными и разбивательными лекарствами, съ примѣшиваніемъ къ онымъ не большаго количества камфоры. Наконецъ испребляютъ оное и вязательныя лекарства. Впрочемъ не должно пренебрегать и очищеній вередовъ.

§ 1212.

§ 1212. Въ леченіи мяснаго наростѣнія надлежитъ беречься отъ употребленія сильнѣйшихъ лекарствъ; вырѣзывать же оное по причинѣ опасности великаго кровотеченія не совсѣмъ безопасно есть.

ГЛАВА. LXXXIX.

О леченіи носовой каракатицы *de caratione polypi naſium.*

§ 1213. Носовая каракатица лечится легкими ѣдкими лекарствами, каковы суть жженныя жемцы, и прочая. Или разрѣзывается ножницами и извлекается, или подрѣзывается бритвою, что въ такомъ случаѣ часто употребляется.

§ 1214. По изсребленіи каракатицы остатки оныя надлежитъ уничтожать вышесказанными съѣдательными лекарствами, къ которымъ однакожъ примѣшивать должно и вязательныя.

Къ очищенію и залечиванію надлежитъ употреблять бальзамическія лекарства.

§ 1215. Не должно употреблять порошка, изъ подсолочника приготовленнаго (*pulvis. Heliotropii*), толико отъ *Потерія* превозносімаго. Вырѣзыванія каракатицы, по причинѣ великаго кровотеченія и дѣйствительной прижого опасаться должно; припомъ не должно предприни-

мать леченія каракапиды, развѣ когда начнетъ умаляться луна *).

о) Какое дѣйствіе сдѣсь умаленіе луны имѣло бы, о томъ не можно ничего точнаго сказать; а что многіе есць случаи, сіе сочинителямъ янѣнїе подтверждающіе, о томъ чаю всякому не безызвѣстно, наче примѣнявшимуся не суетно къ наблюденїямъ и замѣчанїямъ простыхъ людей.

ГЛАВА LXXXX.

О леченїи ножныхъ мозолей *de curatione clavorum pedium.*

§ 1216. Случающіяся на ногахъ мозоли лечатся размягченіемъ и сниманіемъ, или искорененіемъ оныхъ.

Первое дѣйствіе совершается помощію ножныхъ банъ или баненій ногъ, составленныхъ изъ мягчительныхъ травъ и цвѣтовъ, или жирныхъ лекарствъ, каковы супъ свиное сало, желтой есекъ, масло изъ бѣлыхъ лилїи и скалидара (*terebinthinae oleum*). Сниманіе же производится помощію приличныхъ къ тому орудій. Похваляется также въ семъ случаѣ употребленіе мази изъ еоска, галбана и напатыря составленной (*ceratum de galbano & ammoniaco*).

Понеже сниманіе или вырѣзываніе и прижиганіе мозолей, часто не безъ опасности производятся для того безопаснѣе можно прикладывать къ нимъ ярь (*vicide aeris*), и ей подобныя вещества.

ГЛА-

ГЛАВА LXXXI.

О леченіи грыбчатыхъ мясныхъ наростовъ
de curatione
fungorum.

§ 1217. Грыбъ или избытокъ мясной наростъ лечится посредствомъ легкихъ съдающихъ лекарствъ (*septica leniora*) къ которымъ можно примѣшивать не много или нѣсколько капель и скилидарнаго или терепинтинаго и ладаннаго масла (*oleum terebinthinae & spicae*). Можно также употреблять *Вилетъ*жую мазь (*unguentum Aegyptiacum*), или безъ всякой опасности съдающей порошокъ:

Возьми корня выщегося кирки-	RC. Rad. aristolochiae rotundae.
Фіалковаго корня по 1 унцу.	Iridis Florentinae aa псс. 1.
Трехъ Бигульничкой.	Herbae coris. marini.
Шатрейной.	Salviae.
Рутной по 1 горсти.	Rutae aa manipul. 1.
Избранной смирны.	Myrrhae electae.
Ладана по полунца.	Olibani aa псс. sem.
Смѣшай и съблай порошокъ.	M. f. pulvis.

Кромѣ вышесказанныхъ средствъ остаются еще перевязка и вырѣзываніе. Однако прежде учиненія операциі должно всегда пускать кровь и слабить желудокъ. Въ прочемъ похваляется еще и *Алосп* олическая или двенадцатисоставная мазь (*unguentum Apostolicum*), которою намазываютъ дикое мясо.

При леченіи грыбчатыхъ мясныхъ наростовъ не должно употреблять съ мышьякомъ приготовленныхъ и разъдащельныхъ лекарствъ. Мя-

Мясное наростеніе или дикое мясо снаружи глаза (*encanthis*) лечится такимъ же образомъ, какимъ мягкія опухоли на сухихъ жилахъ. Разнымъ образомъ пользующся и наросты на деснахъ. (*epules*).

ГЛАВА LXXXIII.

О леченіи мясныхъ шишекъ или желѣзъ, бородавокъ, любостристныхъ шишекъ или франковъ и колтунѣвъ или волососплетеній *de curatione thymorum, verrucarum, varicolarum magnarum et Plicarum Polonica*.

§ 1218. Бородавки, мясистые наросты или желѣза (*thymi*), любостристные шишки и колтуны (*plicae Polonicae*) лечатся умѣренными ѣдкими лекарствами; а если средства сіи будутъ недовольны; то въ такомъ случаѣ должно перевязывать оныя лошадинымъ волосомъ, либо сръзывать съ пѣла.

Однако должно оставить вырѣзаніе бородавокъ, когда оныя будутъ велики. Прежде нежели спавешь прикладывать сѣдающіе лекарства, надлежитъ нѣсколько нарѣзывать бородавки.

ГЛАВА LXXXIII.

О леченіи плевныхъ бодырей, желтою матерією наполненныхъ *de curatione meliceridum.*

§ 1219. Плевная шишечка, небольшой желвакъ или нарывъ, содержащій въ себѣ медо-подобную матерію (*meliceris*), и сальной, заключающій по естѣ въ себѣ матерію салу подобную, волдырь (*scatoma*), также желвакъ, содержащій кайшицу подобную матерію (*atheroma*), лечатся чрезъ разбиваніе и раздробленіе либо разведеніе, или разрѣзываніе.

§ 1220. Разбиваніе желваковъ производится посредствомъ легкихъ помѣстныхъ лекарствъ, каковы суть: цикутной камфарной пластырь (*emplastrum de cicuta camphoratum*, или Вигоновъ лягушешной, со ртутью приготовленной, (*emplastrum de ranis Vigonis cum mercurio*), либо дягильной съ гуммами сарачной (*emplastrum diach. cum gummatis*). Можно также придавливать оныя дощечкою, изъ желѣза сдѣланною.

§ 1221. Еслили попотребуется необходимость разрѣзыванія; то надлежитъ разрѣзывать крестообразно и выдавливать гнойную матерію; по учиненіи чего впускать должно въ язвину изъ смирны и янтаря составленные лекарства, съ примѣщаніемъ къ онымъ небольшого количества скилидара и мастики.

§ 1222.

§ 1222. Въ леченіи *плесневыхъ желзакотъ* не должно употреблять съѣдающихъ и разѣдающихъ (corroſiva) лекарствъ; также *ртутнаго масла* (oleum mercurii), а *саливацы* или *сликотеченія*.

ГЛАВА LXXXXIV.

О леченіи *летучихъ огней, лишавъ и огниковъ* или *чесотныхъ болячекъ* de curatione fe piginum, lichenum & herpetum.

§ 1223. *Летучій огонь*, *лишай* (lichen), и *чесотная болячка* или *огчикъ* (herpes) лечатся испражненіемъ и исправленіемъ испорченной пасоки или кровной влаги, а снаружи очищеніемъ или омываніемъ.

§ 1224. Испражнение производится сладкими и ѣжными слабительными лекарствами, составленными изъ *режени* (e rhubarbaro), *манны* (manna) и *Александрійскаго листу* (folia fenugrec).

Послѣ должно пустить кровь изъ ноги въ довольномъ количествѣ, а наипаче тогда, когда и *геморой* вмѣстѣ случится.

§ 1225. Пасоку исправляютъ *противоцынготныя* (antiscorbutica) лекарства; каковы суть *иръ* (ascorut), *чеснокъ* (allium), *сельдерей* (aprium), *зубной корень* (cichorium), *цынготная трава* (bessabanga), *пулей* (pulegium), *узычная трава* (stachas), *сасафрозное дерево* (sassafras), *гребни-*

щиковое дерево (*tamariscus*), глиной камень (*tartarus*), лютыея капли Мейсбюмъ (*tinctura aperitiva Meibom.*), разбавительныя капли Людовиковы (*tinctura aperitiva Ludovici*), лютый воздухъ (*aer fixus*), и симъ подобныя лекарства.

§ 1226. Чтобы очистишь раны; то надлежитъ употреблять снаружи или орѣлыя и волючія масла (*olea empyreumatica*), волючее синнокаменное масло (*oleum tartari fetidum*), масло изъ сажи и хлопчатой бумаги (*oleum fuliginis et rari*) полученисе; а естли раны не станутъ заживати сами по себѣ; то должно прикладывати живучей пластырь Кролессъ (*empl. fir. Crolii*), примѣшивъ къ оному не много камфоры; кругомъ же должно смазывать сыя раны розовымъ масломъ (*oleum rosaceum*) и сверху присыпать сѣлилами.

§ 1227. Въ противномъ случаѣ тѣсма много похваляется опѣ раскидывающихся ранокъ слѣдующая мазь:

Розныи склизы блохина сѣмя- RC. Macilaginis psyllii.	
ип.	
Слизы изъ квицовъ или ариу- Cydoniorum et	
довъ	
И сочевицы по полуница.	Foenugraeciaa unc. se-
	mis.
Порошка изъ мастяки.	Pulver. mastichis.
Камфоры по равной части	Camphoræ aa q. s.
столько, сколько потребно	ad unguentum conf.
для соснавленія мазь.	

§ 1228. Если ли раскидывающіяся ранки, или вереды лепучимъ огнемъ производимые, будутъ застарѣлые: то въ такомъ случаѣ премоного похваляется слѣдующій пластырь:

Возьми льнянаго масла 2 унца. RC. Olei lini. unc. II.

Яри, исполченной въ порошокъ. Virid. æris pulverifici.

Свѣжаго воска по 1 золотнику. Cere novæ aa drachm. I.

Распусти на умѣренномъ огнѣ и придай смолы или гумми, называемой бѣлы, распущенной и продолженной, 1 унцѣ. Enigne foveantur et addatur bdellii soluti et colati unc. I.

§ 1229. Если ли лепучимъ огонь или часопыныя болячки произошли отъ любострастной или невоздержной жизни; то въ такомъ случаѣ бесполезно производится *слизотеченіе*, съ употребленіемъ *вкутъ древеснаго отвара* (salivatio cum decocto lignorum).

§ 1230. Проказа (lepra) есть болѣзнь степень коросты и цынготной болѣзни (scorbutus), слѣдовательно оную лечить можно лекарствами, въ леченіи коросты и цынготной болѣзни употребляемыми. Снаружи можно употреблять одну известковую воду (aqua calcis) и сѣрные бани.

ГЛАВА LXXXV.

О леченіи шелудей или головныхъ мокротныхъ язвинъ de curatione aschorum.

6 1231. Золотуха, млечная пѣнка, шелуди или гостецъ либо мокротныя головныя язвыны. лечатся слабительными и противоскорбутиными лекарствами, или слѣдующимъ порошкомъ:

Возьми испарикъ помогающей RC. Antimon. diaphoretic. сурьмы или потоваго порош- drachm. I.
на 1 золотникъ.

Порошка изъ раковыхъ ял- Pulver. chelium cancer. сней 2 золотника.

Сѣрныхъ цѣпцовъ 40 гранъ.

Смѣшай и давай по 10 грановъ трижды въ день.

Или слѣдующія катышки.

drachm. II.

Flor. sulphur. scrupul. II.

M. d. gr. X ter de die.

Vel sequent. pilulæ:

Возьми пидюльной янтарной RC. Массы 1 золот-
Красиновой массы 1 золот-
никъ.

Сѣрныхъ цѣпцовъ.

Сладкой ршущи по 20 гранъ.

Экстрактъ изъ ложечной травы 12 грановъ.

Ревеневыхъ капель сколько потребно.

Смѣшай и слѣлай пидюли въ-
сомъ въ 1 гранъ, и давай по
2, 3 и больше трижды въ
день.

Masse pilul. de suc-
cino Cratonis drachm.
I.

Flor. sulphoris.

Mercurii dulcis scrupul. I.

Extract. cochleariae gr. XII.

Tincturæ rhabarb. q. s.

M. f. l. a. pilul. pond. gr. I. d. II, III et quod excurrit ter de die s.

§ 1232. Снаружи хорошо употреблять мази, составленные изъ:

Цвѣтѣвъ, ноголики называемыхъ, и царской свѣчи или медвежьей ула.

Unguentum flor. calendule et verbaici.

Мизъ изъ звѣробойнаго масла, вмѣстѣ съ цитроннымъ или желтымъ воскомъ, приготовленную; а наипаче съ великою пользою помогаетъ отъ шелудей личковъ и коричневыхъ маселъ.

Unguentum ex oleo hyperici cum cera flava citrina paratum. ol. ovorum et cinnamomi.

Въ шелудяхъ хорошо употреблять еще проефирнялою отсиръ съ виннокаменнымъ масломъ, чрезъ отсыренье полученнымъ, и отсиръ морскаго луку (desortum scota), естли въ оныхъ находится будетъ клейкая и вязкая матерія:

§ 1233. Что принадлежитъ до вязательныхъ и слѣдственно внутрь вгонящихъ болѣзненную матерію лекарствъ; то ихъ при леченіи шелудей снаружи употреблять никакъ не должно; а естли оныя безразсудно или по незнанію были употреблены, что узнается изъ судорогъ и прочихъ припадковъ: то вдругъ должно приложить къ голѣвъ мелкотной пластырь, смѣшанной съ 4 долею нарывнаго пластыря, дабы такимъ образомъ опять вывести острую матерією наружу, а послѣ сдѣлать апершуру, и такимъ образомъ предохранить больного отъ неизбежной потибѣли.

§ 1234. Колтуны, кромѣ сказанныхъ средствъ подъ § 1218, еще пользоваться можно древеснымъ

отваромъ, проносными ртутными лекарствами и бинтиемъ головы отваромъ плюнсовымъ. (decoctum lycoperdii).

ГЛАВА LXXXXVI.

О леченіи обжогъ de curatione ambustionum.

§ 1235. Сжогоа лечится прикладываніемъ трепицъ обмоченныхъ въ чернилѣ, или чернымъ мыломъ, распушеннымъ въ попутниковой водѣ.

Хорошо также употреблять яловой уксусъ (acetum lithargyri), и соль съ леченымъ аломъ.

Когда обжогоа причинена будегѣ пороховымъ огнемъ; то сперва должно употреблять мягчительныя припарки, какова на пр. можетъ быть приготовлена изъ бѣлаго хлѣба, отвареннаго въ молокѣ съкупъ съ шафраномъ, а потомъ обмывать обожженную часть сурдовымъ или котиковымъ отваромъ, съ розовымъ медомъ смѣшаннымъ, а наконецъ сушительную мазь, нутриумъ, называемую.

Въ сильной обжогѣ не должно также пропускать и кровопусканія, наипаче когда отъ него и горячка прикинется.

ГЛАВА LXXXXVII.

О леченіи пльагстсеной, угреватины de curatione guttae rosaceae.

§ 1236. Пльагстсеной угреватина (gutta rosacea); пользоваться впервыхъ воздержаніемъ отъ выпиванья

кихъ напитоковъ, потомъ употребленіемъ Зельцерскихъ водъ, съворотки и сурьмяныхъ лекарствъ, и снаружи прикладываніемъ Гулардовой растительно-минеральной воды, и намазываніемъ помадою, составленною изъ винъ окалиной соли, свицоваго сахара, яичнаго желтка и кизилоу, съ чемъ однакожъ надлежитъ поступать осторожно.

ГЛАВА LXXXXVIII.

О леченіи фистулъ или морыстныхъ вередовъ *de curatione fistularum.*

§ 1237. Фистулы лечатся изнутри посредствомъ числительныхъ и противоцынготныхъ лекарствъ.

§ 1238. Снаружи должно приличнымъ орудіемъ (инструментомъ) разрѣзывать фистулы до самаго дна; къ вычищенію же и испребленію склизости удобными почитаются острые лекарства. Потомъ должно употреблять легкія съѣдающія матеріи.

§ 1239. Можно также употреблять бальсамическіе составы, каковъ есть слѣдующій:

Возьми периковыхъ листовъ. *RC. F 1 perficar.*

Дистолочной травы.

Chelidon.

Львиной лапы по 2 горсти.

Alchimil. aa manip. II.

Курипелънаго табака 3 горсти.

nicotianæ m. III.

Смирны 4 унц.

Myrrhæ unc. IV.

Смѣшай и вари въ водѣ розофирняковой цѣлой часъ мѣ-

*Misc. & coqv. in aqua
albæ per horam, dein
сма.*

спиз, потомъ придай сам-
то хершато меда 1 фунтѣ
и вари до пѣны, орѣ, нѣла
получитѣ бальзаму подѣ-
ной видѣ, послѣ придай ку-
поросной племмы 1 унцѣ,
потомъ опять дай закипитѣ.

adde me is opht. n. libr. 1
et e. q. ad e. n. b. nam
u. de, p. o. t. e. a. a. d. e.
phlegm. vitrioli unc. 1.

tunc iterum bulliat.

§ 1240. Послѣ должно стараться, чибы
воспалитѣ припеченію мокротѣ къ язвинамѣ, что
совершается чрезѣ разбивательныя (disficientia)
и жидогубительныя лекарства (pervina). Куда
принадлежатѣ жлокрѣдительной пластырь
Минзихполь (empl. pervinum Myusichti), пластырь
Парацельсовъ, называемой олодел. хонѣ и пла-
стырь Норимбергской (Norimbergense).

§ 1241. Наконецѣ употребляются бальзами-
ческія средства; а естли не можно будетѣ
разрѣзать фистулы, то должно сдѣлать насѣчку
на кожѣ (scarificatio).

§ 1242. Въ леченіи фистулы не должно упо-
треблять вязательныхъ, сушипельныхъ (exhi-
ccantia) и холодипельныхъ лекарствъ, также
мазей и густыхъ маселъ.

ГЛАВА LXXXIX.

О леченіи тѣла раздутія или болѣзни, раз-
духающей тѣло de curatione emphematis.

§ 1243. Тѣлораздутіе или болѣзнь, разду-
ющая тѣло, воспослѣдовавшая опіѣ уязвленія
ядо-

ядовитой жабы (*strigifera a torfo bufonis*) и другихъ причинъ, когда то есть да колею разольется вездѣ, въ клепчатой перепонкѣ гнилой влажной воздухъ, пользуется помощію лредорожниковаго соха, какъ внутрь, такъ и снаружи употребляемаго, прободеніемъ кожи и обмываніемъ оной известною, съ вичниимъ спиртомъ смѣшанною, водою, и дымомъ сроднаго на огонь янтаря и роснаго ладана.

Уязвленныхъ же змѣю надлежитъ пользоваться тонкою діетюю и употребленіемъ деревяннаго масла, которое какъ снаружи теплосъ прикладывать къ ранѣ, такъ и внутрь по немногу давать должно. О семъ пространнѣе видѣть можно въ сочиненіи подъ названіемъ, способъ лечитъ отъ укусенія змѣи и бѣшеной собаки, изданномъ Г. Самасловичемъ.

§ 1244. О прочихъ болѣзняхъ, которыхъ я по причинѣ намѣренія моего кратко предложитъ нужнѣйшія и обыкновеннѣйшія болѣзни не могъ помѣстити въ сіе сочиненіе, должно исправляться, какъ съ древними, такъ и новыми хорошими сочинителями, чего какъ я думаю, еслии не ошибаюсь, любящіе спраждующее челоѣчество врачи и безъ напоминанія моего исполнили не откажутся.

§ 1245. А что я также не писалъ и сдѣсь о хирургическихъ операціяхъ, каковы напр. суть: извлеченіе: бѣльма или подтеки въ глазѣ
(cat-

(*catharactæ extractio*), къ чему потребны супъ: *глазное Руммелятова зеркало* и *де Лафаянъ инструментъ*, для опрышенія приросшей сумочки глазной горошинки употребляемой; *вырѣзываніе камней* (*lithotomia*), къ чему также потребны супъ разныя инструменты; *излѣченіе младенца изъ матерней утробы*, разрѣзавши брюшину и матку и сему подобныя; по сего непомню по причинѣ намѣренія моего уже выше объявленнаго я не сдѣлалъ, но еще и потому, что о таковыхъ дѣйствіяхъ нарочно писанныя находятся хиругическія книги, каковы супъ: *Гейстерова*, *Планерова* и *Гортерова хирургіи*, гдѣ все можно сыскать по, что для таковыхъ операций почищается нужнымъ и полезнымъ.

КОНЕЦЪ ШЕСТОЙ ЧАСТИ.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ.

О

Показаніи способа , изъ какихъ вещей и ка-
кимъ образомъ составлять разныя опъ
разныхъ болѣзней лекарства вкупѣ съ пре-
досторожностями , при употребленіи оныхъ
наблюдаемыми, и изъясненіемъ, въ чемъ
и сколько какого лекарства при-
нимають кому либо самому,
или давать другому
должно.





ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ.

О простых и сложныхъ лекар-
ствахъ и объ употребленіи
оныхъ.

А.

Acetum Vini винной или ренской уксусъ.

Винной уксусъ принадлежитъ къ отвращающимъ и останавливающимъ гниль лекарствамъ, и употребляется, будучи смѣшанъ съ водою, въ лихорадкахъ какъ желчныхъ или воспалительныхъ, такъ и гнилыхъ и въ ихъ опасныхъ случаяхъ, когда люди по случаю ли, или по неосторожности своей отправятся какими либо усыпляющими ядами, причиняющими то есть сонъ, бредъ, обморокъ, дурь и симъ подобные припадки.

Къ числу паковыхъ ядовъ относятся цикута, лютикъ или омега (*cicuta*), бѣшенія елния (*solanum furiosum*), одурь или бѣлена (*hyoscyamus*), красавица трава или сонная одурь (*belladonna*), и симъ подобныя вещества.

По-

Поелику укусѣ содержитъ въ себѣ масляныя и крѣпкія частицы; для того производитъ теплоту въ тѣлѣ, раждаетъ потъ и гонитъ урину или мочу. Почему, дабы опнѣть отъ него таковое горьчипельное свойство, вошло въ обыкнованіе двоишь или перегонѣть оный.

Въ которой однакожъ перегонкѣ вода остается на днѣ весьма крѣпкая, а съ летучими душистыми частями соединяется одна токмо весьма слабая кислотъ. И есѣли перегонка сія производится въ точию оловяныхъ сосудахъ; то удобно распускаетъ нѣкоторыя металлическія части оныхъ, и тѣмъ портитъ двоимой или перегоняемой укусѣ.

Почему, есѣли гдѣ либо будетъ опасно давать укусѣ, по причинѣ его горьчипельнаго свойства, за лучшее почитается вмѣсто онаго употреблять не квашенныя, не чрезъ закваску то естъ и броженіе приготовленныя кислоты, каковы сущъ лимонной сокъ и кислота виннаго жѣмля (*acidum tartari*).

Пріемъ укуса опредѣлять должно взглядомъ болѣзни и состоянія желудка. Ибо нерѣдко случается, что больные не только укуса, но и всякихъ другихъ кислотъ перенести и принимать не могутъ. Въ какомъ случаѣ, а наипаче въ гнилыхъ лихорадкахъ не бесполезно примѣшивать къ укусу нѣкоторую часть вина.

Сперва можно взять нѣсколько унцовъ укуса, растворить въ двухъ фунтахъ воды и давать, умножая пріемъ постепенно.

А еслили оный въ какихъ либо случаяхъ такъ, какъ лекарство отъ сыпильныхъ ядовъ употреблать должно будетъ; то тогда надлежитъ давать безпрестанно самый крѣпкій укусъ, и пріемомъ въ великомъ количествѣ.

Acetum bezoardicum безардической или отъ заразы употребляемый укусъ.

Составъ такового противозаразительнаго и противояднаго укуса совершается слѣдующимъ образомъ :

Возьми корня дягилеваго;	RC. Rad. angel.
Валдырьяноваго,	Valerian.
Мяты.	Herb. menthae.
Ромашковыхъ цвѣтѣвъ.	Fior. chamomil. vulg.
Ягодъ можжевельныхъ.	Bacc. juniper.
Лавровыхъ по полунца.	Laur. aa. unc. f.
Восточнаго шафрана,	Croc. orient.
Камфоры по одному золотнику.	Camphor. aa. dr. I.
Виннаго укуса шесть фунтовъ.	Acet. vin. libr. VI.
Настой, процѣди и дай для употребленія.	Dig. col. d. usui.

Сей укусъ какъ внутри, такъ и снаружи съ великою употребляется пользою въ моровой заразы и другихъ чувствительножальныхъ, чревычайную то есть слабость причиняющихъ, лихорадкахъ, приваучившихся отъ плетворной заразы.

Укусъ

Уксусъ сей можно давать нѣсколько разъ въ день по одному золотнику на одинъ пріемъ, и смотри по обстоятельствомъ употреблять оной. (Смотри ниже *potio alexipharmaca secunda*, другое протъ холодное питье). Сей уксусъ можно насыщать нѣкоторою щелочною солью и давать по ползолотника на одинъ пріемъ въ долговременныхъ болѣзняхъ, и другихъ случаяхъ, когда то есть будетъ находиться великая слабость и склонность къ обморокамъ.

Acetum squilliticum, морсколуковой
уксусъ.

Сей уксусъ есть не что иное, какъ настоянной уксусъ съ корнемъ морскаго лука. (*radix squillae*). употребляется уксусъ сей либо такъ какъ разбивательное, либо такъ какъ мочегонительное лекарство тогда, когда самага корня по причинѣ его крѣпости и ѣдкости и причиненія рвоты употреблять не можно будетъ. Давать оный можно отъ сорока до пятидесяти капель всякіе дни или четыре часа.

Въ водяныхъ болѣзняхъ, когда корень сего морскаго лука будетъ причинять великое раздраженіе, и силы придуть въ истощеніе, можно употреблять уксусъ, съ симъ корнемъ настоянной, вкупѣ съ виннымъ спиртомъ, взявъ обѣихъ по равной части. Смотри ниже. *oxymel squilliticum et elixirium resoloens*.

Acidum tartari ; кислота виннаго камня.

Винный камень (*tartarus*) содержитъ въ себѣ нѣкоторую часть щелочной соли, отъ которой отдѣлить оной можно слѣдующимъ образомъ: винной камень варится въ водѣ, и такимъ образомъ сколько возможно, распущенъ въ оной; каковое распущеніе или таковое раствореніе насыщается пою чистою известною землею, которая вбираетъ въ себя кислоту виннаго камня и вкупѣ съ оною составляетъ среднюю соль. Потомъ сіе земляное тѣло перемывается, и наконецъ отдѣляется отъ него кислота виннаго камня посредствомъ купоросной кислоты, которая, купоросная то есть кислота болѣе имѣетъ сродство съ известною или щелочною землею.

А естли желательнѣе постоянный воздухъ (*aer fixus*), происходящій отъ смѣшенія кислотъ съ известковыми землями и щелочными солями, либо одну кислоту посредствомъ малыхъ приемовъ, но въ довольномъ количествѣ, ввести въ тѣло; то должно вмѣсто обыкновеннаго виннаго камня употреблять сію чистую виннаго камня кислоту.

Acidum vitrioli купоросная кислота.

Купоросная кислота сопротивляется разрѣшенію крови и останавливаетъ гниль въ оной, почему и почитается въ числѣ самыхъ сильныхъ

противогнилыхъ лекарствъ. Сія кислота употребляется во всѣхъ лихорадкахъ, гдѣ гнилость великою угрожаетъ опасностію.

Поселику купоросная кислота въ такомъ состояніи, въ какомъ она достается изъ купороса, есть весьма крѣпка и остра; для того оную должно растворять довольномъ количествомъ воды. Одинъ золотникъ купоросной кислоты доволенъ бываетъ для учиненія кислыми четырехъ фунтовъ воды. И дабы питье сіе сдѣлать пріятнѣйшимъ для вкуса; то не худо примѣшивать къ оному приличной какой либо сиропъ, на пр. шелковичной (*symplicus mororum*). *смотри кислую микстуру (mixtura acida)*.

Рослымъ лѣтямъ, въ самой болѣе степеніи гнили, можно дать въ одинъ день двѣль золотникъ купороснаго масла или весьма крѣпкой купоросной кислоты вышепоказаннымъ образомъ. Младенцевъ часто весьма трудно бываетъ побудить и склонить къ употребленію таковаго питья, почему вмѣсто купоросной кислоты можно давать имъ квасцы.

Купоросная кислота вѣрѣдко хорошее дѣйствіе имѣла въ пользованіи коросты. Однако въ семъ случаѣ не столь великой пріемъ быть долженъ; довольно будетъ употребить въ день только половину одного золотника.

Aër dephlogisticatus дефлогистированной ,
лишенной то есть горючаго вещества,
воздухъ.

Тѣло, которое есть необходимое къ дыханію и такъ сказать къ животворенію огня, называемъ мы чистымъ воздухомъ. Хотя Атмосферической или окружающей насъ воздухъ и имѣетъ таковыя свойства; однако всегда обремененъ бываетъ нѣкоторымъ количествомъ постоянного или крѣпкаго воздуха, который совсѣмъ лишенъ есть вышепоказанныхъ качествъ.

Еслили воздухъ совсѣмъ лишенъ бываетъ иностранныхъ, а наипаче горючихъ или флогистическихъ частей; то тогда оной гораздо способнѣе бываетъ къ дыханію, и опыты подтверждаютъ, что животныя въ четверо, пятеро или и гораздо больше могутъ жить въ такомъ воздухѣ, нежели въ обыкновенномъ атмосферическомъ.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что таковъ чистой воздухъ весьма полезенъ есть въ болѣзняхъ, когда всякаго собственнаго научаетъ опытъ, сколь великую бодрость чувствуетъ онъ, находясь на чистомъ и открытомъ воздухѣ, и сколь напротивъ великую ощущаетъ досаду, когда принужденъ бываетъ обращаться въ испорченномъ и запертомъ воздухѣ? поелику же постоянной воздухъ въ разныхъ болѣзняхъ разныя спасительныя производитъ дѣйствія; для того ясно, что воздухъ совершенно чистой не всегда и не-

гообие бываетъ полезенъ. Деревенскій или полевой воздухъ для цыгисныхъ или сопряженныхъ цыгисныхъ либо скорбующихъ болѣзней людей гораздо полезнее, чѣмъ, нежели самой чистой приморской зѣфиръ.

Тѣмъ, кромѣ части удобъ прекрасны суть въ тѣло, прѣсвѣтъ того воздуха, которой мѣтѣтъ бѣшь смѣшанъ съ великимъ количествомъ иоснотного или крѣпкаго воздуха, по тому, что пыкъ воздухъ отграниченъ имѣющею то носѣдоганъ, и отпавшая въ уже возлѣдовавшую, гниль. Крѣпкий или поспоянный воздухъ наимѣе имѣетъ употребленіе свое во внутреннихъ и застарѣлыхъ вередѣхъ.

Напрощивъ естѣи гдѣ либо бываетъ необходимость, чѣобы ошдѣавить и испребитъ огненныя или горячія части изъ влагъ нашего тѣла, что на примѣръ необходимо дѣлать должно въ горячкахъ, гнѣхондріи или задумчивости, золотушней ошщопѣ и симъ подобныхъ припадкахъ: то въ пыкъ выхъ случаяхъ надобно въ мѣры употреблѣти, чѣобы болѣнаго содержать въ самомъ чистомъ воздухѣ. Въ больницахъ такового воздуха даже и до сихъ поръ немогли и не могутъ вѣри соблюдать совершенно. Новѣйшіе опыты, чинимые и гдѣ испытаніемъ натуре и качествъ воздуха, кажется подающъ намъ великое пособіе, когда мы употребляемъ средства и наши старанія представитъ или учинитъ чистой и лишеной горячаго вещества воздухъ. Весьма за малую

лую цѣну и весьма удобно получается таковой воздухъ изъ салипры, которой кислота состоитъ изъ великаго количества таковаго воздуха, которой воздухъ выходитъ изъ салипры во время плавленія или расплаиванія оной. Однако приготовленіе таковаго воздуха не малымъ иногда подверженно бываетъ трудностямъ.

А.г. fixis огнелостоянной, сосущественной, или кристлй воздухъ.

Подъ именемъ таковаго воздуха я разумѣю пошъ воздухъ, который у новейшихъ сочинителей извѣстенъ подъ именемъ воздушной кислоты (acidum aereum), и который во время броженія или окисанія какихъ либо веществъ, и смѣшенія щелочныхъ солей и алкалическихъ земель съ кислотами выходитъ и ощущенъ бывающъ.

Сей воздухъ почищается такъ какъ пръ приво-
гнѣнное лекарство, какъ первѣ по причинѣ кислотности своей, такъ и потому, что онъ имѣетъ лнупреннее движеніе жидкостъ и бродитъ или киснуетъ начинающихся частей. Потому съ пользою можно употреблять оной при леченіи наружныхъ худыхъ ранъ. Для сего само спираетъ ми аго бо наполнять бутели у нигаретъ постояннымъ воздухомъ во время броженія изъ того конла. въ которомъ варится пиво, снявъ бутели надъ бродящими и киснущими жидкостями и закупо-

ривая оныя по прошествіи нѣкотораго времени; либо вливаемъ въ нѣкоторой сосудъ купоросную кислоту вкупѣ съ мѣломъ для произведенія вѣспѣнія и велимъ спрѣдущую часть держати надъ паромъ, выходящимъ изъ сосуда во время кипѣнія купоросной кислоты съ мѣломъ.

Внутри употреблять сей воздухъ можно двоякимъ токмо образомъ. Либо то есть надлежитъ давать воздухъ сей вкупѣ съ водою, въ какомъ случаѣ вода, будучи насыщена такимъ воздухомъ, ничемъ больше не различествуетъ отъ Зельцерской воды, какъ только тѣмъ, что не находится въ оной соляныхъ частицъ, а въ Зельцерской водѣ имѣются еще нѣкоторыя соляныя части. Либо надлежитъ давать алкалическія или щелочныя соли либо земли вкупѣ съ кислотами, и при томъ такимъ образомъ, чтобы изъ совокупленія сихъ веществъ отдѣлялась кислота въ самомъ желудкѣ и проникала въ части тѣла нашего. Сіе учинить можно слѣдующимъ образомъ:

Возьми соли перечищенного вин-	RC. Sal. tartar. d. dr. II.
лаго камня 2 золотника.	folv. in
Распусти въ 12 унцахъ перечищенной воды.	Aqu. destill. ope. XII.
Отдай, затежавши и означивши 1 номеромъ.	D. sign. N. 1

Теперь спрашивается, сколько потребно было бы купоросной кислоты для насыщенія сихъ двохъ золотниковъ щелочной соли. Снисканное такимъ образомъ потребное количество смѣшивается

ваепис я

вается также съ 12 унциями воды, и вдругъ запечатывается и означаетъ 2 номеромъ. Потомъ изъ 1 ваго номера одинъ унцъ, а потомъ вдругъ изъ 2 номера такоеже количество дается лишь, что всякой часъ, или всякіе полчаса попоряпъ должно.

Такимъ образомъ полученъ и употребленъ постоянной воздухъ производящій слѣдующія дѣйствія:

1) Сей воздухъ въ мокрой чахоткѣ споль хорошее имѣетъ дѣйствіе, что часто оной въ состояніи бываетъ совершать весь способъ леченія, исправляя безъ сомнѣнія порчу во влагахъ, и вкупѣ возвращая ослаблему легкому крѣпость и раздражительность.

2) Въ боляхъ, причиняемыхъ камнями, находящимися гдѣ либо въ пѣлѣ, а наипаче въ мочевомъ пузырьѣ, оказываетъ успокоительныя силы, сопротивляясь какъ кажется зарожденію склизы или клея, соединяющаго земляныя частицы, которой клей или склизъ не рѣдко бываетъ случаемъ такъ называемыхъ *каменастыхъ*, причиняемыхъ по естѣ камнемъ, боли. А чтобы постоянной сей воздухъ могъ раздроблять и размывать и самой камень, то я сего изъ чинимыхъ мною опытовъ извѣдать не могъ. Почему, хотя иногда воздухъ сей и разбиваетъ камни и способствуетъ исхожденію изъ пузыря вонъ хрящевыхъ частицъ, составляющихъ камни, одна-

ко явленіе сіе не чему иному приписывать должно, какъ умноженію раздражисальности частей, составляющихъ пузырь. Впрочемъ нельзя совсемъ утвердить, чтобы оной не разбивалъ камня, когда имѣетъ силу разрушать иу скалы, посредствомъ коея земляныя гипсовыя частицы соединяющіяся въ камень.

3) Имѣетъ силу производить кровотеченія. А изъ сего видно, что съ употребленіемъ онаго въ чахотныхъ людяхъ, осторожно поступать должно, и въ тѣхъ случаяхъ, когда оной начнетъ производить тошноту въ груди, употребленіе онаго оставить должно, чтобы отъ того не воспослѣдовало послѣ кровоокржніе (hemoptis). Напротивъ когда нужно будетъ способствовать какому либо кровотеченію, на пр. мѣсячинѣ, почечую и другимъ побужденіямъ или намѣреніямъ натуры; то тогда съ великою пользою можно употреблять оной. Сей воздухъ не только хорошее оказываетъ дѣйствіе въ промывденіи почечуя, естѣмъ его, такъ какъ промывательное, помощію насоса, впускать въ проходъ.

И такъ естѣмъ когда либо надобно будетъ учинить пособіе теченію мѣсячныхъ крови и предъускорить геморойныя движенія; то не въ проходъ впускать оной, но надлежитъ давать внутрь обыкновеннымъ образомъ, и вкупѣ съ алкалическою или щелочною солью распускать нѣкопорую

рую часть массы или состава балтсамических пилюль. Впрочемъ я нехочу скрывать, что я въ возстановленіи мѣсячины не весьма хорошее употребленія сего роздуха видѣлъ дѣйствіе.

4) Исправляетъ острия и промѣны влаги или мокроты въ желудкѣ. Почему не бесполезно употреблять оной при лечении жагу въ желудкѣ, въ какомъ случаѣ надлежитъ давать оной слѣдующимъ образомъ:

Възми самой чистой и стѣнкой, *RS. Ssem. tart. ferar. II.*
обыкновенно степановъ у аптекарей называемый, вымоченной соли 40 гранѣ, или существенной кислоты виднаго к мяа 20 гранѣ.

fluë acid. essent. tart. ferar. I.

Магнезию поверженную соли 20 граѣ.

Magnesi. sal. commin. ferar. I.

Смѣшай, раздѣли на 4 равныя части, дай и вели принимать по одному порошокъ всякіе два часа.

M. d. in 4 vor. part. æquales. d. sign. format pro doh. p. m. p. v. i. n. a. l. i. q. u. i. d. i. c. t. o.

Кажется, на семъ основаніи утверждается и оное всѣмъ извѣстное *riverii limbe* (*rotio Riverii*), уполающее рвоту, когда то есть полизинная соль смѣшивалась съ лимоннымъ сокомъ и во время кипѣнія принимается внутрь, какое питье безъ сомнѣнія производитъ дѣйствіе свое, уполая острия и раздражающія влаости желудка мокроты, вступая внутрь оныя изъ тѣла вонъ.

5) Иногда въ параличъ весьма хорошее производитъ дѣйствіе. Я самъ недавно одну болѣзную, страдавшую параличемъ плечъ, чію отъ того ни ходить, ни стоять не было въ состояніи, употребляя постоянной воздухъ вышепоказаннымъ образомъ, совершенно вылечилъ.

6) Воздухъ сей весьма хорошо дѣйствуетъ противу скорбуга, или цынготной болѣзни; по чему взглядомъ сего дѣйствія, и заслуживаетъ имя нарочитаго отъ цынготной болѣзни лекарства.

Aerh'ops antimonialis порошокъ изъ живого серебра и сурьмы приготовленный, известенъ у аптекахъ подъ именемъ сурьянаго зѣйола.

Сей порошокъ составляется слѣдующимъ образомъ:

Возьми чистаго живаго серебра R^c. Mercur. viv. par. I.
1 часъ лъ.

Сырой, весьма мѣлко стертый,	Antim. Crud. subtilissim. pulv. par. II.
сурьмы 2 части.	
Смѣшай крѣпко.	M. exactissime.

Сіе ртутное лекарство весьма великую имѣетъ пользу въ леченіи, когда оно такъ какъ разбивательное употребляется лекарство, на примѣръ въ засореніи золотушной матеріею чревныхъ желѣзъ. Оно также съ хорошею пользою употреблятъ можно при леченіи коросты и ядовитой гонорей. Въ послѣднемъ случаѣ для усиленія

усиленія сего лекарства, для умноженія по-
естъ дѣйствія онаго на мочепроходныя пу-
ти, хорошо примѣшивать и *мокрицы*. (*mil-
pedes*).

Рослымъ дается лекарство сіе отъ десяти,
до пятнадцати гранъ. Младенцамъ дается
оное, начиная отъ нѣсколькихъ грановъ, умно-
жая пріемъ, взглядохъ по обстоятельству.

Aloës сабуръ.

Сабуръ принадлежитъ къ весьма сильнымъ
проноснымъ лекарствамъ. Оной по причинѣ горь-
кости своей есть хорошее отъ глистовъ лекар-
ство, и поелику имѣетъ силу раздражать и разби-
вать; для того съ пользою употребляется въ
разбиваніи зазавловъ внутренностей чревныхъ.
Сабуръ сильно тониитъ печенія крови. Онъ также
и жаръ скоро производитъ; почему можно упо-
треблять оной въ болѣзняхъ, онъ многой
склизи и худокровія происходящихъ.

Для сей самой причины надлежитъ имѣть осто-
рожность и въ пріемъ, которой далѣе десяти
грановъ никакъ простирается не долженъ. Сло-
вомъ не должно употреблять онаго тогда, когда
кровь сильно стремится къ мажкѣ и къ прохо-
дной кишкѣ. *Смотри Балзамическія лилии*
(*rose balsam'ice*).

Сабуръ по причинѣ разбивательнаго своего
свойства дается къ разбивательнымъ отъ
гла-

глазныхъ болѣзней водамъ. (Смочи воду отъ
глазной болѣзни aqua ophtalmica.)

Alumen квасцы.

Квасцы составляютъ вязнательное и противо-
гнильное лекарство.

Почему употребляютъ оныя въ долготремен-
ной коликѣ, отъ разслабленія кишекъ происхо-
дящей; въ недержаніи мочи, въ кровоизлече-
ніяхъ и гнилыхъ лихорадкахъ, гдѣ оныя, а наи-
мѣе въ гнилыхъ оспенныхъ младенческихъ сы-
зняхъ, весьма хорошее имѣющъ дѣйствіе, попо-
му что ихъ удобно принимать можно.

Нѣсколько грановъ оныхъ распускается въ ка-
комъ либо сокѣ, и дается по маленькой лож-
ечки младенцамъ; въ день можно дать отъ де-
сяти до двенадцати, а иногда и до двадцати
грановъ, умножая мало по малу приемъ. Въ коли-
кахъ и недержаніи мочи, умножая по степен-
но приемъ, можно дать въ день до цѣлаго
золотника, безъ всякой опасности имѣющаго
отсюда возпослѣдовать вреда.

Antimonium сурьма.

Сурьма есть самое первое въ Медицинѣ лекар-
ство, безъ которой я не желалъ бы быть и
мѣдикомъ. Сурьманой королекъ составляетъ изря-
дное разбивательное и рвотное лекарство, ко-
торого королька полумешааллическія части въ
сырой

сырой или не выплавленной сурьмѣ весьма крѣпко соединены бывающѣ съ сѣркою, почему и не могутѣ оказывать собственной своей силы. Когда я предпринимаю намѣреніе учинить гдѣ либо разбитіе мокротѣ и произвести респиту; то я вмѣсто сурьмы упоиребляю Руландову воду, благо-доверенною называемую; а когда хочу произвести испарину и нѣкоторое прохладженіе; то въ такомѣ случаѣ даю сурьмянную селитру, чрезѣ стущеніе приготовленную, или неперемышную пошовую сурьму.

Не мытая, постѣ приходящая сурьма (*antimonium non ablutum*), хорошо разбиваетѣ вязкія мокроты, наипаче естѣли соединить ее съ реченемѣ или рвотнымѣ корнемѣ. Придаютѣ ее къ лекарствамѣ отѣ 8 до 10 грановѣ.

Сурьмованая селитра (*nitrum antimoniatum*) получается, когда шѣ щолоки, въ конхѣ перемывается пошовая сурьма, солются вмѣсто, процѣдяпся и на легкомѣ стѣ даже до кожицы выпарится, а послѣ поставятся въ холодное мѣсто, для осадки чистой селитры.

*Aqua benedicta Rulandi Руландова благо-
словенная вода.*

Сія вода пригоиовляется такѣ:

Возьми мѣталлическаго шарра: *RC. Croc. metall unc. I.*
на или изнеси одинѣ унцѣ

Самаго лучшаго Фриццуска- *Vini Gall. optim.*
го вина 30 унцовѣ. *unc. XXX.*

Дѣй хорошо наполняя, поставишь къ мѣсту на нѣ-
сколько дней, послѣ процѣди хорошо и еѣрно.

Изѣ

Изъ всѣхъ препаратовъ или составовъ сурьмянныхъ сія вода есть самое первое и самое дѣйствительнѣйшее лекарство. Вода сія весьма хорошимъ и безопаснымъ бываетъ рвотнымъ лекарствомъ, есѣли ее употребить отъ трехъ до четырехъ золотниковъ. Въ малыхъ же приемахъ будучи употреблена, весьма хорошее разбивательное имѣетъ дѣйствіе. Она поспѣшествуетъ исхожденію мокроты въ воспаленіи въ легкомъ (*in peripneumonia*), и во всѣхъ случаяхъ, гдѣ токмо предпринимаются мѣры разбить внутренніе завалы съ весьма хорошимъ успѣхомъ оную употреблятъ можно. Сію Руландову воду въ суматесствіи (*mixtura*) отъ восьми, до десяти унцовъ часто въ день давать должно, прежде нежели она произведетъ какое либо испражненіе; приемъ воды сей всегда мало по малу умножать должно, и всякой день надлежитъ имѣть вниманіе на дѣйствіе оной.

Чтобы вдругъ приготовить сію Руландову, Гартманову или Зиденгамову воду; то надлежитъ взять на одинъ золотникъ мѣталлическаго шафрана два унца хорошаго бѣлаго вина, и налить на ночь; а поутру сцѣдить и когда надобно употребить.

Сурьмяное Гухеганово вино (*vinum Nuxhami antimoniatum*) имѣетъ только различествуетъ отъ сего лекарства, что вмѣсто мѣталлическаго шафрана, берется сурьмяное стекло, и одинъ унцъ

унцѣ онаго настаивается въ 24 унцахъ хороша-
го вина, что подлинно ни какой не дѣлаетъ
существенной разности, когда вся сила вещи за-
виситъ отъ распущенія корольковыхъ частей.
Поселику сурьмяное спекло есть дѣйствительнѣе
металлическаго шафрана; для сего и приемъ
Гуксгамова вина долженъ быть меньше. Сіе вино
не такъ какъ рвотное, но какъ разбивательное
лекарство употребляется отъ 30 до 80 капель.

*Aqua calcis vivæ вода негашенной
известии.*

Негашенная известъ есть известковая земля,
лишенная постоянного воздуха, и, естли вѣрить,
огненными насыщенная частицами, отъ чего она
имѣетъ жгучее свойство, припомъ распускается
въ водѣ. Она по силѣ жгучести своей имѣетъ
силу хорошо разбивать; почему известная вода
не только для разбиванія внутреннихъ завалавъ
и разныхъ засореній употребляется, но и для раз-
битія камней почечныхъ и мочепузырныхъ. Сіе
последнѣе дѣйствіе оной еще не довольно под-
тверждено, но въ первомъ случаѣ она быва-
етъ довольно дѣйствительна, и въ чалотныхъ ли-
хорадкахъ, будучи употребляема съ молокомъ,
весьма хорошую приноситъ пользу. Поселику
Атмосферической воздухъ всегда содержитъ въ
себѣ и постоянной или газной паръ, кото-
рой съ жгучею матеріею удобно соединяется;
для того не можетъ быть, чтобы сей воздухъ
не

не соединился съ известною жгучею землею, распуценною въ водѣ, съ коптою еспали оный соединится; то опять превращаетъ ее въ сырую известковую землю, дѣлаетъ нераспускаемую въ водѣ, и слѣдственно низвергаетъ ее на дно, а воду дѣлаетъ не дѣйствительною. Почему должно стараться, чпбъ известную воду всегда вновь приготавливать и съ ней пережженой извести, а еспали можно изъ раковинъ, превращенныхъ въ золу.

*Aqua chamomillæ florum cum et sine vino
воды ромашковыхъ цвѣтсовъ, съ виномъ
и безъ вина приготовленная.*

Вода ромашковыхъ цвѣтсовъ безъ вина приготовленная всѣмъ прохладительнымъ и противосудорожнымъ минстурамъ наилучшимъ служитъ растворомъ. Съ виномъ же приготовленная съ пользою употребляется иногда въ спазмахъ или судорогахъ отъ слабости происходящихъ всякій часъ по обыкновенной столовой ложки, или употребляется вмѣсто раствора селитры въ тѣхъ случаяхъ, когда слабость, спремленіе крови и спазмы вкупѣ соединены бывають.

Aqua cinnamomi sem & sine vino коричневая вода, съ виномъ и безъ вина приготовленная.

Послику корица удѣльно согрѣваетъ, или производитъ теплоту въ тѣлѣ; для того воды
сін

еи можно употреблять токмо въ великихъ за-
спарѣлыхъ слабостяхъ, а наипаче сваружи. Сии
коричневыя воды весьма хорошими служатъ ра-
створами горькимъ экстрактамъ, употребляе-
мымъ въ слабости желудка.

Aqua fœniculi вода волоскаго укрола.

Сія вода служитъ изъяснымъ растворомъ
всѣмъ прописовосудорожнымъ лекарствамъ, тѣмъ
паче, что и сама она вкупѣ разбиваетъ и вонъ
выгоняетъ въшры.

*Aqua menthæ cum & sine vino мятная во-
да, съ виномъ и безъ вина приго-
товленная.*

Сии воды почти тѣ же имѣютъ свойства, ка-
кія имѣютъ воды ромашковыхъ цвѣтовъ. Но по-
елику бывають такіе больные, которые къ сей
или къ другой водѣ имѣютъ отвращеніе; для
того я за нужное почелъ упомянуть здѣсь объ
обѣихъ сортахъ водъ.

Сии воды гораздо дѣйствительнѣе бывають,
когда приготовляются изъ Нѣмецкой мяты.
(*mentha sylvestris*).

*Aqua mineralis минеральная или цѣли-
тельная вода.*

Всѣ минеральныя воды въ томъ сходствуютъ
между собою, что оныя большее или меньшее,

однако всегда ощутительное количество постоянного воздуха (азотуса) въ себѣ содержатъ.

Сія воздушная кислота либо сама чистая находится въ водахъ, либо соединенною съ земляными, соляными и металлическими частицами, что самое и составляетъ различіе минеральныхъ (или рудныхъ) водъ.

Сіи воды дѣйствіемъ и силою постоянного воздуха или воздушной оной кислоты удобно могутъ проходить шѣло, и опять изъ онаго выходитъ вонъ. Почему хотя какая вода и ни съ чемъ другимъ не будетъ смѣшанна, какъ только съ постояннымъ воздухомъ; однако всегда будетъ имѣть великое преимущество предъ обыкновенною пресною водою, которая при расслабленіи орудій, служащихъ пищеваренію, весьма легко причиняетъ досады.

Воздухъ сей есть нечто иное, какъ то шѣло, которое содержитъ распущенныя въ сихъ водахъ земляныя и металлическія части. Почему, какъ скоро воздухъ сей улетитъ изъ минеральныхъ водъ; то упомянутыя части извергаются и садятся на дно, а вода получаетъ свойство пресной воды и дѣлается не дѣйствительною.

И сіе - то есть настоящею причиною, что воды сіи по причинѣ соединенія составныхъ частей оныхъ съ тою тонкимъ растворомъ, прони-

проникаютъ въ самые мѣлчайшіе и самые тончайшіе каналы плѣз нашего, и чію самую чистію оныхъ особливую имѣютъ дѣйствительность, которой въ другомъ видѣ можетъ быть оной и не имѣли бы.

Вообще же при употребленіи Минеральныхъ водъ надлежитъ обращать вниманіе свое туды, имѣютъ ли тѣ люди, которымъ хочется давать сіи воды, наклонность къ вредоопаснымъ кровотеченіямъ, или не имѣютъ?

Еслили имѣютъ; то съ великою осторожностію должно давать сіи, потому что постоянный воздухъ удобно можетъ поспѣшествовать кровотеченіямъ; а еслили не имѣютъ, то ихъ безъ всякой почти опасности давать можно.

Изъ Минеральныхъ водъ въ большемъ употребленіи находящихся суть слѣдующія:

1) Aqua Selterana *Зельцерская вода.*

Сіа вода содержитъ въ себѣ великое количество свободной воздушной кислоты, и не много Минеральной алкали. Сію воду весьма полезно употреблять вмѣстѣ обыкновеннаго питія во внутреннихъ загноеніяхъ.

2) Aqua Seidlitzensis *Зедлицкая вода.*

Сіа вода состоитъ изъ воздушной, то есть тонкой и рѣзкой кислоты и горькой соли. Почему

и имѣетъ силу слабить желудокъ, и употребляется къ очищенію первыхъ путей и брюшной поджелудочной желѣзы (pancreas). Однако съ осторожностію употреблять должно оную людямъ, имѣющимъ наклонность къ Геморою; потому что она въ такихъ случаяхъ можетъ причинить кровотеченія изъ прохода и свищи или фистулы въ проходной кишкѣ.

3) *Thermæ Carolinæ* Каролинскія теплицы или теплыя воды.

Главнѣйшую часть водъ сихъ составляетъ соль, подходящая близко къ Глауберовой соли, въ которой щелочныя части въ великомъ находясь количествѣ, почему вода сія слабить желудокъ, способствуетъ большому изпеченію мочи и въ такомъ случаѣ, гдѣ находится много склизы и бывають во внутренностяхъ запоры, что наипаче случается въ ипохондрической слабости.

4) *Thermæ Hirschbergenses, Landeckenses et Tæplices*, теплыя воды Гиршбергскія, Ландекскія и Теплицкія.

Сии воды суть щелочносѣрные. Онѣ наипаче производящъ потъ и съ пользою могутъ быть употребляемы въ нутрь въ золотухѣ.

5) *Thermae Aquisgranenses* **теплыя**
Аквисгранскія воды.

Всѣ почти теплыя Аквисгранскія воды состоятъ изъ воздушной кислоты и сѣры, почему полезно употреблять ихъ отъ корости и золотухи.

6) *Thermae Freyenwaldenses. Lauchstaedtenfes*
et Berolinenses **теплыя Фреенвалдскія,**
Лаухтедскія и Берлинскія.

Сія вода содержитъ въ себѣ воздушную кислоту и желѣзо, почему употребляютъ ихъ для укрѣпленія слабыхъ и дряблыхъ волоконъ тѣла. Ихъ всегда почти вмѣстѣ бань употребляютъ; однакожъ и внутрь полезно давать оныя.

7) *Aqua Spadana* **Спасская вода.**

Сія вода кажется состоятъ изъ Фреенвалдской и Зельдерской; а сіе потому, что кромѣ воздушной кислоты и нѣкотораго количества желѣза находящагося еще въ оной и соляно-алкалическія или щелочныя части. Почему вода сія весьма хорошо разбиваетъ завалы и вмѣстѣ укрѣпляетъ тѣло.

8) *Aqua Egrana* **Эгранская вода.**

Сія вода, кромѣ воздушной кислоты и нѣкоторыхъ желѣзныхъ частей, содержитъ еще въ себѣ и соль на Глауберову похожую; почему

какъ слабитъ желудокъ, такъ и вязкія и густыя разбиваетъ и растворяетъ влаги.

9) Aqua pyramontana Пирмонтская вода.

Сія вода опѣ Эфрискихъ пѣмъ называется, что имѣетъ въ себѣ большее количество желѣзистыхъ частей. Потому имѣетъ она сильную силу укрѣплять, нежели прочія минеральныя воды. Впрочемъ осторожно поступать должно при употребленіи оной, потому что она есть тяжкая для желудка и несколько прохладить можетъ мокротныя пупы и иѣ пѣла вытекаетъ вонь.

Во всѣ сіи воды гораздо полезнѣе употреблять при самыхъ источникахъ оныхъ. Потому что когда оныя переносятся или перевозятся въ другія мѣста; то теряютъ нѣкоторое количество своей весьма существенныя части, то есть постоянного воздуха или воздушной кислоты и другихъ частей, которыя прежде съ нимъ въ соединеніи находились, а какъ осяли на дно.

Aqua ophthalmica confortans глазная крѣпительная вода.

Сія вода составляется такъ:

Взять ромашковой, безъ вина R. Aq. chamom. S. v.	
приготовленной, воды унцовъ unc. VIII.	
и семи.	
Смирновато экстракта.	Extr. satern.
Винного и мѣфороного спирта Spirit. v. camphor.	
по 2 збодинки.	aa dr. II.

Благое

Вѣлаго купороса і золотникѢ.
Смѣшай и дай.

Vitriol. alb. dr. II.
M. d.

Сію воду весьма полезно употреблять отъ печенія слезъ и гною изъ глазъ, происходящаго отъ разслабленія частей, глазъ составляющихъ. in eriphora et lippitudine).

Aqua ophthalmica resolvens **глазная разсѣпательная вода.**

Составъ воды сей есть слѣдующій:

Возьми ромашковой воды, безъ RC. Aq. chamom. f. v. вѣна приготовленной, 6 ун-^ц инс. VI. довѢ.

Благословенной Руляндовой Penedit. Ruland. инс. 2 унцъ, II.

Сазуровыхъ капель. Essent. aloës.

Смирновскаго масла чрезъ жезъ, Liquam. myrrhæ aa. по 40. dr. II.

Липника.

Смѣшай и дай.

M. d.

Сія вода, будучи нѣсколько разъ въ день влива въ глазъ, истощаетъ плещи, на роговой глазной оболочкѣ находящіяся, и пользуется выпаденія роговой же глазной оболочки (in, masilis et ptergia с. sive pterhyalate). Еслили же вода сія съ начала употребленія своего будетъ очень вѣстъ; то ее можно больше еще разсѣорипъ ромашковою водою.

Aqua phagedænica **дикое мяго съѣдающая или флегменская вода.**

Сія вода приготовляется обыкновенно изъ сулемы и известной воды. Ее составляютъ такъ:

Р 4

Возьми

Возьми известковой воды :	℞. Aq. calcis vivæ libr.
фунтѣ.	℥.
Сулемы : золотникѣ.	Mercur. sublim. dr. 1.
Распусти ртуть сію въ водѣ,	Dissolvatur filtretur et
процѣди и храни для нару-	usui servetur.
жнаго употребленія.	

Послику же известковая вода относительно до ея силъ, весьма различна бываетъ, когда то есть она долго стоить послѣ приуготовленія, то шѣмъ дѣлается грубою и неэффективною, что и значить, что ее всегда свѣжую имѣть должно; для того лучше употреблять ртутную растворъ, которой мы ниже сего опишемъ, то есть распускать ртуть въ селитреной кислотѣ, при случаѣ разводивъ сей растворъ нѣкоторою перегнатою водою и употреблять въ тѣхъ обстоятельствахъ, гдѣ должно очищать негодныя застарѣлыя раны.

Еслили къ Фагеденской водѣ прибавить Соко-тринскаго или прозрачнаго сабура шестъ золотниковъ, а меда розеваго полтора унца; то изъ сего произойдетъ сабуровая ртутная Звонельфорова вода (aqua aloetica mercurialis Zwoelferi), которую весьма полезно употреблять при леченіи любоспиральныхъ ранъ.

Aqua Rogum Gambesii вода бузино- выхъ цвѣтовъ.

Ся вода служитъ самымъ лучшимъ раство-ромъ соединенію минстуръ, производящихъ потъ.

Aqua

**Aqua Coloretaria Thedenii живучая
вода Теденіева.**

Сія вода составляетъ слѣдующимъ образомъ:

Возьми виннаго укуса.	℞. Acet. vin.
Двоеной водки 3 фунта.	Spirit. vin. R. aa lib.
	III.
Бѣлаго сахара 1 фунтъ.	Sachar. alb. lib. I.
Купоросной кислоты 10 ун- цѣй.	Spirit. vitriol. pur. X.
Смѣшай и дай	M. d.

Сіе лекарство не только отражаетъ воспале-
ніе, но и гниль останавливаетъ. Почему весьма
хорошо употребляютъ оное въ скорбунныхъ ранахъ
и гнилыхъ воспаленияхъ или воспаленияхъ. Изо-
брѣтатель сего лекарства еще большія приписы-
ваетъ оному силы, если прибавитъ къ оной не-
много желѣзистыхъ экстрактовъ, заживлятель-
ныхъ травъ и нашатырной соли, о которой одна-
кожъ вѣдать должно, что она разрушается
купоросною кислотою, слѣдственно ее и оста-
влять должно.

Arsenicum арсеникъ, мышьякъ.

Давно уже сей полуметалъ не находится въ
употребленіи, хотя и весьма хорошія находят-
ся наблюденія о похвальныхъ его дѣйствіяхъ.

Кажется, что съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ
начали входить въ употребленіе ѣдкия и жигу-
чія ртутныя соли, не должно бы было отвер-
гать и мышьяка, по той самой причинѣ, что

и мышьякъ такое же имѣетъ жгучее и ѣдкое свойство. Въ леченіи нѣкоторыхъ болѣзней, свойство рака мышьяка, я видѣлъ очевидную пользу мышьяка, и казался не позволившему прибѣгать къ не изнуреннымъ лекарствамъ въ столь упорной болѣзни, каковая есть ракъ (cancer) Предписаніе мышьяка Лафурекое, которому я поспѣдовалъ, есть слѣдующее :

Возьми бѣлаго мышьяка 2 грѣи.	RC. Arsenic. alb. gr. II.
Бѣлаго рѣхара 1 золотникъ.	Sachar. alb. dr. I.
Смѣшай всема хорошо и по-	Misc, exactissime,
стѣ разпусти въ 2 фунтахъ	rosea solve aqu. de-
и регнатой воды.	stil. libr. II.
Смѣшай и дай.	M. d.

Сначала должно вѣшать больному изъ сей микстуры чрезъ восемь дней сразу принимать по унцу на тонцакъ по одной сполсвой ложки въ молоко, и сей приемъ которой умножая мало по малу, дважды или трижды всякой день употреблять можно. Снаружи распырѣ сей самъ по себѣ употребляется. Древние во всѣхъ почти болѣзняхъ, отъ испорченной ласки происходящихъ, употребляли сандаракъ или красный мышьякъ, которой состоитъ изъ мышьяка и сѣры, соединенныхъ вкунѣ.

В.

Bassæ Juniperi можжевельныя ягоды.

Сии ягоды, относительно до ихъ силы и дѣйствительности, много имѣютъ сходства съ перпенциной; почему ягоды сии можно употреблять въ водѣ или чемъ другимъ и употреблять въ водныхъ болѣзняхъ такъ, какъ многоименное лекарство, а нарѣче тогда, когда и расслабленность вмѣстѣ находится будеть. *Смотри кровочистительныя сорны (sres purificantes).*

Balnea бани.

Теплая баня употребляется отъ судорогъ, потому что оныя размягчаютъ кожу и такимъ образомъ приводятъ въ порядочное теченіе крови; почему теплая баня полезно употреблять во всѣхъ тѣхъ судорожныхъ припадкахъ, въ которыхъ опій никакого не производитъ желаемого дѣйствія, или въ которыхъ опій употреблять не можно, и однакожъ не должно послаблять раздражающей и корчи причиняющей матеріи до тѣхъ поръ, пока совсемъ не уймется судороги.

Отсюда явствуетъ, что теплыхъ бань въ многокровіи, разрѣшеніи влагъ и великой слабости тѣла употреблять не должно; потому что теплая баня въ семъ случаѣ удобно могутъ причинить вредъ.

Bal-

Balnea frigida *холодные бани.*

Сии бани непосредственно дѣйствуютъ на кожу тѣла нашего и укрѣпляютъ оную. Однако къ употребленію такого рода бань не вдругъ, но мало по малу привыкать должно.

Embrocatio *капаніе водою.*

Сей родъ бань дѣйствуетъ такъ, какъ ударительное, или потрясательное средство.

Balsamus Copivae *Копайской бальзамъ.*

Сей бальсамъ въ дѣйствіи своемъ различествуетъ отъ перпентина въ томъ, что не придаетъ мочи такъ, какъ перпентинъ, фіалковаго запаху. Когда не можно будетъ настоящимъ образомъ увѣриться о чистотѣ перпентина; то въ такомъ случаѣ можно употреблять сей Копайской бальсамъ, которой въ ядовитыхъ гонореяхъ, когда пройдетъ воспаленіе и происходящее опшуда пруженіе дѣтороднаго члена, весьма хорошее оказывающъ дѣйствіе,

Balsamus Sulphuris *сѣрной бальсамъ.*

Ежели желательно употреблять сѣру въ жидкомъ видѣ; то въ такомъ случаѣ распускается оная либо въ анисномъ маслѣ, либо въ скипидарѣ. Сѣрной анисной бальсамъ полезно употреблять наипаче отъ грудныхъ болезней, происходящихъ отъ ломотной и коростной матеріи, а скипидарной бальсамъ хорошо употре-
блять

блять отъ брюшныхъ заваловъ. Въ обѣихъ же случаяхъ полезно давать оной вкупѣ съ купоросною навою, утѣлительными жаллями называемую. Первыхъ берется капель 5, а послѣдней 10, и даются на сахаръ или въ водѣ.

Вогак бура.

Буру почипали лекарствомъ, поспѣшествующимъ печенію крови и пособляющимъ родамъ, что однакожъ не соотвѣствуетъ чинимымъ надъ оною опытомъ. По большей же части употребляютъ ее для пособія растворенію виннаго камня въ водѣ, которому растворенію бура по справедливости пособляетъ. Въ семъ случаѣ берется одинъ золотникъ буры на одинъ унцѣ смешаны или кремора виннаго камня, и распускается въ кипячей водѣ. Буру хорошо употребляютъ отъ молошницы.

Butyrum antimonii сурьянное масло, или весьма крѣпкая сурьянная кислота.

Сурьянная кислота есть не что иное какъ растворъ сурьянаго королька въ соляной кислотѣ, которой растворъ есть весьма ѣдокъ и острѣ. Сей растворъ имѣетъ весьма сильно растворяющія и разбивающія силы. Почему оной не бесполезно употреблять можно отъ пятенъ глазной роговой оболочки и выпаденія оныя.

Впрочемъ оспорожно надлежитъ употреблять оное масло, то есть надобно кончикъ перышка
обма-

сбмакнути въ сурьяное масло и намазывать запястья и потемнѣлое мѣсто на оной, отъ прикосновенія котораго споль раздражительнаго вдругъ проливаются слезы, растворяютъ лекарство сіе и дѣлаютъ его безопаснымъ.

С.

Camphora камфора.

Камфора сопротивляется гнили, разбиваетъ запятой и весьма сильной производитъ потъ, не умножая впрочемъ лихорадочнаго жара. Почему камфору во всѣхъ лихорадкахъ, гдѣ должно опасаться воспослѣдованія гнили, и гдѣ должно разбить воспалительные завалы и умножить испарину, весьма полезно и нужно употреблять.

Въ сихъ случаяхъ весьма хорошо смѣшивать камфору съ сахаромъ и давать всякіе два часа, начиная отъ одного грана, и восходя до чептырехъ грановъ.

Впрочемъ камфора таксе нѣчто особое имѣетъ, что не всякой желудокъ переніи оную можеть, чего въ практикѣ пренебрегать не должно.

Не должно также употреблять камфоры тамъ, гдѣ должно произвести большее вытѣченіе мочи, для того что камфора уменьшаетъ оное.

По сей причинѣ весьма великую пользу имѣетъ камфора тогда, когда употреблены будутъ весьма оспрыч и ѣдкія мочегонительныя лекарства и причинитъ трудное мочезапечение или мочеѣтъ, каковы ѣдкія мочегонительныя лекарства по справедливости суть Шпанскія мухи. Въ сихъ случаяхъ должно давать оную въ эмольсіяхъ, или сосисавныхъ молокахъ.

Естьли камфору весьма часто употреблять; то она приводитъ въ слабость силы, служащія произрожденію, что можетъ спастись происходитъ отъ того, что она премного останавливаетъ припеченіи влагъ къ дѣтероднымъ частямъ.

Камфора въ задумчивыхъ или меланхоликахъ дѣйствуетъ такъ, какъ бы нѣкоторое нарочитое лекарство, естли ее всякой день, умножая мало по малу пріемъ, давать немощнымъ до половины унца. Впрочемъ трудно опредѣлить и утвердить, какъ она совершаетъ дѣйствія свои въ тѣлѣ, не посредственно ли дѣйствуя на самыя чувствительныя жглы, или испребляя сильныя запоры?

Cantharides Шпанскія мухи.

Шпанскія мухи, будучи употреблены снаружи, разбивающъ застой и сгущающъ матерію отъ частей больше необходимыхъ для жизни. (Смотри марьяной пластырь Euphrasim vesicatorium). Во внутреннемъ употребленіи онѣ

со-

составляющѣ весьма острое мочегонительное лекарство, почему и употребляются только въ упорныхъ не ядовитыхъ гонорейхъ и незадержаніи мочи, отъ расслабленія мочесодержательныхъ сосудовъ происходящемъ. Смотри *калли Шпанскихъ мухъ* (*tinctura cantharidum*).

Шпанскія мухи столь сильно дѣйствуютъ на мочу, что отъ принятія одного грана весьма удобно воспослѣдовать могутъ самыя жесточайшіе мочерѣзы и кровавое мочетечение. Въ семъ случаѣ камфора есть самое лучшее лекарство, не токмо настоящее помянутого яда уничтожающее дѣйствіе, но и отвращающее оно. Впрочемъ Шпанскія мухи такъ, какъ разбивательное лекарство хорошо употреблятъ въ разбиваніи опеченныхъ или раздухливыхъ мокротныхъ опухолей.

Castoreum боброя струя.

Сіе лекарство относится къ противогистерическимъ лекарствамъ. Она нерѣдко дѣйствуетъ чрезъ одинъ токмо запахъ, или одно обоняніе. Бобровую струю отъ десяти до двенадцати грановъ употребляютъ можно тогда, когда не будетъ довольной причины къ употребленію опія или чертова духа.

Concha рагерагае приготовленныя раковины.

Приготовленныя раковины принадлежатъ къ всасывательнымъ или утоляющимъ кислоту лекар-

лекарствамъ. Оныя употреблять можно тогда, когда не будетъ въ готовности раковыхъ жерновокъ, и не можно будетъ знать, хорошо ли пригопавленная соляная магнезѣ, впрочемъ раковыя жерновки гораздо превышающая.

Однѣхъ оныхъ употреблять не можно, но промѣшиваютъ ихъ къ другимъ лекарствамъ, на примѣръ къ ревеню тогда, когда находится на первыхъ путяхъ кислоща.

Онѣ также составляютъ хорошее, утоляющее жаръ, лекарство, естли ихъ насытить распителною кислощою. Смотри хладительную микстуру. (*mixtura refrigerans.*).

Conserva antiſcorbutica прираса отъ скорботы или цынготной болѣзни.

Пригопавляютъ ее такимъ образомъ:

Возьми свѣжей ложечной Грен-	RC. Herb. recent. cochle-
ландской травы.	ar. Grönland.
Креса.	Nasturt. aqu.
Дашлины по ровной час-	Trifol. fibrin. aa.
ти.	
Бѣлаго сахара сколько по-	Sach. alb. q. s.
требно.	
Смѣшай, сдѣлай приправу и	M. f. s. d.
дай.	

Сей составъ въ скорбутной остропѣ, находящейся во влагахъ, съ великою пользою употреблять можно наипаче въ зимнее время.

*Cortex cascarillae кашкариловая корка
или трубчатая корица.*

Сія корка, относительно до ея силы, нѣмѣе токмо различествуетъ отъ перуанской корки, что не такъ крѣпко влжетъ, какъ перуанская корка, и большой причиняетъ жаръ. Почему я корку сію въ худыхъ непрерывныхъ лихорадкахъ и въ кровавомъ поносѣ предпочитаю перуанской коркѣ, потому что кашкариловая корка не мѣшаетъ испражненіямъ и вмѣстѣ производитъ потъ. Поелику же корка сія причиняетъ жаръ; для того оную въ меньшемъ приѣмѣ давать должно, нежели перуанскую корку.

*Cortex chinae хинская или лихорадо-
чная корка.*

Хинская корка два главнѣйшія имѣетъ свойства: сопротивляется или останавливаетъ гниль и укрѣпляетъ чувствительныя жилы. Почему даютъ оную въ гнилыхъ или гнилетворныхъ, заразительныхъ или злыхъ и перемѣжающихся лихорадкахъ, въ мокротной чахоткѣ и во всякихъ слабостяхъ.

Красная хинская корка есть гораздо лучше тонкой и нестолько цвѣтной корки.

Еслили корка сія употребляется въ гнилыхъ лихорадкахъ; то она дается всегда во время нѣкотораго послабленія болѣзни, и притомъ

помѣ не въ сущности, но приготовленная водяная настойка изъ оной всякой часѣ по ложки. А сіе попому, что корка сія, естли бы даваемая была въ другомѣ видѣ, то бы могла остановить болѣзненную матерію и подать случай къ осадкамъ оной въ какихъ либо частяхъ шѣла и перемѣненію одной болѣзни въ другую.

Въ лихорадкахъ, весьма великую слабость причиняющихъ, называемыхъ у врачей чувствительно-жизненными, корку сію должно соединять съ поповыми лекарствами. Въ какомъ случаѣ настойку сея корки можно соединять съ поповою микстурою, взявъ обѣихъ по равной части. Вообще въ непрерывныхъ лихорадкахъ корка сія употребляется тогда, когда бываетъ опасность, чтобы всѣ чувствительныя жилы не пришли въ расслабленіе и шѣмъ не ввергнули больного въ великую опасность.

При употребленіи Хинской корки надобно смотрѣть, не сушишь ли она кожи и языка, и не дѣляетъ ли дыханія труднымъ? Въ какомъ случаѣ либо должно перестать давать оную, либо надлежитъ соединять оную съ попомшворными лекарствами.

Корка сія весьма хорошее оказываетъ дѣйствіе, естли ее употреблять тогда, когда бываютъ припадочныя отъ слабости происходящія попомшнія, а жажды великой не бываетъ.

Въ перемежающихся лихорадкахъ по учиненіи надлежащаго очищенія пѣла употребляется обыкновенно въ нелихорадочные дни, и припомъ въ порошокъ, а не въ настойкѣ.

Въ четверодневныхъ лихорадкахъ, когда еще должно опасаться запоровъ, надлежитъ давать сначала въупъ съ нашатырною солью. Всякіе два часа можно ординовать по 20 гранъ Хинской корки, да по 10 гранъ нашатырной соли. А естли корка сія ни запора, ни поноса не причиняетъ; то нашатырную соль оставить можно, а пріемъ корки мало по малу умножить. Сію корку въ злыхъ и опасныхъ перемежающихся лихоманкахъ вдругъ первыхъ не лихорадочныхъ дней должно давать всякой часъ по золотнику на одинъ пріемъ. Извѣстно, что перемежающіеся лихорадки удобно по самымъ легкимъ причинамъ опять возрождаются могутъ. Таковыя вопричныя возраженія или возвращенія въ тридневныхъ лихорадкахъ, какъ простыхъ, такъ наипаче въ соединенныхъ по прошествіи седми дней, а въ ежедневныхъ и четверодневныхъ по прошествіи четырнадцати дней случаются.

Но всѣ таковыя лихорадочныя возвраты слѣдующимъ образомъ отвращаются, то есть седьмого дня по прошествіи тридневной лихорадки, а четырнадцатаго послѣ унятія четверодневныхъ и ежедневныхъ лихорадокъ дается хинская кор-

ка въ порошокъ, которую больной долженъ употребить цѣлые восемь дней сряду.

Въ мокротной чахоткѣ, отъ простуды воспослѣдовавшей или другой какой флюэной маперіи, весьма великую пользу приноситъ сія корка, естѣли ее, такъ какъ и во всѣхъ лихорадкахъ, давать во время послабленія болѣзни, начавъ съ начала употреблять настойку изъ оной.

Она также хорошее оказываетъ дѣйствіе во всѣхъ застарѣлыхъ слабостяхъ, въ какомъ однакожъ случаѣ надлежитъ давать вмѣстѣ и другія лекарства.

Корка сія никогда почти не причиняетъ рвоты, въ какомъ случаѣ, то есть естѣли бы корка сія поднимала рвоту, должно соединять оную съ корицею или опіемъ.

Она великую приноситъ пользу въ наружныхъ ранахъ, когда силы придутъ въ изнеможеніе и не будетъ вытекать хорошей сукровицы; ее также употребляютъ всякой день до нѣсколькихъ унцовъ въ порошокъ и въ анисовомъ огнѣ (gangrene).

Въ каковыхъ случаяхъ полезно употреблять оную и снаружи; но при пользованіи анисова огня можно мѣшать корку сію съ нашатыреною солью и съ виннымъ уксусомъ ссавлять

припарки и прикладывать оныя къ частямъ, антоновымъ огнемъ обдержимымъ.

Впрочемъ можетъ ли гребниковой корень (*radix cariohillatæ f. gei argani*) исполнять недоспапокъ Перуанской корки, какъ опомъ гласятъ новѣйшія наблюденія, я собственнымъ опытомъ утвердить того не въ состояніи.

Cortex cinnamomi коричневая корка.

Вмѣсто корки сея по большей части находится въ употребленіи перегнанная изъ оной вода, и сея масло. Однако и оную употреблятъ можно съ слабости желудка и другихъ сему подобныхъ припадковъ.

Cortex mefereî корка волчьего корня или горунъ.

Сія корка употребляется снаружи такъ, какъ нарывной пластырь для произведенія искусственныхъ болячекъ. Она чрезвычайно ѣстъ, однако не весьма много производитъ гною, что впрочемъ по справедливости въ искусственныхъ болячкахъ предпринимается. Сія корка съ большею пользою употребляется внутрь въ любострастныхъ болѣзняхъ, наипаче когда такими болѣзнями обдержимы будутъ и твердыя части, а особливо кости, и когда взглядомъ худого состоянія влагъ не совѣмъ безопасно употреблять можно ртутныя лекарства.

Въ семъ случаѣ мы велимъ взять полушца сел корки и столько же солодковаго корня, на
два

два фунта воды, потомъ велимъ варить вещи сіи до тѣхъ поръ, пока цѣлая выпрѣетъ половина воды, и послѣ употреблять отваръ сей по не большому количеству. Англичане въ золотушныхъ болѣзняхъ употребляютъ корку сію вмѣстѣ съ цикушою. *М*

*Сотех ѣмагибае завязная корка
Американскаго дерева.*

Сія корка имѣетъ весьма много сходства съ кашкарылловою коркою, и съ великою пользою употребляется въ поносахъ, великую слабость причиняющихъ и дисентеріи или кровавомъ поносѣ. Сія корка вяжетъ и производитъ испарину. Она горячипъ, однако не весьма сильно, и не такъ, какъ кашкарылловая корка, такъ что оную вмѣсто кашкарылловой корки употреблять можно. Ее весьма хорошо давать въ отварѣ или настойкѣ на примѣръ: можно взять корки сея половину унца и варить въ водѣ, пока всего отвара останется унцовъ восемь, котораго всякой часъ по ложки давать должно.

Сгетог таттагі креморъ биннаго камня.

Винной креморъ есть весьма хорошее слабительное лекарство, и употребляется для выведенія изъ тѣла гнилыхъ и желчныхъ нечистотъ. Хорошо оной употреблять вмѣсто обыкновеннаго питья съ водою. Мы всегда велимъ брать онаго два унца на три фунта воды, варить въ

глиняномъ сосудѣ, давать хорошо отстоивающія и примѣшивающія къ отвару нѣсколько меда или сахара.

Естьли креморъ виннаго камня хорошо очистить отъ щелочной, приставающей къ нему, соли посредствомъ химическихъ операций; то изъ онаго вмѣстѣ съ медомъ или съ манною можно составить сиропъ, которой составляетъ самое лучшее слабительное, жаръ утоляющее, лекарство.

Crocus шафранъ.

Шафранъ цѣпается между болеутолятельными и крѣпительными лекарствами; почему можно употреблять сной во всѣхъ болѣзняхъ, отъ чрезвычайной слабости происходящихъ. Смотри *утоляющія Зиденгемовы капли и и лилюли отъ истерическихъ болѣзней* (laudanum liquidum Sydenhami et pilulae antihystericae). Шафранъ также гонитъ мѣсячину и геморрой. Смотри *бальзамическія лилюли* (pilulae balsamicae).

Crocus metallorum металлической шафранъ.

Сія такъ сказать известъ или соль готовится слѣдующимъ образомъ:

Возьми сырой въ порошокъ ис- RC. Antim. crud. plur.
полченной сурьмы.

Чистой, въ порошокъ превра-
щенной, седмиры по ровной ча-
сти.

Nitri puri pulv. aa.
partes.

Смѣшай,

Смѣшай, пережги въ раскаленномъ плавильномъ горшкѣ и послѣ перемой.

Симъ образомъ разрушается сурьмяная сѣра и обращается въ известъ нѣкоторая часть королука. Изъ щелока, которой оспается отъ перемыванія шафрана, получается сурьмяно-саянная селитра (*nitrum antimoniatum*). Сей шафранъ, или сія соль послѣ перемывки оспавшая состоитъ изъ корольковыхъ часпей, изъ коихъ нѣкоторыя суть обращенны въ известъ, иныя посредствомъ нѣкоторой часпи сѣры находящіяся въ соединеніи, а нѣкоторыя впрочемъ въ небольшомъ количествѣ совсѣмъ суть свободны или отдѣленны. Двѣ послѣднія часпи суть тѣ самыя, которыя доставляютъ вину, естли имъ дали оныя часпи, ровное качество. Смотри благословенную или роутную воду Рундгову (*aqua benedicta Rulandi*).

Е.

Electricitas электрическая сила, или
электрической огонь.

Воздухъ, которой насъ окружаетъ и которой мы обыкновенно называемъ Атмосферическимъ, всегда исполненъ есть большимъ или меньшимъ количествомъ электрической матеріи, которая съ тѣлами животныхъ частію посред-

ствомъ кожи, частію посредствомъ дыханія со-общается, и производитъ извѣстное и имъ со-размѣрное дѣйствіе.

То тѣло, которое кромѣ собственной элек-трической силы, получаетъ еще оную и въ себя вбираетъ и отъ другихъ тѣлъ, называе-ся *положительно или много электрическимъ* (*positive electricum*). Но то тѣло, которое со-общаетъ электрическую силу свою другому тѣ-лу, и такимъ образомъ лишается притягатель-ной или электрической силы, называется *отри-цательно или мало электрическимъ* (*negative electricum*).

Почему естли желательно употреблять электрическую силу такъ какъ какое либо осо-бливое лекарство; то должно, чтобы то тѣ-ло, которое избыточествуетъ электрическую матерію, отрицательною, а которое мало имѣетъ въ себѣ электрической матеріи, положи-тельною снабдить электрическою силою, то есть отъ одного отнять излишнее количество электрической матеріи, а другому недостающа-го придать оныя удивительныя матеріи.

Преизбыточествующей, обыкновенно положи-тельною называемой, электрической матеріи въ человѣкѣ дѣйствія суть слѣдующія: то есть

1) Что она въ пятеро или шестеро больше умно-жаетъ круготеченіе крови.

■)

2) Споспѣшествуетъ къ большому и удобнѣйшему отдѣленію влаги.

3) Отгончаетъ всѣ тѣлесныя влаги.

4) И дѣлаетъ чувствительнѣе и раздражительноѣе всѣ вообще органы нашего тѣла.

Откуда заключить должно, что естѣли въ комѣ тихо и медленно кругообращается кровь, отдѣленія не въ довольномъ совершающся количествѣ и влаги застаиваются, въ томъ находящіяся недоспапокъ въ электрической силѣ или матеріи, коюрой недоспапокъ естѣли пополнить; по всѣ вышесказанныя худыя слѣдствія опровергнуть можно.

Почему избыточествующая электрическая сила или матерія можетъ споспѣствовать къ разбитію затвердѣлыхъ желѣзъ, теченію геморроя, леченію параличныхъ и застарѣлыхъ ломотъ въ тѣлѣ.

Напротивъ въ комѣ находится чрезвычайная раздражительность и чувствительность, по причинѣ коюрыхъ удобно могутъ возпослѣдовать судороги и сведенія, тому больше болѣзни причинить можетъ такъ называемая отрицательная, по естѣ недоспапочная электрическая сила.

И такъ естѣли кто хочетъ вообще всякое тѣло наполнить электрическою матеріею, или
ли-

лишить оное избытка собственной его электрической матеріи, чтобъ относительно до перваго случая, отдѣлить только долженъ оное отъ другихъ тѣлъ и такимъ образомъ электризовать оное.

Но еслии желательно дѣйствованіе непосредственно на самыя страждущія части, на затвердѣнія на примѣръ, пораженныя параличемъ члены и сему подобныя припадки; то въ такомъ разѣ надлежитъ возымѣть стараніе, чтобы чрезъ тѣ самыя части сообщать тѣлу электрическую матерію, или сию самую матерію чрезъ помянутыя части выводить изъ тѣла вонъ, дабы такимъ образомъ воспослѣдовавшей отъ того ударъ или потрясеніе могло дѣйствовать на самыя болѣзнуюющія части.

Опытъ научаетъ, что великіе удары электрической силы вмѣсто пользы, неожиданной могутъ причинять, да и дѣйствительно причиняютъ вредъ; почему гораздо лучшее дѣйствіе производитъ электрическая сила, когда удары оныя мало по малу посредствомъ тѣла изъ дерева или металла сдѣланнаго и заостреннаго производятся такъ, что больной отъ того никакихъ досадныхъ чувствованій не ощущаетъ; въ какомъ однакожъ случаѣ нарочито великая важна быть машина.

Elixirium antiscorbuticum капли отъ цынгот-
ной или скорбутиной болѣзни.

Сіе лекарство составляютъ слѣдующимъ обра-
зомъ :

Возьми водяного экстракта изъ	RC. Extract. trifol. fibr.
дьялины или шриленска.	centaur. minor.
Золототысличника.	Fumariz aquos.
Чистяка.	Gramin.
Пирейника по полуна.	Аа unc. sem.
Распусти въ ромашковой во-	Solv. in aq. Chamom.
дѣ, взявъ оной фунтовъ че-	libr. IV. dein
тыре; послѣ придай:	adde:
Ложечного, съ ложечною шо-	Spirit. cochleariz unc.
есть травною пригошовленна-	II.
го спирта два унца.	
Купоросной кислоты 2 золот-	Olei vitriol. dr. II.
ника.	
Смѣшай и дай для употребле-	M. d. usoi.
нія.	

Весьма хорошее есть сіе лекарство, естли
его употреблять тогда, когда со скорбутомъ
или цынготною болѣзнію будумъ находиться
вкупѣ слабость и запоры въ животѣ, или его вну-
тренностяхъ. Сего лекарства употреблять,
можно по одной ложки предъ сѣдомъ и предъ
ужиномъ.

Лекарство сіе простѣе составить можно слѣ-
дующимъ образомъ :

Возьми полынного экстракта 2	RC. Extract. absynth. unc. II.
золотника.	
Распусти въ ключевой во-	Solu. in aq. fontan. libr.
дѣ, взявъ оной фунтовъ	IV. postea adde spirit.
четыре. Послѣ прибавь ле-	cochlear. unc. II.
жечного спирта 2 унца.	Купо-

Купоросной кислоты а во-
дошника.

Смѣшай и дай для употреб-
ленія выше показаннымъ
образомъ.

Ol. vitriol. dr. II.

M. d. usui modo supra
dicto.

Elixirium resolvens разбивательныя капли.

Сія капли приготовляются такъ:

Возьми перечищенной виннаго RC. Sal. tart. depur. unc. I.
малая соли.

Насыть ее

Морсколуковниѣ уксуомъ,
гдѣ аптекахъ находящися,
Послѣ придай:

Водянаго экстракта изъ
чистяка, пысачелистника,
который иначе называется,
рудометкою, деревей и
дикую гречуху,
Трилистника или даш-
лины.

Кудряваго волчца по полу-
ца.

Ромашковой простой воды
четыре фунта.

Сурьмяной линишуръ
Якововой.

Пропускныхъ или разбива-
тельныхъ железныхъ ка-
пель по одному унцу.

Смѣшай и дай.

Satur. cum

Acet. squellitic.

Dein adde:

Extract. fumariz.
millefol.

Trifol. libr. aquos.

Card. benedic. aa unc.
sem.

Aq. chamom. f. v. libr.
IV.

Tinctur. antim. Jacob.

Mart. aperitiv. aa unc. I.

M. d.

Сія капли или сія микстура во всѣхъ болѣз-
няхъ отъ испорченной и худосочной крови про-
исходящихъ, а наипаче въ водяной болѣзни,
также когда находятся внутри разные завалы

и слабостѣ во внутренностяхъ, съ превеликою пользою всякіе два часа по положки употреблять можно.

Сіе лекарство простѣе составить можно слѣдующимъ образомъ:

Возьми соли виннаго камня че-	RC. Sal. tart. unc. IV. Satur.
тыре унца.	снм
Насынь оную виннымъ	Acet. vin.
уксусомъ.	
Послѣ придай экстракта	Dein adde extract. card.
изъ кудряваго волчца и ди-	benedic. millefil. aa unc.
кой гречухи по одному зо-	I.
лотнику.	
Смѣшай и дай для употре-	M. dr. usui supra dicto
вленія вышешписаннымъ	mado.
образомъ.	

Еlixirium robobans крѣпительная капли.

Капель сихъ составъ есть слѣдующій:

Возьми водянаго экстракта	RC. Extract. cort. peruviam.
изъ перуанской корки.	
Кашкариловой корки.	Cascarill.
Спародубки.	Gentian. rubr.
Ромашки по ползолотника.	Chamomil. aquosi aa unc.
	sem.
Рыпусти въ водѣ Нѣмецкой	Solv. in aq. menth.
мяты, безъ вина приготоулен-	piper. f. v. libr. IV.
ной, взявъ оныя фунта чешыре.	
Послѣ придай влззательныхъ	Dein adde tinctur.
желѣзистыхъ капель чешыре	mart. adstring. unc.
унц.	IV.
Смѣшай и дай.	M. d.

Сихъ капель или сего лекарства можно давать всякой день по нѣсколько ложекъ отъ слабости желудка-

желудка и кишекъ, возпослѣдовавшаго послѣ горячки, или другихъ великую слабость причиняющихъ болѣзней.

Простѣе составить можно сіе лекарство такимъ образомъ:

Возьми экстракта изъ кашкариловой корки и шародубки по одному унцу.	RC. Extract. cort cascarill. gantian. rubr. aa. unc. I.
Распусти въ рѣчной водѣ, взявъ оныя фунтовъ четыре, и послѣ придай вязательныхъ желѣзныхъ капель четыре унца.	Solv. in aq. font. libr. IV. dein adde tinctur. mart. adstring. unc. IV.
Смѣшай и дай для употребленія вышеписаннымъ образомъ.	M. d.

Emplastrum de ammoniaco cum mercurio
пластырь, составленный изъ аммоніаческой гумми и ртути.

Сей пластырь составляется такъ:

Возьми чистой ртути или живаго серебра 3 унца.	RC. Mercur. viv. unc. III.
Сѣрнаго простаго бадьяма одинъ золотникъ.	Bals. sulphur. simp. dr. I.
Мѣшай весьма крѣпко, и поемножку прибавляй растопленной аммоніаческой гумми фунта два. Такимъ образомъ составивши пластырь, дай для употребленія.	M. exuctiffa, et paulatim adde gum. ammoniac solut. libr. II. hoc modo factum emplastrum detur usui.

Пластырь сей имѣетъ весьма великую силу разбивать застой и разныя зашвердѣнія, а иначе

иначе отъ непрезвой жизни воспослѣдовавшия, каковы сунъ паховики (bubones) и прочая.

Emplastrum de cicuta цикутной или омеговой пластырь.

Сей пластырь приготавливаютъ слѣдующимъ образомъ:

Возьми сѣбжаго цикутнаго RC. Saccc. rec. cicut. unc.	
сока шестинадцать унцовъ.	XVI.
Порошка изъ сѣбж-цикут-ной травы.	Pulv. h. cicut. recent.
Аммоніаческой гумми.	Gumm. ammoniac.
Морскаго уксуса по восьми унцовъ.	Acet. squillitic. aa unc. VIII.
Желтаго воску.	Cer. citrin.
Оливковаго или деревяннаго масла по четыре унца.	Ol. olivar. aa unc. IV.
Смѣшай и слѣдай по правиламъ искусства пластырь.	F. l. a. emplastrum.

И сей также пластырь имѣетъ весьма великую силу разбивать опухоли, а наипаче золотушною причиненныя матерією. Почему весьма полезно употреблять оной для разбиванія членосоставныхъ опухолей.

Emplastrum resolvens Schmückeri. Шмюккеровъ разбивательной пластырь.

Пластырь сей такъ составляется:

Возьми аммоніаческой гумми RC. Gum. Ammon. libr. III.	
три фунта.	
Черного духа одинъ фунтъ.	Aff. fetid. libr. I.
Гречкаго мыла полфунта.	Sap. venet. libr. f.
Распусти въ довольномъ	Solv. in acet. vin. q. f.
Часть VII.	Т КОДИ-

количествѣ виннаго уку-
са, послѣ стусни есе уку-
съ и составъ пластырь.

dein Inspriffa ad emplastrū
consistentiam.

Сей пластырь весьма полезно употреблять для разбиванія застпоевъ и опухолей, отъ спазмовъ или судорогъ происходящихъ. Я самъ видѣлъ особливую дѣйствительность оного въ разбиваніи членососпавныхъ, отъ наружныхъ причинъ, возпослѣдовавшихъ опухолей.

Еслили въ опухоляхъ не будетъ примѣчаема наклонность къ воспаленію; по вмѣсто мыла, можно употреблять медъ, отъ чего весьма хорошее видѣть можно дѣйствіе сего разбивательнаго пластыря.

Emplastrum vesicatorium нарывной пла- стырь.

Нарывной пластырь можно составить слѣдующимъ образомъ:

Возьми желатаго воска де пять RC. Cer. flav. unc. X.
унцовъ.

Венецѣанскаго терпентина.

Terebinth. v.

Деревяннаго масла по три
унца.

Ol. olivar. aa unc.
III.

Порошка изъ испанскихъ
лухъ восемь унцовъ.

Polv. canthar. unc.
VIII.

Смѣшай и сдѣлай пластырь.

M. f. emplastr.

Сколь полезенъ есть сей пластырь, всякъ видѣть можетъ изъ ежедневныхъ убѣдительно-шихъ опытовъ. Еслили кто изъ больныхъ имѣетъ великую раздражительность и чувстви-
тель-

пелальность, словомъ нѣжное сложеніе; по для отвращенія могущихъ воспослѣдовать худыхъ припадковъ, а наипаче моче *fla* (stranguria), которой шпанскія мухи удобно причиняютъ, хорошо примѣшивать не большее количество камфоры, которая какъ примѣчено, всѣ худыя отъ употребленія шпанскихъ мухъ воспослѣдовать могущія отвращаетъ слѣдствія.

*Emplastrum vesicatorium praeperitum всегда-
шній нарывной пластырь.*

Сей пластырь составляется изъ слѣдующихъ веществъ:

Возьми порошка шпанскихъ мухъ полшора унца.	RC. Polv. canthar. unc. I. et f.
Берберіевой гумми.	Gum. Evphorb.
Масличной гумми.	Masticis.
Венеціанскаго терпентина по четыре унца.	Terebinthin. Ven. aa unc. IV.
Смѣшай и слѣдай по предписанію пластырь.	M. f. l. a. emplastrum.

Сей пластырь можно употреблять одинъ, такъ какъ мокроту натягивающее лекарство; ибо оной весьма великую пользу приноситъ въ насморкахъ и глазоболѣніяхъ наипаче, смѣшанъ будучи съ камфорою. Сей пластырь также хорошо производитъ суппурацію или гноетеченіе изъ того мѣста, къ которому приложенъ былъ нарывной крѣпче его пластырь.

Essentia aloës сабуровыхъ капли.

Капли сіи составишь можно, естли распустишь сабуръ въ винномъ спиртѣ. Онѣ употребляются снаружи для очищенія худыхъ ранъ, прибаваяюся къ водамъ отъ глазныхъ болѣзней, и примѣшиваются къ разбивательнымъ или крѣпительнымъ каплямъ. *Смотри сабуръ (aloe).*

Essentia angeicæ дягилебыхъ капли.

Сіи капли имѣютъ силу укрѣплять, разбивать и гонить вѣпры. Полезно употреблять оныя отъ круженія въ глазахъ, слабости, черной немочи, паралича, посвѣла, глазныхъ, ушныхъ, зубныхъ и грудныхъ припадковъ, отъ вязкой мокроты происходящихъ, отъ серцеболія, колики, насморчныхъ лихорадокъ и маточныхъ болѣзней. Даютъ ихъ отъ 40, 50, до 60 капель.

Essentia assae foetidae капли чертова духа или бонючей азы.

Онѣ составляются такъ:

Возьми гумми чертова духа	℞. Gum. assae foetid. unc.
два унца.	II.
Винного Руландова спирта	Sp. v. R. libr. I.
одинъ фунтъ.	
Дѣй настоялся, процѣди и отдай.	D. col. d.

Сіи капли можно употреблять съ пользою отъ мажочныхъ припадковъ. Ихъ давати можно разнообразно по 60 капель на одинъ пріемъ.

*Essentia auctupiorum померанцевыхъ
капли.*

Сіи капли полезно употреблять для разбиванія въшровъ въ желудкѣ.

Essentia castorei капли соборовой струи.

Капли сіи употребляются отъ истерическихъ, то есть мажочныхъ болѣзней. Ихъ давати можно по 30, 50 и 60 капель на одинъ пріемъ. *Смотри соборовая струя (castoreum).*

*Essentia pimpinellæ albæ лимонелловыхъ
или бедренцевыхъ капли.*

Корень бедренцевъ имѣетъ раздражительную и разбивательную силу. Почему и капли приготовленныя изъ корня сего, будучи примѣшанны къ полосканьямъ, весьма великую приносятъ пользу при разбиваніи въ шеѣ и горлѣ находящихся мокротныхъ, обыкновенно насморчными называемыхъ, застоевъ. *Смотри корень бѣлаго бедренца (radix pimpinellæ albæ).*

*Essentia valerianæ балдырьяновыя
капли.*

Капли сіи приготовляются изъ балдырьяноваго корня, который есть пріятъ, оспиръ и горекъ.

рекѣ. Почему разбиваетъ мокроту, производитъ потъ, гонитъ мочу и нѣкоторую имѣетъ утолительную силу. Откуда видно, что и капли балдырьяноваго корня можно употреблять въ гнилыхъ и негодныхъ или спасныхъ лихорадкахъ; ихъ обыкновенно почти примѣшиваютъ къ микстурамъ, производящимъ потъ такъ, что ихъ всякой день можно употребить до половины золотника. Смотри корень балдырьяновъ (*radix valerianæ*).

Extractum absynthii aquosum водной лопухиной экстрактъ.

Сие лекарство употребляется отъ глистовъ и для разбиванія многой склизы, на первыхъ путяхъ находящейся. Экстрактъ сей можно употреблять всякой день до половины или и цѣлаго золотника, распуская въ ромашковой водѣ, приготовленной дома, или купленной въ Аптекѣ.

Extractum ligni sampechenensis aquosum водной или водянистой экстрактъ изъ Камлехскаго дерева.

Сие лекарство имѣетъ силу вязать, и нѣкоторымъ образомъ прищиплять остроу. Почему съ великою пользою употребляютъ оное всякой день отъ одного до двухъ золотниковъ въ

въ поспешномъ основаніи и униманіи
долговременныхъ поносовъ. Впрочемъ рѣдко мо-
жно сыскать во всегдашней готовности сіе ле-
карство, да и подлинно трудно извлекать изъ
дерева сего вязательное его существо. Сіе
лекарство можно употреблять въ пѣхъ
случаяхъ, когда симмарубовая корка будетъ при-
чинять чрезвычайной жаръ.

Extractum cascarillae aquosum **бодянистой**
кашкариловой экстрактъ или
сгущенной сокъ.

Сіе лекарство употребляемъ мы, смѣшивая
оное либо съ какимъ нибудь уполяющимъ жаръ
порошкомъ, либо съ какимъ нибудь растворомъ,
въ пѣхъ случаяхъ, когда намѣреваемъ укрѣ-
пить ослабшія части. Его употреблятъ мо-
жно всякіе два часа по нѣскольку грановъ, и
смотря по обстоятельству можно употре-
блять оное и до цѣлаго золотника всякой день,
раздѣливъ въпрочемъ на многіе приемы. *Смотри*
жѣлительныя халли (elixirium roboran).

Extractum centavrii minoris aquosum **бодя-**
нистый экстрактъ изъ золото-
тысячника.

Сіе лекарство принадлежитъ къ разбиватель-
нымъ или легкимъ крѣпительнымъ лекарствамъ.

**Смотри разбивательныя и противоцинготныя
капли.** (elixirium resolvens et antiscorbuticum).

**Extractum florum chamomillæ aquosum водя-
нистой экстрактъ изъ ромашко-
выхъ цвѣтовъ.**

Понеже ромашка имѣетъ особенное свойство и силу пособлять ослабшимъ чувствительнымъ жиламъ; для того экстрактъ или сгущенной сокъ оныя полезно употреблять въ такихъ обстоятельствахъ, въ которыхъ не можно давать хинской корки. Экстрактъ сей можно смѣшивать и съ другими лекарствами. Смотри **крѣпительныя капли** (elixirium robicans).

**Extractum corticis chinæ aquosum водянистой
экстрактъ хинской или лихорадочной корки.**

Въ приготовленіи сего экстракта великая важность состоитъ въ томъ, чтобы корку сію не вдругъ и скоропостижно вываривать, но готовить экстрактъ изъ оной посредствомъ долгой настойки, и пихаго и нескорого сгущенія.

Экстрактъ сей хорошо употреблять тогда, когда не можно употреблять самой въ ея существѣ, то есть въ порошокъ, корки, или когда больные не хотятъ, или не могутъ принимать оной, какъ-то не рѣдко случается съ малыми дѣтьми.

По

Поселику же одинъ унцѣ сел корки едва одинъ золопникъ дастъ экстракта; для того можно употреблять онаго больше золопника всякой день, раздѣливъ на разные приемы.

**Extractum cicutaе цикутной или болыго-
ловой экстрактъ.**

Сей Экстрактъ должно составлять посредствомъ сгущенія цикутнаго сока, дабы дѣйствительныхъ частей онаго не испребитъ сильнымъ выпариваніемъ цикуты. Смотри цикутную или болыголовую траву (*herba cicutaе*.)

**Extractum fumariae aquosum водянистой
чистяковъ экстрактъ.**

Сіе лекарство весьма хорошо разбивать можетъ непопробныя мокроты и застои, и по причинѣ своихъ существенныхъ соляныхъ частицъ дѣйствуетъ на мочетворныя орудія и такимъ образомъ гонитъ мочу. Его можно употреблять отъ лишаевъ и другихъ симъ подобныхъ припадковъ.

**Extractum gentianae rubrae aquosum водя-
нистой экстрактъ изъ стародубки.**

Сей сгущенной сокъ принадлежитъ къ горькимъ крѣпительнымъ лекарствамъ. Смотри о семъ разбавительныя и горькія капли (*elixirium refolvens et roborans*).

*Extractum graminis aquosum водянистой
пирейной экстрактъ.*

Сіе лекарство принадлежитъ къ кровочистительнымъ лекарствамъ. Я обыкновенно употребляю выжатой изъ свѣжихъ пирейныхъ корней сокъ, въ какомъ случаѣ оной не только есть дѣйствительнѣе и сильнѣе въ разбиваніи, но и въ большемъ количествѣ по причинѣ пріянности своей принимаемъ быть можетъ. Сока сего я употреблялъ всякой день отъ пяти до шести унцовъ. Смотри жила отъ цынготной болѣзни. (elixirium antiscorbuticum.

*Extractum hellebori aquosum водянистой
экстрактъ изъ черной че-
мерицы.*

Сіе лекарство можно употреблять тогда, когда больной не очень будетъ чувствителенъ, и особливая слабость находится въ жилахъ. Сіе лекарство полезно давать тѣмъ больнымъ, въ коихъ наклонность примѣчается къ коликамъ. Экстракта сего можно давать всякой день въ какомъ либо растворѣ до дванцати грановъ.

Extractum saturni свинцовой экстрактъ.

Экстрактомъ свинцовымъ называется растворъ свинцовой извести въ укусуѣ, которой отъ обыкновенно-

новеннаго глепцоваго укуса тѣмъ токмо различествуетъ, что имѣетъ большую крѣпость.

Сей экстрактъ растворяется въ водѣ и употребляется такъ какъ противовоспалительное, разбивательное и крѣпительное лекарство отъ воспалительныхъ опухолей и глазныхъ болей.

*Extractum taraxaci одуванчиковой
экстрактъ.*

Одуванчики, такъ какъ и прочія млечистыя расцвѣтія имѣютъ нѣжную остроту, по силѣ которыхъ они имѣютъ свойство разбивать завары, которому пособляютъ и тѣ соляныя частицы, которыя въ оныхъ въ довольномъ находящяся количествѣ.

Экстрактъ сей весьма хорошо приготовлять изъ выжатаго изъ корней и травы сока и сгущеніемъ онаго на легкомъ огнѣ.

*Extractum trifolii fibri экстрактъ изъ
дятлины.*

Сіе лекарство есть горькое и имѣетъ свойство разбивать завары. *Смотри колли разбивательныя и противоцинготныя, (elixirium resolvens et antiscorbuticum).*

F.

**Fel tauri inspissatum сгущенная бычачая
желчь.**

Желчь сію такъ какъ разбивательное лекарство можно употреблять отъ желтухи, и вообще во всѣхъ пѣхъ случаяхъ, гдѣ находится недостатокъ въ желчи. На одинъ день желчи сей довольно будетъ одного золотника.

**Folia belladonæ листы бѣлой блекоты или
красавицы.**

Блекота кромѣ сыпнательнаго свойства имѣетъ еще силу утолять судороги и производить испарину, и съ пользою употребляема быть можетъ отъ угрызенія бѣшеннoй собаки и въ чувствительныхъ лихорадкахъ. И я также примѣтилъ изрядное дѣйствіе оныя въ нѣкоторыхъ видахъ паралича. рослымъ можно давать оную въ порошокъ или экстрактъ, отъ пяти до десяти грановъ въ ѣдни или двое супокъ.

**Flores salis ammoniaci martiales желѣзистыя
цвѣты нашатырной соли.**

Сии цвѣты суть не что иное, какъ перечищенная нашатырная соль, желѣзными частицами снабжденная, которую для сей самой причины полезно употреблять въ разбитіи заваловъ, отъ слабости происходящихъ, также въ четверодневныхъ лихорадкахъ, а наипаче въ дѣвичей без-

безцѣпности или бѣлой дѣвичей желтухѣ (chlorosis).

Сначала должно давать лекарство сіе по нѣскольку грановѣ, умножая мало по малу пріемѣ до 20 и даже 60 грановѣ. Смотри порошокъ отъ лихорадки (pulvis antifebrilis).

Говорятъ что сіи цвѣты, или сія нашатырная желѣзистая соль, какъ снаружи, такъ и внутрь будучи употреблена всякой день до нѣсколькихъ зелошниковѣ, при умноженіи пріемовѣ, въ ранахъ ракомъ зараженныхъ весьма великую приносила пользу. Чего однакожъ собственнымъ опытомъ я подтвердить не могу, хотя и очень много вѣрю таковому повѣщенію.

Flores arnicæ verae ивановъ цвѣтъ,
цвѣты дикой козы.

Сіи цвѣты имѣютъ въ себѣ остроту и горькость, и, будучи употребляемы такъ какъ чай, разбиваютъ хорошо застои, такъ что ихъ весьма полезно употреблять въ разбиваніи густой мокроты и закаловъ въ легкомъ. Цвѣты сіи употребляютъ еще въ кровохарканіи и разбиваніи стоячей крови, изъ сосудовъ своихъ вытекшей, что наипаче случается въ ушибахъ.

Сіи цвѣты весьма полезно употреблять еще и въ перемежающихся лихорадкахъ и другихъ, отъ ослабленія жидъ происходящихъ, болѣзняхъ.

По-

Поелику же они суть весьма оспры и ѣдки, и, будучи употребленны въ великомъ приѣмѣ, производятъ рвоу; для того должно употреблять ихъ въ тонкой настойкѣ, взявъ одинъ золотникъ цвѣтовъ сихъ на два фунта воды, и смотря по обстоятельствамъ умножить приѣмъ оныхъ. *Смотри грубые разбивательныя сорта или травы (species pectorales resolventes).*

Flores chamomillae vulgaris ромашковые цвѣты.

Сии цвѣты имѣютъ противосудорожныя и въспроразбивательныя силы, почему весьма полезно употреблять оныя такъ какъ чай въ помянутыхъ случаяхъ или припадкахъ. Полезно употреблять цвѣты сии, стерши въ порошокъ и отъ перемѣжающихся лихорадокъ, давая на одинъ приѣмъ отъ 20 до 40 грановъ. Онѣ также разбиваютъ засоренія, во вдохахъ находящіяся, почему въ таковыхъ случаяхъ съ превеликою пользою употребляемы быть могутъ. А что они точно разбиваютъ завалы; то сіе доказывається тѣмъ, что настойка изъ оныхъ производитъ иногда рвоу. *Смотри разбивательной или пролускной порошокъ (pulvis esphracticus).*

Flores sambucci бузиновые цвѣты.

Бузиновые цвѣты имѣютъ свойство разбивать и мягчить, и по причинѣ бальзамическихъ частей,

которыя они въ себѣ содержатъ, производятъ потъ. *Смотри воду бузиновыхъ цвѣтовъ* (aqua florum sambucci).

Flores sulphuris, сѣрные цвѣты.

Цвѣтами сѣрными называется перечищенная сѣра. Сѣрные цвѣты употребляются по большей части въ коростѣ, отъ которой оныя нарочитое составляютъ лекарство. *Смотри сѣрную леченку* (hera sulphuris).

Сѣрные цвѣты, смѣшавши съ креморомъ виннаго камня, хорошо употреблятъ въ гемороевскихъ припадкахъ. Они составляютъ самое лучшее лекарство отъ завазовъ печенки и воротной жилы. Ихъ можно употреблять отъ десяти, до тринадцати грановъ на одинъ прѣмъ нѣсколько разъ въ день.

G.

Gargarisma adstringens *взателное* *полосканье*.

Сіе полосканье составляется такъ:

Возьми ключевой воды десять *℞*. Aq. font. unc. X.
унцовъ.

Бедреновыхъ капель полуунца.

Essent. pimpinell. алъ.

unc. sem.

Сырыхъ квасцовъ два золотника.

Alum. crud. gr. II.

Смѣшай и дай.

M. d.

Сіе

Сие полосканье весьма хорошо употреблять для укрѣпленія ослабшаго язычка въ горлаѣ и отъ мокротной жабы.

*Gargarisma resolvens разбивательное по-
лосканье.*

Сие полосканье, употребляемое въ разбиваніи воспалительныхъ опухолей, составляется слѣдующимъ образомъ:

Возьми простаго уксунаго ме- RC. Oxytel. f. unc. II.
да два унца.

Перечищенной селистры под- Nittr. depur. unc. f.
унца.

Пижинелловыхъ капель два Effent. pimpinell. alb.
золотинна. dr. II.

Воды бузиновыхъ цвѣтовъ де- Aq. flor. sambuc. unc.
сять унцовъ. X.

Смѣшай и дай, M. d.

Globuli martiales, железные шарики.

Составъ сихъ шариковъ есть таковъ:

Желѣзо распускается въ кислотѣ виннаго ка-
мня, и наконецъ сгущается сей растворъ. Изъ
огустѣлой сей желѣзистой массы составляются
шарики вѣсомъ въ половину или цѣлой золо-
тинкѣ. Употребляются для насыщенія желѣз-
ными частицами холодныхъ бань, почему сна-
чала распускается сихъ шариковъ нѣсколько ун-
цовъ въ теплой водѣ, и сей растворъ примѣ-
шивается наконецъ къ холодной водѣ, изъ коей
хотяшъ составить холодныя бани.

Gummi ammoniacum **аммоніаческая
гумма или камедь.**

Сія камедь есть весьма сильное разбивательное лекарство, почему споспѣшествуетъ къ изверженію худой матеріи изъ легкихъ, и употребляется обыкновенно тогда, когда уничтожился воспаленіе. *Смотри разбивательныя лилюли и ирудные также разбивательные сиропы* (*pilulae resolventes et syr. pectorales itidem resolventes*).

Впрочемъ сіе лекарство всегда лучше употреблять въ жидкомъ видѣ. Естьли гдѣ либо имѣютъ мѣсто соли; то нашатырная соль въ томъ случаѣ для пособія разбиію весьма великую приноситъ пользу, будучи употребляема въ водяныхъ растворахъ. Кромѣ сего сія гумма распускается еще въ уксусномъ меду, личномъ желткѣ и Арапскомъ клею.

Gummi Arabicum **Аралской клей или
камедь.**

Она нечто есть иное, какъ склизъ стуженная, которая и употребляется, такъ какъ припуляпильное лекарство, въ чрезвычайной раздражительности или чувствительности кишекъ, калр въ долговременномъ поносѣ, естьли ее принять внутрь, или приготовить изъ оныя промывательное лекарство. Сія камедь употребляется также и къ раствору ртутти или живаго серебра. *Смо-*

три ртутной Пленкозъ разтворъ (mercurii solutio Plenciana).

Gummi assae foetidae варъ или гумма чертова духа.

Сія вонючая гумма имѣетъ весьма великую силу разбивать и утолять судороги, почему весьма полезно употреблять оную опѣ ипохондрическихъ и истерическихъ припадковъ, наипаче когда и завалы внутри примѣчены будутъ. *Смотри лилюли отъ истерическихъ или маточныхъ припадковъ (pilulae antihystericae.)*

Сія камедь распускается и въ водѣ. Ее употребляютъ можно до двухъ золотниковъ всякой день. Она и снаружи будучи употреблена, весьма сильно разбиваетъ опухоли. *Смотри разбивательной пластырь Шмуккерова (Emplastrum resolvens Schmuckeri).*

Gummi Euphorbiae Есфорбіева гумма.

Сія гумма поелику есть очень ѣдка и оспра; для того употребляется только снаружи такъ, какъ мокротонапагивательное лекарство. *Смотри нарывеной всегдашней пластырь (Empl. vesicator. perpetuum).*

Gummi Galbani Галбановая гумма.

Сія гумма имѣетъ весьма великое сходство съ Аммоніаческою гуммою, которую однакожъ по причинѣ тонкаго масла, которое она въ себѣ

содержитъ, и котораго Аммоніаческая гумма не имѣетъ, силою своею нѣсколько больше превышаетъ, почему она унимаетъ судороги и употребляется отъ ипохондрическихъ и истерическихъ или маточныхъ припадковъ. Смотри противостерическія пилюли (pilulae Antihystericae).

Gummi Guaiaci nativum **самородная гваяковаго дерева гумма.**

Сія гумма состоитъ изъ смолистыхъ и камедистыхъ частей, имѣетъ нѣкоторую остроту, и употребляется такъ, какъ нарочитое разбивательное лекарство отъ ломотныхъ припадковъ. Она пособляетъ отдѣленіямъ влаги и другихъ матерій, и будучи употреблена въ большемъ количествѣ, слабитъ желудокъ. Ее можно употреблять всякой день по одному золотнику. Она съ нашатырьною солью, или естли соли сеи по причинѣ ея ѣдкости употреблять не можно, съ Арапскою гуммою весьма скоро распускается въ водѣ. Ее также давать можно и въ пилюляхъ. Смотри разбивательныя пилюли (pilulae resolventes).

Естли больные будутъ сухаго сложенія и чрезвычайно чувствительны; то лучше употребляютъ водянистой экстрактъ сея гуммы, нежели самую гумму. Смотри Гваяковое дерево (lignum Guajaci).

Gummi guttae желтая камедь или
желтая гумма.

Сія камедь причисляется къ весьма сильнымъ проноснымъ лекарствомъ, почему и употребляется только въ водяныхъ болѣзняхъ и изгнаніи плоскихъ глистовъ (tenia).

Изъ наблюдений явствуетъ, что острота камеди сея уменьшается отъ соединенія ея съ манною, почему и можно давать оную въ купѣ съ манною и другими приличными лекарствомъ въ водяной болѣзни. Смотри также о леченіи отъ водяной болѣзни (pilula antihydrica.)

Чтобы выгнать плоскую глисту изъ шѣла; то можно употребить гумми сея въ одинъ день до шрипцаши грановъ, раздѣливъ на три приѣма. Лучше смотри о семъ о леченіи отъ червей или глистовъ.

Н.

Nepar sulphuris сѣрная печенка.

Сія печенка есть нечто иное, какъ сѣрной растворъ, посредствомъ щелочной огнепостоянной соли сухимъ путемъ произведенный.

Сѣра будучи шикимъ образомъ распущенна, или лучше сказать соединенна со щелочною солью,

солью, получаетъ большую летучесть или спонкость и проницаемость, и въ такомъ видѣ весьма хорошее имѣетъ дѣйствіе въ пользованіи заспарѣлой коросты.

Сея сѣрныя печенки берется одинъ золотникъ и распускается въ водѣ, коюрой приказываеся больному принимать всякій часъ по обыкновенной споловой ложкѣ, и еспли она не причиняетъ рвошъ; что ее можно употреблять по цѣлому золотнику въ день, что однакожъ мало по малу чинить должно.

Изъ сея печенки можно составить искусственную сѣрную баню, еспли взять оной одинъ унцъ и распусивъ въ водѣ. Впрочемъ всегда спарашся должно, чтобы печенку сію имѣть свѣжую; а сіе потому, что сѣра по причинѣ своего летучаго свойства скоро улетаетъ и разсыпается на воздухъ, а остается одна щелочная соль, которая въ коростной оспроу бываетъ больше вредна, нежели полезна.

Сія печенка естъ также весьма хорошее и дѣйствительное лекарство, когда кто либо оправится мышьякомъ или сулемою; потому что она удобно соединяется съ сими ядовитыми веществами, и, составивъ нѣкоторую средняго свойства соль, приупляетъ оспроу оныхъ. Ибо примѣчено изъ опытовъ, что мышьякъ, соединившись съ сѣрою, перяетъ свою оспроу

и ѣдкоу, а сулема разрушается щелочною солью, которая то есть соль опшимаеѣ у рѣтупи соляную кислоту, и дѣлаеѣ ее не ѣдкою.

Сію печенку можно употребляѣ для разбиванія подбородошныхъ килъ или волей, то есть тогда, когда оныя распи начиняютъ, да и жженныя раковины, естѣли почему, то наипаче по причинѣ сѣрной печенки, которая однимъ токмо запахомъ узнаеѣся, имѣютъ дѣйствіе свое въ разбиваніи помянутыхъ зобовъ.

*Herba Aristolochiae rotundae трава
конарняковая.*

Свѣжія листы сего прозябенія употребляютъ ся снаружи отъ ранъ и другихъ пятенъ или язвинъ, оставшихся послѣ какой либо болѣзни, и лр. послѣ оспы и прочая. А сіе потому, что листы сіи мягчатъ и сушатъ, имѣютъ то есть свойство засохшіе спрупы размягчатъ, а гніющіе сушить.

Herba boni Henrici стелной шалфей.

Трава или листы сего растѣнія имѣютъ живительную силу. Они гонятъ мочу, естѣли ихъ свѣжіе приложитъ къ отекамъ. Естѣли исполочъ свѣжія листы сего шалфея и смѣшавъ со сметаною или свежимъ масломъ; то они унимаютъ геморонныя боли. Такимъ образомъ со-
ста-

спавленная мазь прикладывается къ проходу и крестцу, или поясницѣ.

Herba centaurei minoris трава золото-
тысячная.

Сія трава относится къ горькимъ прозябѣ-
лѣмъ, имѣющимъ силы разбивать и укрѣплять.
Изъ верхушекъ сея травы, когда она еще цвѣ-
титъ, составляется экстрактъ. Смотри
(*extractum centaurei minoris*).

Herba cicutae цикутная трава, боли
голова.

Подъ симъ именемъ никогда не должно разу-
мѣть худой и ядовитой травы, но таковую,
каковую Г. Линней разумѣетъ подъ Латинскимъ
словомъ, которое пишется такъ: (*conium
maculatum*) то есть болиголова, имѣющая стебель
въ пятнахъ.

Сію траву похваляютъ отъ затвердѣній и
разныхъ золотушныхъ и зобныхъ застоевъ, что
и безошибочно, хотя и не рѣдко случается,
что она въ сихъ случаяхъ бываетъ не дѣй-
ствительна.

Наилучше употреблять ее въ пилюляхъ,
которыя составляются изъ равныхъ частей
свѣжей, въ порошокъ исполченной, травы и ея
экстракта или сгущеннаго сока. Давать оныя
пилюли начинать должно отъ одного, до двухъ
грановъ, умножая мало по малу приемъ.

Такимъ образомъ поступая, я давалъ до 100 грановъ всякой день, однако никакой пользы отъ этого не видѣлъ, какъ-то уже я и выше о томъ упомянутомъ.

Болиголова есть весьма противна для чувствительныхъ жилъ и слѣдственно для мозга, почему и не рѣдко рождаетъ весьма упорные и развѣ однимъ употребленіемъ уксуса и другихъ растительныхъ кислотъ уполимые обмороки и круженія въ глазахъ. Иногда производитъ она острые пупырышки на лицѣ и другихъ распухлыхъ частяхъ тѣла, о которыхъ произшествіи я ничего точнаго сказать не могу, чѣмъ ихъ почесать должно, высыпомъ ли золоушной маперіи, произведеннымъ цикутою, или наспоющимъ цикутнымъ произведеніемъ? Впрочемъ не бесполезно употреблять цикутныя кашышки.

Herba cochleariae ложечная трава.

Сія трава всѣ противоцинготныя превышаетъ лекарства. Гренландская трава, которой и у насъ много растетъ въ садахъ, всѣхъ видовъ сея травы есть преимущественнѣе. Ее употреблять должно свѣжую. Кромѣ цынготной болѣзни она лечитъ еще удушье и производитъ теченіе остановившейся мѣсячны у женщинъ. Смотри приправу противоцинготную (*conferva antiscorbutica*).

Herba malvae трава просфирковая.

Сія трава мягчитъ и уполяетъ спазмы; почему полезно употреблять оную такъ какъ чай отъ грудныхъ припадковъ, а снаружи въ припаркахъ для разбитія долговременныхъ воспалительныхъ заваловъ.

Herba meliloti донниковая трава.

И сія трава имѣетъ свойство мягчить и разбивать, почему и описывается къ такого состоянія травамъ. Смотри сорты или травы для припарокъ.

Herba menthae мятная трава.

Нѣмецкая мята имѣетъ весьма хорошія силы проптивосудорожныя и вѣспрегонительныя. Ови также употребляется и отъ слабости желудка. Смотри мятную воду (*aqua menthae*).

Herba millefolii трава дикой гречухи.

Сія трава, будучи употреблена такъ, какъ чай, часто оказываетъ хорошія дѣйствія въ геморойныхъ припадкахъ. Она также имѣетъ силу уполять судороги, въ чемъ иногда самую ромашку превышаетъ.

Herba nicotianae табачная трава.

Сія трава употребляется только въ видѣ промывательныхъ, которыя двоякимъ употребляются образомъ, въ отваръ и дыму. Декоктъ

или отварѣ часто приносятъ пользу въ тѣхъ случаяхъ, въ коихъ прочія слабительныя лекарства оказались не дѣйствительными.

Herba sabinae казацкой можжевельникъ.

Сіе произрастѣніе принадлежитъ къ ренцетамъ, весьма сильно гонящимъ влаги, которое можно употреблять въ тѣхъ случаяхъ, въ коихъ прочія лекарства таковаго же состоянія оказались не дѣйствительными.

Сію траву можно употреблять и снаружи, въ любострастныхъ наростѣніяхъ, въ коихъ селипренистая рпушь большее еще оказываетъ дѣйствіе.

*Herba trifolii fibrini трилистная трава
или дяquilla.*

Сіе прозябеніе имѣетъ горькой вкусъ, и разбивательную силу. Смотри экстрактъ трилистенной травы.

К.

Kermes mineralis красная сурьянокорольковая сѣра, или картузіанской порошокъ.

Сей химическій составъ готовится, когда сѣра варится со щелочною огнепостоянною солью, процѣживается отварѣ, когда еще
тепелъ

шпелѣ , и становится къ мѣсту для прохоло-
женія , отъ чего садится на дно красной поро-
шокъ , состоящій изъ сѣры , щелочной соли и
сурьмянаго королька , и слѣдственно порошокъ
сей есть нечто иное, какъ красная сурьмяная сѣ-
ра или сѣрная печенка , выпускающая коралько-
вые части.

Сей порошокъ, будучи хорошо смытъ и высушенъ,
представляетъ минеральной сурь , который,
если хорошо вымыть въ части щелочной со-
ли , весьма мало различествуетъ отъ сѣрной
печенки. А если невымывается соль , но ток-
мо опнивается порошокъ отъ своего щелоку ;
то отсюда получается также лекарство , ко-
торое почитай во всѣхъ случаяхъ имѣетъ пре-
имущество предъ сурьмяною печенкою.

Употребленіе сего порошка , при постепенномъ
умноженіи приѣма, въ болѣзняхъ, отъ коростной
шелудиной и золотушной оспроты происхо-
дящихъ , весьма великую приноситъ пользу. По-
елику сей порошокъ по причинѣ щелочной рас-
типельной соли удобно тянетъ въ себя влагу ;
для того лучше приготовлять оной съ на-
туральною щелочною солью , известною подъ
именемъ *саль соде* (sal soda). Впрочемъ сей хими-
ческій составъ относительно до рвотной онаго
силы есть слабѣе противъ сурьмяной сѣры пер-
ваго приготовленія или первой осадки , а крѣпче
и сильнѣе противъ сѣры третіей осадки.

I.

Lapides sanguium раковыя жерновки.

Раковыя жерновки составляютъ хорошее принимающее въ себя кислоту лекарствъ. Ихъ можно употреблять вмѣстѣ раковинъ и соляной или Аглинской магнезіи, хотя впрочемъ магнезія или марганецъ всѣхъ таковаго рода лекарствъ несравненно превышаетъ. А сіе потому, что марганецъ со всякими кислотами составляетъ удобораспускаемую соль.

*Laudanum liquidum sydenhami утѣлитель-
ныя Зиденгамскія капли.*

Капли сіи состояются слѣдующимъ образомъ:

Возьми Оивскаго опиѣ два унцѣ.	RC. Opii thebaic. unc. II.
Восточнаго шафрана одинъ унцъ.	Croc. orient. unc. I.
Порошка кориичеваго.	Pulv. cinnamom.
Гвоздичнаго по одному лотнику.	Caryophil. aa dr. I.
Гишпанскаго вина одинъ фунтъ.	Vin. Hispanic. libr. I.
Дай настояться, процѣди и дай.	Dig. col. d.

Хотя кажется и лучше бы было употреблять опиѣ, такъ какъ онъ есть въ существѣ своемъ, потому что такимъ образомъ можно весьма удобно опредѣлить пріемъ онаго: однако составъ сей въ столь великое вошелъ употребленіе, что всякой врачъ долженъ имѣть свѣдѣніе

дѣніе обѣ ономѣ. По сему предписанію всякія шесть капель содержатѣ въ себѣ почти цѣлой гранѣ опія, что весьма примѣчать должно при употребленіи сихъ капель.

Сии капли обыкновенно употребляются въ тѣхъ случаяхъ, когда больные бываютъ очень слабы и нестерпимыми свѣдаемыми болями. Даютъ ихъ отъ 10, 15, до 20 и до 25 капель, накапавъ на сахаръ, или въ какихъ нибудь приличныхъ микстурахъ.

Lichen caninus лесій мохъ.

Сей мохъ употреблялъ Слоанъ и Меедъ отъ водяной боязни, по естъ отъ неистовства, причиненнаго угрызеніемъ бѣсенной собаки. Они смѣшивали его съ перцемъ, которому по справедливости все дѣйствіе приписывать должно. Впрочемъ для отвращенія сего непріязненнаго человѣчеству припадка сей мохъ употреблять можно.

Lichen islandicus исландской мохъ.

Сіе произведеніе природы содержитъ въ себѣ нипательную матерію, и много горькой матеріи. Что самымъ опытомъ подтверждается.

Сей мохъ можно и должно употреблять въ чахотныхъ лихорадкахъ, когда ослабнутъ силы и волоши тѣлесныя сдѣлаются дряблыми, также въ кровавомъ поносѣ, въ которомъ дол.

жис

жно возврашнть скаизъ, подмазывающую киш-
ки и укрѣпить волокны оныхъ.

Въ чахоткахъ должно брать сего моху одинъ
унцъ на одинъ фунтъ молока, варить оной,
продѣживать и употреблять по немногу нѣ-
сколько разъ въ день. Въ кровавомъ же поносѣ
въ одной только водѣ варить должно.

Употребляютъ еще вещество сіе и для разби-
тія закипѣлой крови и отъ кровохарканія.

Lignum campechense каилехское дерево.

Изъ новѣйшихъ наблюденій открывається,
что дерево сіе имѣетъ вяззательныя и припу-
пляющія оспроту силы и отъ прочихъ подо-
бнаго состоянія лекарствъ пѣмъ различается,
что оное ни весьма ѣстъ и раздражаетъ, ни
весьма горьчитъ и волнуетъ кровь.

Lignum Juniperi можжевельное дерево.

Сіе дерево очищаетъ кровь и производитъ или
гонитъ мочу. Смотри кровочистительные сорта
(*species purificantes*).

Lignum Guaiaci гволяковое дерево.

Сіе дерево называется еще и слященнымъ.

Оно имѣетъ разбивательное свойство и упо-
требляется въ Индіи въ леченіи любострастной
болѣзни. У насъ употребляется оное въ отварѣ
отъ глубоковкоренившейся любострастной болѣ-
зни,

ани, а особливо членосоставныхъ любострастныхъ болѣй.

Хорошо брать дерева сего четыре унца на четыре фунта воды, варить до тѣхъ поръ, пока останется половина воды, и употреблять теплой отваръ по утру и въ вечеру по нѣсколь- ку унцовъ, дабы такимъ образомъ произвести испарину. Ибо дерево сие въ жаркихъ странахъ для того употребляется, какъ нарочитое лекарство отъ любострастной болѣзни, что оно довольно производитъ потъ.

Оно также слабитъ и желудокъ, однако такое дѣйствіе онаго не столь полезно бываетъ, какъ произведеніе хорошей испарины.

Впрочемъ осторожно должно поступать при употребленіи сего дерева, для того, что оно есть весьма крѣпкое и раздражительное.

Lignum quassiae дерево квассіево.

Сие дерево утоляетъ гниль, разбиваетъ и крѣпитъ. Почему весьма полезно употреблять оно въ гнилыхъ лихорадкахъ и ломотныхъ болѣзняхъ; и поелику оно имѣетъ силу разбивать густоты; для того оно укрѣпляетъ чувствительныя жилы, однакожъ не мѣшаетъ и отдѣленіямъ, ниже горячитъ тѣло потому, что оно не имѣетъ въ составъ своемъ никакого тонкаго масла.

Его

Его варятъ нѣсколько золотниковъ въ одномъ фунтѣ воды, и всякой часъ даютъ по ложки, а иногда даютъ и до половины унца.

Linatura Martis **железные олилки.**

Железные олилки составляющъ весьма хорошее крѣпительное лекарство и употребляются для укрѣпленія желудка и кишекъ и другихъ частей тѣла. Даютъ оныхъ отъ десяти граней, до цѣлаго золотника всякой день.

Linimentum antispasmodicum **противо-
судорожная, утѣляющая то есть
судороги мазь.**

Мазь сію составляютъ такъ:

Возьми мази изъ большаго про- *RC. Ung. d. althea unc.*
сфирника составленной два *II.*
унца.

Камфоры.

Camphor.

В леутолипедныхъ Зидента-
мовыхъ капляхъ по одному зо-
лотнику.

Laud. liquid. Syd. aa.
dr. I.

Смѣшай и дай.

M. d.

Сія мазь весьма великое имѣетъ дѣйствіе въ утолненіи судорожныхъ въ кишкахъ движеній, помощію которыхъ не рѣдко отвратить можно воспаленіе въ оныхъ. Мазью сею должно всякой день нѣсколько разъ намазывать животъ и покрывать оной большою суконкою, большимъ то есть кускомъ сукна.

Liquamen Mirrhæ мирровой растворъ.

Его приготавливаютъ такъ:

Возьми мирровой гумми одинъ RC. Gum. myrrh. dr. I.
золотникъ.

Распусти съ доволнымъ ко-	Succ. vitel. ov. q. s.
личесствомъ лишнего желтка	sol. in
еѣ	

Водѣ бузиновыхъ цвѣтовъ,	Aqu. flor. sambuc.
взявъ оной унцѣвъ шесть.	unc. VI.

И дай для употребленія.	D. usui.
-------------------------	----------

Сіе лекарство укрѣпляетъ слабыя части тѣла, и съ великою пользою употребляется отъ глазныхъ болѣзней.

Liquor anodinus утолительныя капли.

Сіи капли состояются, когда самой крѣпкой винной спиртъ смѣшивается съ купоросною кислотою, каковое лекарство весьма много похваляетъ Галлеръ отъ судорожныхъ припадковъ, почему оно и получило имя Галлеровой кислоты, (acidum Halleri).

Ихъ даютъ всякой день нѣсколько разъ по десяти капель, растворивъ въ стаканѣ воды. Однако многіе изъ больныхъ не могутъ перенести сихъ капель, и принявши, извергаютъ оныя рвотою, либо чувствуютъ отъ того сильныя боли въ желудкѣ.

Еслили двоить сію микстуру; то отпутда получаютъ хуторосная наоз или винное ма-

сло (*parha vitrioli f. oleum vini*), которой дается по одной капли съ сахаромъ.

Естьли же опять растворить наеу сію въ нѣсколькихъ частяхъ виннаго снирта; то можно получить уполиительныя капли,, копорыхъ можно давать опѣ 10 до 15 капель опѣ судорожныхъ припадковъ.

Наконецъ естьли насытить сіи капли желѣзными частицами; то получить можно уполиительныя желѣзистыя капли, копорыя даются до 10 капель въ судорогахъ, опѣ слабости желудка происходящихъ.

Сіи желѣзистыя уполиительныя капли пригошовляются слѣдующимъ образомъ:

Берется чистое желѣзо и распускается въ двоеной соляной кислотѣ, послѣ выдвояется сей растворъ до сухости, а попомѣ умножается огонь до пѣхъ порѣ, пока наибольшая часть соли возгнанна будетъ, копорой послѣ берется одна часть и смѣшивается съ двумя частями купоросной наеы, копорую естьли болапѣ, то она вбираетъ въ себя желѣзо, а на днѣ оставляетъ соляную кислоту, съ копорой снимается наеа и сохраняется для употребленія.

Сія наеа, будучи насыщена желѣзными частицами, получаетъ золотой цвѣтъ, копорой она шеряетъ, естьли поставитъ ее на
солнце,

солнце, а вмѣсто онаго получаетъ бѣлой цвѣтъ: а еспѣли поставитъ оную въ тѣнь; то она опянь золотой получаетъ цвѣтъ.

По справедливости полезно употреблять сіе лекарство отъ судорогъ, слабости желудка причиняемыхъ, давая отъ 8 до 10 капель.

Капли сіи употребляются во всѣхъ судорожныхъ болѣзняхъ, какъ-то въ ипохондріи, истерикъ или мапочной болѣзни, рвошъ, безсонницъ, падучей болѣзни и коликъ. Впрочемъ многокровнымъ людямъ осторожно надлежитъ давать сіи минеральныя капли.

*Liquor cornu cervi succinatus янтарныя
оленья рога капли.*

Капли сіи суть не что иное, какъ средняя соль, которая состоитъ изъ летучей мочевой или щелочной соли оленья рога и янтарной кислоты; почему и не безполезно употреблять оныя отъ судорогъ, подагрическою матеріею производимыхъ. Даютъ ихъ отъ восьми до десяти капель.

Послику капли сіи производятъ еще и потъ; для того онѣ имѣютъ мѣсто и въ худыхъ или опасныхъ лихорадкахъ.

Liquor terræ foliatæ tartari калки или
 разтворъ виннокаменной листо-
 вой земли.

Существенная винного камня соль, или листо-
 вая винного камня земля приготавливается изъ
 щелочной распипельной поспоянной въ огнь соли
 и уксуса. Естли огуспить сѣ насыщенное
 смѣшеніе, то весьма много остается въ ономъ
 пригорѣлыхъ частей, которыя часто произво-
 дятъ жаръ. А чтобы опнять масляныя чашки-
 цы отъ соли; то должно много употребить ки-
 слоты для насыщенія щелочной соли. Почему
 лучше всегда за всякимъ разомъ сполько ще-
 лочной соли насыщать уксусомъ, сколько бу-
 дешъ поребно оной, и смѣшивать ее, смо-
 тря по обстоятельству съ другими лекар-
 ствами.

Сѣ лекарство имѣетъ силу разбивать густо-
 ты и прочія внутреннія засоренія, а наипаче
 завалы брижейныхъ желѣзъ. Слѣдующаго пред-
 писанія я всегда хорошее видѣлъ дѣйствіе:

Возьми чистой соли винного	RC. Sal. tart. depur. dr.
каменя одинъ золотникъ.	I.
Насыть оную виннымъ уксу-	Satur. c. ac. vin. de-
сомъ.	in adde:
Послѣ придай водныхъ Реве-	Tinctur. Rhabarbar,
невыхъ капель одинъ золот-	aquos. unc. I.
никъ.	
Руландовой благословенной во-	Aq. bened. R. dr. I
ды или Руландова рвотнаго	
вина одинъ золотникъ.	
Смѣшай и дай.	M. d.

Сей растворъ молодымъ дѣтямъ сначала дается по 20 капель всякой день, а послѣ мало по малу умножается приемъ. Но и рослыхъ людяхъ сіе лекарство весьма великую пользу приноситъ можетъ.

Ежели сію соль насытитъ лимоннымъ сокомъ; то она не только бываетъ весьма хорошимъ прохладительнымъ лекарствомъ, въ желчныхъ лихорадкахъ употребляемымъ, но и самую желчь разводитъ и дѣлаетъ ее удобною къ испражненію. Въ семъ случаѣ я поступаю слѣдующимъ образомъ:

Возьми соли виннаго камня три RC. Sal. tart. dr. III.

золотника.

Насыть оную лимоннымъ сокомъ.

Satur. cum succ. citr.

Послѣ придай сиропа изъ лимоннаго соку одинъ унцѣ.

Adde syrop. d. acetos. citr. unc. I.

Благословенной Руляндовой воды одинъ золотникъ.

Aq. benedict. Ruland dr. I.

Смѣшай и дай, запечатавши.

M. d. f.

Сего лекарства должно давать всякой часъ по столовой ложки.

М.

Magisterium saturni свинцовой осажденной порошокъ, свинцесая известь.

Приготовляется оной изъ свинцоваго экстракта чрезъ осадку, посредствомъ воды учиненную, и хорошую перемывку.

Сей составъ есть лучший и безопаснѣйшій экстракта свинцоваго, потому что сей порошокъ, будучи хорошо перемѣшанъ, не имѣетъ въ себѣ той купоросной кислоты, которая по справедливости бываетъ помѣхою хорошему дѣйствію свинца.

Порошокъ сей есть весьма хорошее снаружи лекарство отъ лепучаго огня и другихъ кожныхъ припадковъ. Въ какомъ случаѣ можно смѣшивать оной либо съ перегнатою какою водою, на примѣръ розевою, либо съ личнымъ масломъ (*oleum ovorum*).

Magnesia salis feidlicensis магнезія седлицкой соли.

Для избѣжанія того, чтобы не почестъ за одно сего марганца съ марганцомъ или магнезією селипреною, которая по справедливости есть не дѣйствительное лекарство, называется еще солкою землею или магнезією морской или поваренной соли (*terra muriatica, magnesia muriatica*), потому что она содержитъ въ себѣ въ довольнономъ количествѣ соляную кислоту, и готовится чрезъ осадку обыкновенной соли.

Она есть не что иное, какъ всасывательная земля, которая тѣмъ особливую заслуживаетъ похвалу, что весьма скоро и легко распускается, и, соединившись съ кислотами, составляетъ среднія удобораспускаемыя соли, чего надъ другихъ

гими всасывательными землями не примѣчается. Однако не должно приготавливать оной по средству жженія, для того, что она такимъ образомъ теряетъ свою распускаемость.

Ея можно давать одной отъ десяти до двадцати грановъ.

Если употребить ее въ большемъ количествѣ; то она слабитъ желудокъ, наипаче, когда будетъ находиться кислота на первыхъ путяхъ по большей же части смѣшивающъ оную съ другими лекарствами. Смотри *холодильную микстуру и разбивательной порошокъ* (*mixtura refrigerans et pulvis Epergasticus*).

Маппа манна.

Манна составляетъ легкое, уполяющее жаръ, слабительное лекарство, которую надлежитъ давать наипаче чувствительного и сухого сложения людямъ и малымъ дѣтямъ. Младенцамъ можно давать пополунца и больше манны, а взрослымъ и возмужалымъ людямъ до нѣсколькихъ унцовъ безопасно давать можно.

Mel медъ.

Медъ есть существо густоватое, мыльного свойства, состоящее изъ горячаго начала, кислоты и склизкихъ или густыхъ сочныхъ частей, почему имѣетъ силу разбивать, и по причинѣ большого количества масляныхъ, нахо-

дящихся въ немъ частей, какъ - то уже о семъ въ опредѣленіи упомянуто, нѣкоторымъ образомъ горячить шло.

Онъ пособляетъ изверженію харкотины и очищенію легкаго, и поспѣшествуетъ испражненію желудка. Смотри простой уксусной медъ (*oximel simplex*).

Медъ и снаружи употреблятъ весьма полезно въ тѣхъ случаяхъ, когда предпринимается намятiе нарывы и вереды привести въ суппурацию; то есть произвести въ оныхъ гной и послѣ залечить оные.

Mercurius currens живое серебро или ртуть.

Чтобы ртуть учинить способною къ употребленію въ лекарства; то прежде должно праспворять оную. Въ противномъ случаѣ, когда то есть употребляется сырая не чистая ртуть, что прежде для разбитія заваловъ производимо было, можно ожидать худыхъ слѣдствій.

Говоря же вообще, надобно сказать, что ртуть есть нарочитое и надежнѣйшее лекарство отъ любострастной болезни, потому, что она непосредственно, а наипаче произведеніемъ слиношеченія дѣйствуетъ на ядъ сея болѣзни. Она также и въ соляныхъ растворахъ есть весьма хорошее разбивательное лекарство.

Mercurius dulcis *сладкая ртуть.*

Сія ртуть есть нечто иное, какъ возгонная или мореная ртуть либо сулема, простою напуральною ртутью насыщенная.

Еслили сіе насыщеніе нѣсколько разъ повторить и усовершенствовать оное посредствомъ нѣсколько разъ чинимой возгонки; то опшуда получается хорошей черной порошокъ, называемый *каломеласъ* или *панакель ртутная* (calomelas s. panacea mercurialis), то есть лекарство отъ всѣхъ болѣзней, худою матеріею причиняемыхъ.

Каломеласъ или панакель тѣмъ различествуетъ отъ услажденной ртуты, что сія ртуть есть нѣсколько острѣе и проникательнѣе по причинѣ не совершеннаго припудления тѣхъ сулемныхъ частицъ, посредствомъ насыщенія ординарной ртуты; напротивъ каломеласъ тѣмъ нѣжнѣе бываетъ, чемъ больше возгоняемъ бываетъ, такъ что онъ теряетъ наконецъ свои силы и становится хорошимъ испариногонительнымъ лекарствомъ. Однако въ любострастныхъ болѣзняхъ, и въ тѣхъ случаяхъ, когда принимается намѣреніе разбить завалы или другія густыя и вязкія мокроты, услажденная ртуть гораздо дѣйствительнѣе бываетъ, нежели каломеласъ.

Услажденную ртуть обыкновенно употребляють въ любострастныхъ болѣзняхъ, и въ пѣхъ случаяхъ, въ коихъ другихъ больше ѣдкихъ лекарствъ по причинѣ слабости въ груди и оспрошны влагъ употреблять не можно.

При употребленіи сего лекарства надобно всегда смотрѣть, чтобы оно не слабило желудка. Ибо то совѣмъ есть инаго состоянія дѣло, когда его нарочно употребляютъ для ослабленія желудка. *Смотри проносныя ртутныя лилюи (pilulæ purgantes mercuriales).*

Въ семъ случаѣ весьма хорошо смѣшивать оную съ сахаромъ, или еще лучше съ Гишпанскимъ мыломъ, и такимъ образомъ составлять каплишки. *Смотри проносныя ртутныя лилюи (pilulæ purg. mercur.)*

Услажденная ртуть также имѣетъ хорошее дѣйствіе въ членосоставныхъ боляхъ и завалахъ, въ какихъ случаяхъ полезно смѣшивать оную съ другими лекарствами. *Смотри разбивательныя лилюи (pilulæ resolventes).*

Впрочемъ надлежитъ твердо знать, что ртуть, по причинѣ чрезвычайной ея разбивательной силы, не должно употреблять въ гнилыхъ болѣзняхъ, въ коихъ она, на примѣръ въ цынгошной болѣзни, великой причиняетъ вредъ, исключая лихорадочную порчу или гниль во влагахъ.

Одна-

Однако каломеласъ не бесполезно употреблять въ гнилой жабѣ, наипаче, естли оный скорое причинишъ слинопеченіе, съ чемъ однакожъ весьма осторожно надлежитъ поступать, и предоставлять дѣло сіе однимъ довольно въ всемъ искусившимся врачамъ.

По моему сужденію не неприлично кажется напирать наакеею въ ротъ, потому что въ семъ случаѣ и въ семъ мѣстѣ какъ наискорѣе должно производить слинопеченіе. Впрочемъ я искусомъ научился, что употребленіе сего лекарства въ четверодневныхъ упорныхъ лихорадкахъ весьма великую приносишъ пользу.

Mercurius guttifer камедная или растворенная въ камеди ртуть.

Сей растворъ по имени изобрѣтателя своего Пленка, называется *пл-иковымъ растворомъ* (*solutio plensiana*).

Разтворъ сей есть нечто иное, какъ самая же ршущъ, раздѣленная на свои составныя части, однако въ свойствахъ своемъ неперемѣнная.

Его употребляютъ въ пѣхъ случаяхъ, въ коихъ не лзя давать больнымъ ѣдкихъ солей. Весьма также полезно употреблять оной отъ любострастныхъ глазныхъ болѣзней.

Приготавливается разтворъ сей изъ одной части ршущи, и трехъ частей Арапского клею или камеди, жъ копорому во время растиранія
ршущи

ртутни прибавляется нѣсколько цикорнаго сѣ ренемѣ приготоваеннаго сиропу.

Растворѣ сей либо одинѣ, либо разтворивши водою, либо смѣшавши сѣ мякишемѣ бѣлаго хлѣба и изѣ смѣшенія сего составивши пилюли, можно употреблять, по утру и вечеру по десяти грановѣ, которой пріемѣ, смотря по обстоятельству, естли по естѣ надобно будетѣ произвести слинопеченіе, можно нѣкопорымѣ образомѣ и умножитѣ.

Для полосканья вѣ ротѣ и другихѣ частяхѣ глѣла, и глазной примочки смѣшивается растворѣ сей сѣ теплымѣ молокомѣ.

Mercurius nitrosus ртутной селитреной растворѣ.

Сей растворѣ какѣ по причинѣ его ѣдкости и оспрошы, такѣ и по причинѣ разбивательной силы можно употреблять сѣ превеликою пользою вѣ застарѣлыхѣ любострастныхѣ, а наипаче вѣ костныхѣ болѣзняхѣ, и весьма нечистыхѣ невоздержною жизнію причиненныхѣ ранахѣ.

Сіе лекарство есть самое древнее. Оно составляеть сущность Харазіевыхѣ капель (ess. Charasii). жидкой ртутни по Парижскому предписанію приготоваемой, Беллоспивой жидкости, цитронной Парижской мази (ong. citrin. Parizienfis), и

ртут-

рпупнаго Беллетова сиропа (*sympus mercurialis Belleti*).

Хотя внутреннее лекарства сего употребленіе и не безопасно; однако я усмотрѣлъ изъ опытовъ, что оное безопасно, но только съ разумомъ употреблять можно, и что растворъ сей даже въ тѣхъ случаяхъ хорошее оказывалъ дѣйствіе, въ коихъ прочія лекарства оставались не дѣйствительными.

Отъ употребленія его я никогда не видѣлъ вреда, и я всегда предпочитаю его сулемѣ.

Сѣлипреную кислоту надлежитъ совершенно насыщать рпушю, почему и должно знать, сколько бы находились въ растворѣ семъ рпуши, когда таковъ растворъ часто не совершенъ бываетъ. Ибо естли въ одномъ унцѣ селипреной кислоты содержатъ два золотника и 40 грановъ рпуши; то содержаніе между ими будетъ такое, какъ 1 къ 3 и слѣдовательно въ трехъ граняхъ раствора содержится одинъ гранъ рпуши.

Въ семъ случаѣ съ начала можно давать по двѣ капли по утрамъ и ввечеру, распускивъ оныя въ довольномъ количествѣ воды. Причемъ должно замѣнить то, чтобы вода была перегнанна и чиста, иначе растворъ разрушиться можетъ. Естли же отъ употребленія сего раствора подымется рвога, или сдѣлается по-

поносъ ; по въ такомъ случаѣ надлежитъ давать по одной капли. Смотря же по обстоятельству, можно давать и по пяти капель, а когда растворъ сей не такъ сильно дѣйствовать будетъ на мочу, какъ на желудокъ ; то въ семъ случаѣ употреблять слабѣе растворъ.

Еслили растворъ сей распустишь въ довольно количествѣ воды ; то можно такимъ образомъ составить Фагеденскую то есть очищающую раны воду.

Растворъ сей, будучи смѣшанъ съ какимъ либо саломъ или шукотомъ, на примѣръ съ яичнымъ масломъ или куринымъ саломъ, составляетъ весьма хорошую мазь отъ упорной коросты.

Mercurius præcipitatus albus бѣлая осажденная ртуть.

Сей составъ получается, когда къ ртутному раствору примѣшаютъ соляной кислоты ; ибо въ такомъ случаѣ ртуть, соединившись съ соляною кислотою, опускается на одно въ видѣ извести, съ которою известью соляная кислота не весьма крѣпко соединяется, почему известь сія не есть чрезвычайно остра и ѣдка.

Ее употребляютъ только снаружи, и она въ семъ случаѣ составляетъ весьма хорошее лекарство отъ всякой сыпи на тѣлѣ, раскидывающихся

щихся ранъ и коросты, естли таковыя при-
падки происходить будущъ отъ золотушной
оспрошты. Смотри ртутную бѣлую мазь
(unguentum album mercuriale). При употребленіи сей
мази не худо употреблять репейной и пирейной
отвары (decoctum bardanæ et graminis).

**Mercurius præcipitatus ruber осажденная кра-
сная ртуть.**

Естли опивать растворъ отъ ртутти, рас-
пускающей оную; то на днѣ остается красная
известь, которую не справедливо называютъ
осадкою ртутти.

Употребляютъ известь сію только снаружи,
для очищенія золотушныхъ и любострастныхъ
ранъ. Смотри ртутную красную мазь (ung.
mercur. rubr.).

**Mercurius sublimatus возгонная ртуть или
сулема.**

Сія сулема состоитъ изъ ртутти и соляной
кислоты.

Растворъ сулемы въ легкомъ винномъ спиртѣ
называется по имени изобрѣтателя своего Фонъ-
Швипина Шейтенловыхъ спиртомъ (spiritus bi-
vietenii).

Растворъ сей употребляютъ въ любостраст-
ныхъ болѣзняхъ, что предоставляется однимъ
только знатымъ практикамъ во врачбной на-
укѣ. Mer-

*Mercurius tartarificatus тартаризованая , съ
виннымъ то есть камнемъ приго-
товленная ртуть.*

Сія ртуть въ любострастныхъ болѣзняхъ, и въ тѣхъ случаяхъ, когда влаги отдѣляются нѣкоторымъ образомъ оспры и ѣдки, каковы бываютъ въ скорбутѣ, часто приноситъ превеликую пользу.

Ее приготовляютъ, взявши одну часть ртутти, а двѣ виннаго камня, которыя весьма крѣпко распираетъ должно. Даютъ ее на одинъ пріемъ отъ пяти до десяти грановъ.

Но сіе лекарство бываетъ еще дѣйствительнѣе, естли одна превращенная ртуть распускается въ кислотѣ виннаго камня. Изъ сея ртутти и манны сосоставляются оныя споль превозносимыя *пилюли Кайсеріановы*, (*pillulae Kauserianae*).

Mixtura acida кислая микстура.

Микстура сія составляется слѣдующимъ образомъ:

Возьми масла бѣлаго купороса	℞. Ol. vitriol. alb. dr. I.
одинъ волошникъ.	
Перегнастой воды 20 унцовъ.	Aq. destil. unc. XX.
Простата уксуснаго меда честиры унцъ.	Oxum. simpl. unc. IV.
Смѣшай и дай.	M. d.

Сей микстуры даютъ въ гнилыхъ лихорадкахъ всякой часъ по два унцъ. Въ часоткѣ въ
мень-

меньшихъ приѣмахъ должно давать оную, и только по одному унцу всякіе два часа.

Mixtura diaphoretica микстура производящая испарину.

Ее приготавливаютъ такъ:

Возьми сурьмяной селитры, RC. Nitri antim. per. in-
черезъ сгущеніе приготовлен- spir. part. dr. II.
ной, два золотника.

Миндерева спирта чистые Spirit. Minder. unc.
унца. IV.

Воды бузины и дубовой по- Aq. flor. sambuc. unc.
семь унцовъ. VIII.

Смѣшай и дай. M. d.

Весьма полезно употреблять микстуру сію въ горячкахъ, гдѣ желантельно бываетъ произвести легкую испарину и учинить прохлажденіе въ тѣлѣ.

Даютъ оную всякой часъ по одному унцу. А еслии находятся вмѣстѣ и воспалительные какіе либо застои, то даютъ съ оною и камфору, либо распускаютъ камфору въ винномъ спиртѣ и примѣшиваютъ къ сей микстурѣ.

Сію микстуру можно простѣе сдѣлать слѣдующимъ образомъ:

Возьми сурьмяной селитры, черезъ RC. Nitri antim. per. in-
сгущеніе полученной, 1 унцъ. in spir. part. unc. I.

Распусти въ двухъ фунтахъ Salv. in aquae font.
ключевой воды. libr. II.

Послѣ придай съ довольномъ Dein adde camph. c.
количествомъ сахара 30 гранъ sach. q. scrup. I.
камфоры.

Смѣшай и дай. M. d.

Часть VII.

X

Упо-

Употребляется она выше сказаннымъ образомъ.

Mixtura refrigerans **холодильная микстура.**

Приготавливается такъ :

Возьми раковинъ, или раковыхъ	RC. Conch. f. lap. sanct.
жернововъ, либо Аглинской	f. magnes. puriat.
магнезию полуунца	unc. f.
Насыпь лимоннымъ сокомъ.	Satur. c. succ. citr.
Прибавивши мятной воды безъ	Aq. menth. f. v. unc.
вина приготовленной шесть	VI.
унцовъ.	
Сиропа изъ лимоннаго сока	Syr. acetos. citr. unc.
составленного одинъ унцъ.	I.
Смѣшай и дай.	M. d.

Еслили надобно будетъ уменьшить сильное движеніе крови въ больныхъ чувствительнаго сложенія и имѣющихъ наклонность къ судорогамъ; то должно давать сея микстуры, хорошенько взболтавши, по одному унцу всякой часъ. А еслили въ какихъ либо случаяхъ надобно будетъ беречься, чтобы не причинить какого либо раздраженія и самаго даже малѣйшаго испражненія; то должно употреблять раковыя жерновки; еслили надобно будетъ и слабить желудокъ; то лучше употреблять магнезію; по тому что она, какъ выше сказано, при описаніи магнезию, удобно соединяется съ кислотами и слегка слабитъ желудокъ.

Mix-

Mixtura resolvens разбивательная микстура.

Составъ оныя естъ слѣдующіи :

Возьми чистой нашатырной со. RC. Sal. ammon. depur. li.

Благословенной Руландовой воды, по два золотника.

Aq. benedict. R. aa dr. II.

Простого уксуснаго меда два унца.

Oxymel. simpl. unc. II.

Воды ромашковыхъ цвѣтковь 10 унцовъ.

Aq. flor. chamomil. unc. X.

Смѣшай и дай.

M. d.

Сію микстуру дають въ лихорадкахъ, когда надобно разбить упорные кровяные застои и завалы; дають же оной всякой часъ по одному унцу.

Простѣе можно составить сію микстуру слѣдующимъ образомъ:

Возьми чистой Аммоніачной со. RC. Sal. ammon. depur. li. полунца. unc. f.

Распусти въ ключевой водѣ, взявъ оныя 16 унцовъ.

Aq. font. unc. XVI.

Послѣ прибавь благословенной Руландовой воды полунца.

Dei adde aq. benedict. R. unc. f.

Смѣшай и дай.

M. d.

Употребляется микстура сія вышесказаннымъ образомъ.

Mixtura soluens разбивательная микстура.

Приготавливаютъ ее слѣдующимъ образомъ:

Возьми слабительной Глауберовой соли одинъ унцъ. RC. Sal. mirab. Glauber. unc. I.

X 2

Чи-

Чистой селитры одинъ зо- лотникъ.	Nitr. depur. dr. 1.
Воды ромашковыхъ цвѣтѣвъ, безъ вина приготовленной, шесть унцѣвъ.	Aq. flor. chamom. f. v. unc. VI.
Уксуснаго простаго меду одинъ унцъ.	Oxymel. f. unc. I.
Руландовой воды одинъ зо- лотникъ.	Ab. benedic. Rc. dr. 1.
Смѣшай и дай.	M. d.

Сія микстура, естли употреблять ее вся-
кой часѣ по одной ложкѣ или одному унцу,
разбиваетъ нечистоту, на первыхъ путяхъ на-
ходящуюся, и дѣлаетъ удобною къ испражненію,
послѣ которой можно или лучше сказать дол-
жно дать либо рвотное, либо проносное ле-
карство.

Простѣе составляется она слѣдующимъ
образомъ:

Возьми слабительной Глаубе- ровой соли.	Rc. Sal. mirab. Gl.
Чистой селитры по одному унцу.	Nitr. pur. aa unc. I.
Распусти въ двенадцати унцахъ ключевой воды.	Sol. in aq. font. unc. XVI.
Послѣ придай Руландовой воды полуунца.	Aq. benedic. Rul. unc. S.
Смѣшай и дай.	M. d.

Mixtura temperans утоляющая жаръ микстура.

Составъ сея микстуры есть слѣдующій:

Возьми чистой селитры.	Rc. Nitri depur.
Уксуснаго простаго меду по одному унцу.	Oxym. f. aa. unc. I.
	Воды

Воды ромашкоемъ цвѣтовъ, Aq. flor. chamom. ℥ v.
 безъ вина приготовленной, unc. VIII.
 восемь унцовъ.
 Смѣшай и дай. M. d.

Употребляютъ сію микстуру въ горячкахъ для утоленія жару. Довольно будетъ, еслии ее давати всякой часъ по одному унцу.

Простѣе готовится она слѣдующимъ образомъ :

Возьми числой селитры одинъ ℞. Nitri d. unc. I.
 унцъ.
 Распусти въ ключевой водѣ, Solv. in aq. font. unc.
 взявъ оныя двенадцать XII.
 унцовъ.
 Смѣшай и дай. M. d.

Даютъ оной всякой часъ по столовой ложкѣ.

Moschus мускусъ, кабарговая струя.

Мускусъ есть противосудорожное, уполяющее то есть судороги и укрѣпляющее нервы лекарство. Употребляютъ оной въ болѣзняхъ, отъ ослабленія жилъ происходящихъ. Однако оный, такъ какъ всѣ чадныя или угарныя лекарства, производитъ жаръ въ тѣлѣ.

Почему еслии употребляютъ оный въ тѣхъ случаяхъ, когда больные бываютъ очень чувствительны и раздражительны, также когда кровь въ сильномъ находится волненіи; то причиняетъ сильной жаръ, раздражая и умножая стремленіе крови.

Я также скрывать не могу и нехочу того, что
 я отъ употребленія мускуса въ лихорадкахъ,
 такъ называемыхъ *нервозныхъ*, отъ расслабленія
 то есть нервовъ происходящихъ и чрезвычай-
 ную слабость причиняющихъ, ни какой не видѣлъ
 пользы, хотя то и многія дѣйствія его въ
 такихъ обстоятельствеяхъ похваляютъ.

Впрочемъ полезно употреблять мускусъ отъ
 истерическихъ припадковъ, наипаче когда боль-
 ные не будутъ имѣть отвращенія къ оному.
 Сначала должно давать по нѣскольку грановъ, а
 послѣ можно учредить и по десяти грановъ на
 одинъ приемъ, смѣшавши съ бѣлымъ хорошо спер-
 шымъ сахаромъ.

N.

Nitrum antimoniatum сурьмяная се-
 литра.

Сія соль въ Аптекахъ готовится выпариваніемъ щелока, отъ перемывки испарину
 производящей сурьмы оставшагося, и кристалли-
 зованіемъ то есть посшавленіемъ къ мѣшу для
 осадки хрусталей.

Симъ образомъ содержащая въ щелокѣ селитра
 и съ купоросомъ смѣшанной винной камень (*tar-
 tarus vitriolatus*) составляютъ хрустали, и ни-
 какихъ не имѣютъ сурьмяныхъ частей, потому
 что

что оныя оснаются въ не садящемся хрустальными щелокъ.

Естьли же весь щелокъ сгущается; то бѣлая матерія, такъ называемая перловая, оснается въ ономъ, копорая пѣмъ дѣйствительнѣе бываетъ, когда, будучи растворена, удерживается щелочною солью.

Почему похваляемая мною сурьмяная селипра есть нечто иное, какъ та сурьмяная селипра, копорая чрезъ сгущеніе всего щелока приготавливается.

Сію такимъ образомъ приготовленную сурьму пѣмъ съ большимъ успѣхомъ давать должно въ воспалительныхъ лихорадкахъ, что она гораздо лучше разбиваетъ застои и производитъ испарину, нежели обыкновенная селипра. *Смотри потомую микстуру (mixture diaphoretica).*

Впрочемъ селипра сія по причинѣ сурьмяныхъ часпей въ ней содержимыхъ въ чувствительныхъ желудкахъ можетъ удобно производить рвогу. Почему сперва должно давать оную въ небольшомъ количествѣ, и умножать пріемъ поступательнымъ образомъ. Два золотника селипры сея можно растворить въ шести или восьми унцахъ воды, и давать раствора сего по одной ложкѣ всякой часъ, или всякіе два часа.

Естьли селитры сѣя не будетъ въ готовно-
сти; то вмѣсто оной можно давать не пере-
мытую испариногонительную сурьму, которая
отъ селитры тѣмъ только различествуетъ,
что содержишь въ себѣ гораздо болѣе сурьми-
ной извести, нежели селитра, слѣдственно и
давать должно оную гораздо въ меньшемъ ко-
личествѣ.

Наконецъ надобно замѣтить, что ее никогда
не должно давать съ распительными, изъ ра-
спѣвнѣй то есть получаемаыми, кислотами, по-
тому что она чрезъ соединеніе съ оными разру-
шается и теряетъ свою дѣйствительность.

Nitrum depuratum *перечищенная се-* *литра.*

Поселику сырая селитра всегда почти содер-
житъ въ себѣ обыкновенную соль; для того
она безъ перемывки для внутренняго употреб-
ленія почитай не годится, почему надлежитъ
всегда перемывать оную, и отдѣлять отъ соли,
каковое отдѣленіе посредствомъ одного раствора
и хрустализованія учинить можно.

Въ семъ хрустализованіи первые хрустали
всегда бываютъ очень чисты, потому что
обыкновенная соль остается въ щелокъ и развѣ
наконецъ садится хрусталями.

Почему естѣли желательнѣе получить чистую селитру; то вдругѣ должно вынимать первые хрустали; ибо естѣли щелокѣ, изѣ котораго уже нѣ-которая часть селитры отдѣлилась хрусталами, опять станешѣ варить и поставишѣ къ мѣсту для осадки хрусталей; то соляные хрустали удобно соединятся съ селитрою.

Перечищенная селитра при раствореніи своемѣ въ водѣ производитѣ спужу. Слѣдственно естѣли принять селитру нерастворенную въ водѣ; то она раждаетѣ холодѣ въ желудкѣ, и въ семѣ самомѣ случаѣ получаетѣ имя совершенно холоднѣтельнаго лекарства.

А какѣ паковыя частныя прохладженія въ мѣлкихѣ сосудахѣ застои, а въ чувствительныхѣ желудкахѣ рвоту или тошноту раждаютѣ; для того лучше всегда растворяетѣ оную и послѣ, гдѣ поспѣбно, давать больнымѣ. Смѣтри утѣляющую жарѣ микстуру (*mixtura temperans*).

Кромѣ сего свойства селитра имѣетѣ еще разбивательную и весьма проникательную силу, наипаче, естѣли можно давать оную въ обыкновенномѣ питъѣ. Поелику же жарѣ въ воспали-тельныхѣ лихорадкахѣ всегда естѣ слѣдствіемѣ раздраженія, и происходящихѣ опшуда пасоко-кровяныхѣ застоевѣ; для того селитра, испре-бляя запоры и застои и поспѣшествуя изверже-

нію вонѣ по мочею, по потомѣ матеріи, причиняющей раздраженіе, уменьшаетъ и утоляетъ жаръ и такимъ образомъ называется жаръ утоляющимъ лекарствамъ.

Откуда видно, что селитру не бесполезно употреблять и въ сильныхъ простудахъ и ломотахъ.

Весьма полезно употреблять селитру, распустивши въ винномъ спиртѣ или другой какой либо благовонной водѣ опѣ долговременныхъ кровопеченій, приводящихъ больного въ слабость, которыя кровопеченія имѣютъ причину свою не что иное, какъ слабость сосудовъ въ тѣлѣ.

Чувствительнаго сложенія людямъ можно дать оной два золотника въ супки, которой приемъ и гораздо больше умножить можно, еслии требовать того будутъ обстоятельства или сильное воспаленіе.

О.

Oleum animale Dipelii животное масло

Дипеліево.

Сіе масло получается двоеніемъ изъ какого нибудь животнаго масла. На примѣръ: еслии взять конючее, изъ оленья рога полученное, ма-
сло.

ало, и перегоняетъ оное токмо одно; то сперва выходитъ нѣсколько спирта оленья рога, а послѣ последуетъ бѣлое масло весьма тонкое и проникательное, которое часто употребляютъ въ лихорадкахъ, такъ называемыхъ *нервозныхъ* или въ *чувственныхъ* жилахъ. Сначала должно давать нѣсколько капель, а послѣ, умножая постепенно пріемъ, и поприщипавъ давать можно.

Oleum anifi анисное масло.

Еслили потребно будетъ когда либо давать проносныя лекарства такого сложенія людемъ, у коихъ кишки весьма суть нѣжны и раздражительны, такъ что даже отъ слабаго проноснаго лекарства удобно судороги произойти могутъ; то въ такомъ случаѣ всегда должно примѣшивать къ проноснымъ лекарствамъ не много аниснаго масла, такъ какъ уполяющаго судороги вещества, отвращающаго раздраженіе и однако не мѣшающаго дѣйствию проноснаго лекарства.

Масло сіе производитъ и потъ; слѣдственно для сихъ двухъ его дѣйствій можно давать оное такъ какъ нарочитое лекарство отъ отравы, еслили бы на примѣръ кто оправился какимъ нибудь ядомъ. Даютъ его отъ одной, до 30 капель на одинъ пріемъ.

Ole-

Oleum caryophyllorum **звездичное масло.**

Масло сіе одно, или будучи смѣшанно съ жоричневымъ масломъ, и приложенное къ большому гнилому зубу, уполяетъ иногда самую жестокую боль, опивающую спокойствіе у человека.

Oleum chamomillæ destillatum **перезнатое или двоенное ромашковое масло.**

Изъ сего масла готовится масленой сахаръ (*oleosacharum*), который составляетъ хорошее уполяющее судороги, и разбивающее вѣтры лекарство. то есть накапывается нѣсколько капель на сахаръ и весьма крѣпко смѣшивается съ онымъ, которой сахаръ часто придается къ другимъ лекарствамъ.

Oleum fœniculi **масло волоскаго укрола.**

Еслили масло сіе смѣшать съ сахаромъ; то оно составляетъ весьма хорошее, разбивающее вѣтры, лекарство. *Смотри разбивательный порошокъ.*

Oleum baccarum Juniperi **масло можже-
беловыхъ ягодъ.**

Поелику масло сіе имѣетъ силу разбивать и поощрять; для того намазываютъ онымъ обдержимыя параличемъ части и такимъ образомъ поль-

пользуютъ оныя. *Смотри мазь укрѣпляющую нервы (unguentum nervinum).*

Можно также съ пользою примѣшивать масло сіе и къ мочегонительнымъ лекарствомъ употребляемымъ въ водяныхъ болѣзняхъ.

Oleum lauri baccarum destillatum перегнатое изъ лавровыхъ ягодъ масло, обыкновенно бобковымъ называемое.

Лавровыя ягоды приносили всегда великую пользу въ леченіи коросты. Почему и приготовленное изъ оныхъ масло можно примѣшивать къ мазямъ, пользующимъ коросту. *Смотри мазь отъ коросты (unguentum ad scabiem).*

Oleum menthae destillatum перегнатое мятное масло.

Масло сіе, будучи снаружи употреблено, укрѣпляетъ слабыя части. О чемъ смотри мазь, укрѣпляющую нервы, (ung. nervinum).

Oleum millefolii масло дикой гречухи.

Масло сіе я употребляю съ превеликою пользою въ нѣкоторыхъ почечуйныхъ припадкахъ.

Еслили будетъ чрезвычайно печь почечуй; то въ семъ случаѣ масляной сахаръ дикой гречухи, то есть масло оной смѣшанное съ сахаромъ

ромъ и кислотою виннаго камня весьма великую приноситъ пользу.

Oleum petrae каменное масло.

Сіе масло весьма хорошо пользуется приморозенныя жестокою стужею части шѣла.

Oleum ricini масло дивнаго дерева.

Сіе масло въ Англіи извѣстно естъ подъ именемъ (cassia-oil). Оно называется еще масломъ крыжовниковымъ. Достається же оно изъ сѣменъ обыкновеннаго дивнаго дерева. Сіе масло въ судорожной коликѣ или свинцовыми часпицами причиненной (in colica saturnina), пакже въ одышкѣ, отъ свинцовыхъ испареній произшедшей, будучи употреблено отъ нѣсколькихъ золотниковъ, до нѣсколькихъ унцовъ, превеликую приноситъ пользу, послабляя желудокъ, и однако не причиняя новыхъ спазмовъ или судорогъ.

Впрочемъ надобно смотрѣть, чѣобы вмѣсто масла сего не дано было изъ аптеки другое какое либо гораздо крѣпче сего масла, которое въ семъ случаѣ опасныя можетъ причинить слѣдствія.

Между шѣмъ и то надобно знать, чѣобы масло сіе было выжимаемо изъ чистыхъ сѣмянъ, съ которыми ни мало не было бы смѣшено корки сего дерева, которая естъ очень остра и ѣдка.

Oleum

*Oleum terebinthinae скилидаръ, или терпенти-
нное масло.*

Сіе масло весьма сильно гонитъ мочу, почему весьма полезно употреблять оное въ долговременной и застарѣлой ломощѣ. Его должно давать съ начала по нѣскольку капель, растворявъ въ довольномъ количествѣ воды, и, смотря по обстоятельствамъ, умножать пріемъ.

Естли его соединить съ виннымъ масломъ; то пользуетсяъ обдержимыя параличемъ части.

*Orium олій или сгущенной сокъ изъ зе-
леныхъ маковыхъ головокъ.*

Опій есть самое сильное проливосудорожное лекарство, почему надобно употреблять оной какъ во всѣхъ шѣхъ судорогахъ и дерготахъ, которыя отъ особливаго расположенія къ дерготамъ и чрезвычайнаго раздраженія происходяшъ, такъ и тогда, когда надобно будетъ до шѣхъ поръ уполяшъ раздражающую чувствительной составъ и причиняющую судороги матерію, пока не уймутся судороги. Въ первомъ случаѣ опій получаетъ имя собственно уполяющаго судороги лекарства, а во второмъ пошому единственно, что оной разбиваетъ густоту и опвращаетъ воспаление, для того что уполяетъ раздраженіе и слѣдственно уменьшаетъ наклонность къ воспаленію и доставляетъ наконецъ прежнее влагамъ кругопеченіе. Опій также имѣетъ

имѣетъ и горячительную силу, въ разсужденіи которой можно назвать опій и крѣпительнымъ лекарствомъ. Но чтобы опій уполялъ любо-страстной ядъ, сего утвердить никакъ не можно.

Впрочемъ въ золотушныхъ застояхъ и тѣхъ болѣзняхъ, которыя происходятъ отъ ломотной матери, опій не бесполезно употреблять можно. Потому что опій въ семъ разу размягчаетъ и расслабляетъ сосуды и тѣмъ самымъ способствуетъ къ разбитію оспры и учиненію оной способною къ изстребленію изъ тѣла.

Осторожности, какія должно наблюдать при употребленіи опія, сущъ ниже слѣдующія:

1) Не должно употреблять опія очень часто и при всякихъ встрѣчающихся припадкахъ, потому что опій дѣйствуетъ всегда только уполятельнымъ образомъ, а не лечительнымъ, слѣдственно всегда оставляетъ послѣ употребленія своего слабость въ тѣлѣ, и натура мало по малу привыкаетъ къ оному. Въ нашей больницѣ находится нѣкоторая женщина, страдающая судорожными припадками, которой опій ея припадковъ всякой день приписывается для охраненія ея до двухъ унцовъ опіяна.

2) Если въ какихъ либо случаяхъ не бываетъ необходимости въ укрѣпленіи и произведеніи

деніи теплоты въ тѣлѣ; тогда должно давать опій одинѣ и въ большемъ количествѣ, на примѣрѣ въ уполеніи судорогъ, происходящихъ отъ воспалительныхъ скопленій крови.

3) Еслии въ комѣ примѣчана будетъ наклонность къ воспаленію; то въ такомъ случаѣ чрезъ все теченіе болѣзни надлежитъ употреблять лекарства, уполяющія жаръ и отвращающія воспаление, и вмѣстѣ желудокъ сохранять свободнымъ.

4) Пріемъ опія учреждается взглядомъ различныхъ сложений и того, какую имѣетъ больной привычку къ опію. Въ острыхъ лихорадкахъ можно давать четвертую часть грана опія нѣсколько разъ въ день, а въ нервзныхъ лихорадкахъ мало по малу отъ 10 до 12 грановъ пріемъ умножать можно. Весьма хорошо давать оной въ порошокъ, когда смотря по обстоятельствамъ основаніемъ пріема можно брать либо селитру, либо сахаръ.

5) Въ сильныхъ судорогахъ съ самаго начала приступа оныхъ надлежитъ давать опій въ надлежащемъ количествѣ, потому что противосудорожная сила и дѣйствіе опія очевидными становящися развѣ послѣ оказанія его силы горячащей и раздражающей.

6) Вообще не должно давать опія тогда, когда болѣзнь требуетъ пособія перелому своему хо-

шими самая природы силами. Ибо въ семъ случаѣ опій сокращаетъ и усыпляетъ оныя силы и оставляетъ по себѣ слабость. Въ судорожныхъ припадкахъ острыхъ болѣзней, въ коихъ вся надежда излеченія зависитъ отъ изверженія болѣзненной матеріи чрезъ кожныя скважины, опій давать не совсемъ безопасно, а можетъ быть и весьма опасно.

Oxupel simplex уксусной простой медъ.

Сей составъ есть нечто иное, какъ растворъ меда въ винномъ уксусѣ, который имѣетъ разбавительную и уполяющую гніеніе силу, производитъ потъ и гонитъ мочу; почему микстура сія имѣетъ мѣсто въ воспалительныхъ, гнилыхъ и желчныхъ лихорадкахъ.

Сіе лекарство можно употреблять всякой день отъ двухъ, до четырехъ унцовъ, разведши въ какомъ либо питьѣ.

А естли при сихъ случаяхъ случится и запоръ у больного; то можно употреблять медъ сей въ промываніяхъ отъ трехъ до четырехъ унцовъ.

Oxupel scilliticum уксусной, съ морскимъ лукомъ приготовленной, медъ.

Сей медъ есть нечто иное, какъ медъ распущенной въ морсколуковомъ уксусѣ, которой состоитъ

составляетъ хорошее разбивательное и мочегонное лекарство.

Поселику лекарство сие удобно производитъ рвоту; для того при предписаніи онаго всегда на сие вниманіе имѣть должно.

Половина унца сего меда у взрослыхъ людей можетъ произвести рвоту. Смотри грудной разбивательной сиропъ (*syropus pectoralis resolvens*).

Р.

Pilulae antihystericae противогистерическія, отвращающія или утоляющія маточныя припадки, пилюли.

Сии пилюли составляются слѣдующимъ образомъ:

Возьми гумми галбана.

Чертова духа.

Дягилеваго экстракта.

Вобровой струи.

Шафрана по полуунца.

Овисскаго опія ползолотника.

Смѣшай и едѣлай съ каплями вобровой струи капышникъ въ-сомъ въ 2 грана, пересыпь порошкомъ соломянаго корня и дай.

RC. Gum. Galb.

Ailæ foetid.

Extract. angelic.

Essent. castor.

Crocī aa unc. sem.

Opii thebaic. dr. Sm.

M f. p. c. essent.

castor. pend. gr. II.

consperg. polv. liqui-

ritiæ. d.

Въ шести изъ сихъ пилюль содержится только одна четвертая часть грана опія.

Сии пилюли можно давать въ истерическихъ припадкахъ, то есть судорогахъ опъ пяти, до шести пилюль по утру и въ вечеру.

Pilulae balsamicae балзамическiя пилюли.

Составъ сихъ пилюль есть слѣдующiй:

Волны экстракта, сгущеннаго	RC. Extract. rad. helleb.
то есть сока изъ корня черной чемерицы.	nigr.
Чистаго сабура.	Aloes depur.
Желѣзистыхъ нашатырныхъ цвѣтовъ по полунца.	Flor. sal. ammon. martial.
	Aa unc. fm.
Восточнаго шафрана 2 золотника.	Croc. orient. dr. II.
Опiекаго опiя 20 гранъ.	Opii thebaic. gr. XX.
Смѣшай, сдѣлай съ ревеневыми каплями капышки вѣсомъ въ 2 грана.	M. f. p. c. eff. Rhubar. pond. gr. II.
Пересыпь порошкомъ садовниковаго корня, и дай.	Consper. pulv. lignir. d.

Сихъ пилюль можно давать опъ 8, до 12, припомъ ихъ тамъ токмо давать можно, гдѣ почечуй и мѣсячину безъ всякой опасности производить можно. Ежели же гдѣ либо сии капышки окажутся не довольны: то тамъ можно какъ надежнѣйшее средство употреблять лостойанный воздухъ (aer fixus).

Pilulae Hydragogae Janini бологонительныя пилюли Яниновы.

Приготавливаются капышки сии слѣдующимъ образомъ:

Возь-

Возьми Александрійскаго лисна RC. Fol. sen. unc. VI.

6 унцовъ.

Кремора виннаго камня 1
унцъ.

Вари въ двухъ жѣрахъ дожде-
вой воды, пока половина вы-
прѣетъ, послѣ придай къ ки-
пящему остатку.

Лиственной губки.

Скимонеи.

Корни бѣлаго ревеня.

Копытнаго ревеня.

Переступня.

Луковичной травы или Ири
по 3 золотника.

Корня повидишнихъ индѣй-
скихъ колоколчиковъ,

Желшой камеди.

Колоквиновыхъ лепешекъ.

Услажденной рпути.

Родиана виннаго камня по 1
унцу.

Пропускнаго желѣзнаго ша-
франа.

Перечищенной селитры по 4
унца.

Строрпушнаго порешка 2 ун-
ца.

Сабуровой смолы.

Яланповаго корня по 6 унцовъ.

Выпаривай все до тѣхъ поръ,
пока шапъ огустѣетъ, что
изъ него можно будетъ дѣ-
лать пилюли.

Crem. tart. unc. I.

Coq. in aqu. plev-
m. II. ad reman. di-
mid. quant. colat.
bullient. add.

Agarici.

Scammon.

Rad. mechoac.

Rhabarb.

Brjoniz.

Hermodact. aa unc.
III.

Rad. turpeth.

Gum. gut.

Trochis. A'hand.

Mercur. dolo.

Tart. emetic. aa unc.
I.

Croc. mart. aperient.

Nitr. pur. aa unc. IV.

Aethiop. mineral. unc
II.

Aloes.

Rad. Jalap. aa unc.
VI.

Evapor. ad conf. mass.
pil. ita ut pil. conf.
queant.

Сии пилюли я употреблялъ съ превеликою
пользою въ водяной грудной болѣзни, и теперь

еще съ довольно хорошимъ успѣхомъ употре-
бляю.

Въ семъ споль рѣдкомъ и споль несоразмѣр-
номъ смѣшеніи я ничего перемѣнить не смѣю.

Pilulae purgantes проносныя пилюли.

Ихъ составляютъ такъ:

Возьми Ялапповой смолы.	RC. Resin. Jalapp.
Усладженной пригошвленной рлупи.	Mercur. d. preparat.
Гишпавскаго мыла по под- золотника.	Sap. Hispanic. aa unc. ℥.
Смѣшай, сдѣлай съ ревеневы- ми каплями пилюли вѣсомъ въ 3 грана, пересыпь порош- комъ солодковаго корня, и дай.	M. f. c. ест. Rhabart. pond. gr. II. consperg. pulv. liquirit. d.

Даютъ ихъ на одинъ пріемъ по девяти кашы-
шекъ. Употребляются съ великою пользою во
всѣхъ тѣхъ долговременныхъ болѣзняхъ, гдѣ
потребно бываетъ слабленіе желудка.

Pilulae purgantes anthelminticae проносныя отъ глистовъ пилюли.

Сии пилюли приготовить можно слѣдующимъ
образомъ:

Возьми темнокрасной сабуровой смолы, Ялапповой смолы.	RC. Aloës Hepatic. refin. Jalapp.
Усладженной, пригошвленной рлупи по ползолотника.	Marc. d. preparat. aa unc. ℥m.
Смѣшай, сдѣлай съ ревеневы- ми каплями капляшки вѣсомъ въ два грана, пересыпь порош- комъ солодковаго корня, и дай.	M. f. c. ест. Rhabarb. pilul. p. gr. II. con- sperg. pulv. liqu. d.

Сии

Сии пилюли великое приносятъ пособіе отъ глистовъ круглыхъ и аскаридовъ или заднепродныхъ червей (*ascarides*), естли прежде употребленія оныхъ даватъ чрезъ иѣкоторое время противоглистной, ниже описанной порошокъ.

Даютъ ихъ на одинъ приѣмъ по восьми каптышковъ.

Pilulae resolventes разбивательныя каптышки.

Сихъ каптышковъ приуготовленіе естъ слѣдующее :

Возьми самородной Гваиковой	R. Gom. Gvaiaec. nativ.
гумии 1 унцѣ.	onc. I.
Чернаго или Гишпанскаго	Sap. Hispan. pnc. f.
мыла полунца.	
Услажденной приуготовлен-	
ной ршупи.	Mercur. d. pręparat.
Суржовой сѣры шрестіей осад-	
ка.	Sulphur. antim. tert-
	rięcip.
Порошка изъ корня сенегги	Pulv. rad. seneg.
или травы называемой, ишодъ.	
Камфоры 1 золотникъ.	Camphor. aa dr. I.
Смѣшай, сдѣлай съ жорско-	M. f. eff. acet. scillit.
луковымъ уксуомъ каптышки	pond. dr. II. con-
иѣсомъ въ 2 грана, пересыпъ	sperg. pulv. liq. d.
порошкомъ солодковаго корня	
и дай.	

Семь или восемь изъ сихъ каптышковъ содержатъ въ себѣ одинъ гранъ ршупи, на что въ предписанціи приѣмовъ вниманіе имѣть должно.

Сіи пилюли въ закоренѣлыхъ, членосоставныхъ боляхъ и завалахъ въ желѣзахъ весьма великое приносятъ пособіе, наипаче, когда по утрамъ и вечерамъ употребляемъ будетъ и крѣпкой отваръ гваяковаго или бакауповаго дерева.

Potio alexipharmaca prima первое противогнилное, или противоядное питье.

Питье сіе составляется такимъ образомъ:

Возьми корня дягилеваго.

RC. Rad. angelic.

Мауноваго по 2 золотника.

Valerianæ dr. II.

Вари въ закупоренной посудѣ

Coqu. in vase clauso

съ водою бузиновыхъ цвѣтовъ.

cum. Aq. flor. sambuc. unc. VIII.

взявъ огня унцовъ 8.

Colat. adde mixtur

Послѣ прецѣдивши, придай:

diaphoret. unc. IV.

Испарину производящей микстуры 4 унца.

Отдай для употребленія.

D. usui.

Сего питья даемъ мы теплаго всякой часъ по одному унцу въ лихорадкахъ и другихъ случаяхъ тогда, когда необходимость требуетъ споспѣшествованія изліянію пота и выступленію сыпи или пшенъ на тѣлѣ, равно какъ и тогда, когда должно имѣть вниманіе на воспалительные кровяные застои, и спржадущій весь составъ чувствительныхъ жилъ.

Potio alexipharmaca secunda другое такое же питье.

Приготовление его есть сіе:

Возьми капель дятливыхъ.	RC. Eff. angelic.
Мауновыхъ	Valerianæ.
Камфората виннаго спирта.	Sp. vin. camphor.
капель оленя рога съ дятли-	liq. l. e. succin. aa
ремъ приготовленныхъ по 1	dr. I.
золотнику.	
Самаго лучшаго Французскаго	Vin. Gallic. optim.
вина 6 унцовъ.	unc. VI.
Смѣшай и дай.	M. d.

Сие питье очень хорошо употреблять въ нервозныхъ лихорадкахъ, когда силы начнутъ ослабѣвать и ядъ дѣйствовать на весь ликъ чувствительныхъ жилъ. Даютъ его всякой часъ по столовой ложкѣ.

Кромѣ сего питье сие производитъ еще потъ и прохлаждаетъ или возстановляетъ сокрушенныя какъ плѣсныя, такъ и душевныя силы.

Впрочемъ замѣнить должно, что вмѣсто поманутыхъ капель, можно брать Безоардической уксусъ, что такимъ образомъ учинить можно:

Возьми соли виннаго камня хо-	RC. Sal. tart. bene prę-
рошо очищенной 2 золотника.	parat. dr. II.
Насынь оную Безоардическимъ	Satur. cum acet. Be-
илъ противояднымъ либо	zoard.
противогнилнымъ уксусомъ,	
Потѣ придай самаго лучшаго	Adm. vin. Gall. optim.
Французскаго вина 6 унцовъ.	unc. VI.
и дай.	D.

Употреблять должно такимъ образомъ, какъ первое питье.

**Potio alexipharmaca communis обыкновенное
противоядное питье.**

Сие питье составляется такъ:

Возьми корня дягилеваго.	RC. Rad. angelic.
Мауноваго.	Valerianæ. *
Красной перуанской корня по по 100 гранъ	Cort. peruv. rubr. aa unc. sm.
Вари въ 12 унцахъ ключевой воды	Coq. in aqu. font. libr. XII.
Послѣ процѣди и придай съ довольнымъ колич. своимъ са- мара камфоры 12 гранъ, и дай для употребленія.	Colat. adde camphor. s. f. q. sacchar. gr. XII. D. usui.

Употребляется такъ, какъ выше писанное
питие.

**Potio antilyssa противобѣшенное, утola-
ющее бѣшенство, питье.**

Пития сего приготовленіе естъ нижеслѣдую-
щее:

Возьми маскѣ числомъ 3.	RC. Scarab. mai. n. VII.
Андромахова верѣана полазолот- ники.	theriac. Andromach. unc. sem.
Летучей соли оденъ рога 3 гранъ.	Sal. volatil. s. s. dr. II.
Камфоры 1 золотникъ.	Camphor. dr. I.
Мидеререза спирта 3 унцовъ.	Spirit. Mind. unc. VIII.
Смѣшай и дай.	M. d.

Сія микстура въ одной водяной боязни весьма
хорошее имѣла дѣйствіе, когда я употреблялъ

~~самъ~~

Я вообще тогда ее употребляла и употребляю, когда примѣшы бывающъ, что сіе бѣшенство пользоваться должно произведеніемъ пота и точеніемъ мочи.

Potio laxans. слабительное питье.

Приготавливающъ его слѣдующимъ образомъ:

Возьми тамариндной кашицы 3	RC. Pulp. tamarind. unc.
унца.	III.
Самой лучшей манны 1 унцѣ.	Man. calabrin. unc. I.
Р-спусти въ водѣ ромашко-	Solve in aq. flor.
выхъ цвѣтовъ, взявъ оныхъ	chamom. unc. IX.
унцовъ 9.	
Процѣди и дай.	Col. d.

Или простѣе:

Возьми кремора виннаго камня 4	RC. Crem. tart. unc. IV.
унца.	
Самой лучшей манны 2 унца.	Man. calabrin. unc. II.
Ври въ кипяченой водѣ.	Coq. e.
Взявъ оныхъ унцовъ 18.	Aq. font. unc. XVIII.
Процѣди и дай.	Col. d.

Сіе питье предписывающъ для послабленія желудка.

Pulpa tamarindorum тамариндная кашка.

Сія кашка или сіе мясо тамариндовое составляющъ весьма хорошее слабительное, жаръ употребляющее, лекарство. *Смотри слабительное питье (potio laxans).* Небезполезно бы было здѣсь напоминать, что не должно давать оной вкупѣ съ средни-

ми солями, содержащими въ себѣ распителную кислошу, потому что оныя такимъ образомъ могутъ разрушаться. Такъ на примѣръ возрожденной винной камень (*tartarus tartarifatus*) разрушается тамариндною кашцею. Ибо ежели обѣ вещи сіи варить вкупѣ, а послѣ дать имъ опстояться, и наконецъ ихъ процѣдить; то по прошествіи нѣкотораго времени дѣлается въ щелокѣ густота, которая не что есть иное, какъ вновь произшедшей винной камень, каковое обстоятельство, еслии его не знатъ, удобно можетъ подать случай къ погрѣшностямъ.

Pulvis antelminticus порошокъ отъ глистовъ.

Сей порошокъ составляется такъ:

Возьми цыцварнаго сѣмени 2 RC. Sem. fanton. unc. II. унца.

Водянистаго экстракта перуанской корки.

Extr. cort. per. aq. oof.

Чистаго зеленого купороса по 3 водопицу.

Vitriol. m. rag. aa dr. I.

Смѣшай, сѣлай порошокъ и дай.

M. f. p. d.

Сего порошка можно давать отъ 20 до 40 грановъ всякой день.

Для младенцевъ можно составить изъ онаго кашиду, смѣшавъ порошокъ съ небольшимъ количествомъ меду. Еслии сей порошокъ будетъ употребленъ нѣсколько уже времени; то послѣ

над-

надлежитъ даватьъ для очищенія желудка и кишекъ вышеписанныя пропивоглистныя кашышки (*pilulae anthelminticae*), которыя для малыхъ дѣтей можно разпускать въ какомъ нибудь сокѣ, либо давать въ изюмѣ или грушахъ.

*Pulvis antifebrilis порошокъ отъ
лихорадки.*

Порошокъ сей должно составлять по сему предписанію :

Възми порошка изъ Перуанской корки 20 гранъ.	RC. Pulv. cort. Peruan. gr. XX.
Желѣзистыхъ цвѣтовъ, наизырной соли 2 грана.	Floc. f. ammon. mart. gr. II.
Смѣшай и сдѣлай порошокъ.	M. f. p.

Сей порошокъ давать можно четыре или пять разъ въ день, въ то время, когда послѣ долговременнаго употребленія сурьмяной сѣры еще опасность бываетъ, чтобы не воспослѣдовали запоры и завалы во внутренностяхъ, и при чрезвычайной раздражительности или чувствительности находящейся вмѣстѣ и слабости въ тѣлѣ. что обыкновенно исполняется въ упорныхъ перемѣжающихся ежедневныхъ и четверодневныхъ лихорадкахъ.

*Pulvis Eosphrasticus раздралятельный
или разбивательный порошокъ.*

Приготавливаютъ порошокъ сей такимъ образомъ :

Возь-

Возьми облыной магнетит.

RC. Magnes. muriat.

Кремера винного камня.

Crem. tart.

Стрымхъ цвѣтовъ.

Flor. sulphur.

Порошка изъ ревеня.

Polv. rhabarb.

Ромашковыхъ цвѣтовъ.

Flor. cham. vulg.

Масленнаго сахара, Волоскаго

Elæofahar. Foenicul.

укропа, по ползолотника.

aa unc. fm.

Смѣшай, сдѣлай порошокъ и дай.

M. f. p. d.

Сей порошокъ весьма полезно употреблять въ завалахъ и слабости во внутреннихностяхъ, а наипаче, когда находится будеть и многокровіе въ чревѣ. Дается онаго нѣсколько разъ въ день по чайной ложкѣ.

Сей порошокъ также поспѣшествуетъ и геморройному печенію: опіикуда видно, что его тогда нѣсколько давать должно, когда опіѣ печенія геморройнаго можно ожидать какой либо пользы.

Pulvis pectoralis грудной порошокъ.

Составъ сего порошка есть сей:

Возьми порошка цвѣтовъ бараньей травы.

RC. Polv. flor. arnic.

Сурьмкой селитры чрезъ стуженіе приготовленной по 1 унцу.

Nitr. antim. per infus. parat. aa unc. I.

Опійскаго опія 4 грана.

Opii thebaic. gr. IV.

Камфоры 10 грановъ.

Camphor. gr. X.

Смѣшай, сдѣлай порошокъ и дай.

M. f. p. d.

Сей порошокъ съ великою пользою употреблять можно въ начинающейся чахоткѣ, въ то время,

время, когда будутъ примѣтны знаки наклонности къ кровавымъ застоямъ въ груди.

Даютъ, или давать можно порошка сего всякой день нѣсколько разъ по чайной ложкѣ. Но еслили бы случилось, что сей порошокъ подымать будетъ рвоту, то въ такомъ случаѣ надлежитъ примѣшивая къ оному не много порошка изъ салодковаго корня.

R.

Radix altheae корень большаго проскурняка.

Сей корень содержитъ въ себѣ густую слизи подобную матерію, которую снаружи употребляютъ такъ, какъ изрядное смягчительное лекарство. *Смотри травы для припарокъ, также мазь проскурняковую (species pro Cataplasmate et unguentum de althea).*

Radix angelicae дягилевой корень.

Сей корень, которой въ Лапоніи употребляютъ вмѣсто пищи, принадлежитъ къ пропивояднымъ и пропивогнильнымъ лекарствамъ и есть самое лучшее изъ всѣхъ шаковаго же рода лекарствъ. *Смотри противоядное питье (potio alexipharmaca).*

Бстѣ.

Естьли кто хочетъ употреблять порошокъ изъ сего корня, тошъ можетъ принимать самъ, или другимъ давать нѣсколько разъ въ день отъ 10 до 20 грановъ.

Radix apii селлерейной корень

Сіе растѣніе находится во всѣхъ частяхъ свѣта; будучи употребляемъ въ кушаньи, хорошо исправляетъ скорбутную кровь и слегда производитъ мочу.

Radix armoraciae хрѣновой корень.

Сей корень составляетъ весьма хорошее противодыгонное лекарство, которой употребляется такъ, какъ пища въ истощенномъ худокровосочномъ и скорбутномъ состояніи влагъ.

Radix belladonae корень бѣшенной вишни или блекоты.

Корень сего былія поелику есть крѣпче и дѣйствительнѣе самыхъ листовъ; для того надлежитъ давать оной въ меньшемъ количествѣ, однако такимъ образомъ, чтобы оной производилъ потъ.

Отваръ корня сего такъ, какъ и листовъ травы сея можно употреблять въ леченіи рака, которымъ иногда сія жестокая болѣзнь пользована была и быть можетъ. Однако присемъ весьма осторожно поступать надлежитъ пому,
кто

кто употреблять захочетъ сіе растѣніе, то нехудо послѣдовать въ семъ случаѣ господину Юнкеру, который давалъ отваръ, мало по малу умножая приѣмъ, пока сонъ возпослѣдовалъ, послѣ чего также мало по малу уменьшалъ приѣмъ же приѣмъ, и такимъ образомъ выпользовалъ двухъ женыщинъ отвъ помянутой болѣзни.

Radix culumbo корень колумбо.

Корень сей есть весьма горькой, котораго горькость есть гораздо прѣнѣе или ароматнѣе, нежели Квассіева, однако гораздо меньше горячѣе, нежели горькость квассіеваго дерева.

Отваръ сего корня, котораго сначала берется половина унца на девять унцовъ воды, и варится до тѣхъ поръ, пока останеся отвара унцовъ шесть, употребляется отвъ слабости желудка и кишекъ, которую онъ дѣйствительно пользоваться можетъ, развѣ слабость сія происходитъ отвъ неизлѣчимыхъ заваловъ во внутренностяхъ. Употребляется отваръ сей всякой часъ по столовой ложкѣ. Предписываютъ оной и въ кровавомъ поносѣ, съ чемъ однакожъ оспорожно поступать должно.

Radix consolidae Majoris корень лошакова уха или целительной травы.

Сей корень содержишь въ себѣ сладковатое склизистое существо; почему можетъ пользоваться наружныя ранки.

Radix gentianæ rubræ корень красной
стародубки.

Сей корень составляетъ горькое крѣпительное лекарство. См. три экстрактъ красной Генцианы или стародубки (*extractum gentianæ rubræ*).

Radix graminis лирейной корень.

Сей корень почти такое же имѣетъ свойство и пользу, какъ и сарсапариллѣ, исключая то его преимущество, что онъ гораздо дешевле, нежели сарсапариллѣ. Отваръ изъ онаго и экстрактъ или сгущенной сокъ суть весьма хорошія кровочистительныя лекарства.

Radix hellebori nigri корень черной
чемсрицы.

Еслили въ какомъ либо случаѣ требуетъ необходимость произвести кровотечение, то въ такомъ случаѣ весьма полезно употреблять сей корень. Сей корень составляетъ большую часть Бакиніанскихъ отъ водяной болѣзни лилюль. Смотри экстрактъ изъ сего корня и бальзамическія лилюли (*extract. hellebor. nigr. et pilul. balsamicæ*).

Еслили давать корень сей въ порошокъ вкупѣ съ опиѣмъ, то оной точно такое же имѣетъ дѣйствіе, какое и Доверовъ порошокъ (*pulvis Doveri*).

Radix

Radix Jalappae Ялалловой корень.

Изъ сего корня составляется всѣмъ извѣстное проносное лекарство, которое по большой части употребляемъ мы въ долговременныхъ брюшныхъ болѣзняхъ.

Изъ его также составляютъ весьма хорошее проптивоглистное лекарство, и даютъ въ лихорадкахъ, когда по требуетъ необходимость послабить желудокъ и шѣмъ очистить отъ нечистоты шѣло.

Предписываютъ его на одинъ пріемъ отъ 20 до 40 грановъ.

Малымъ дѣтямъ для очищенія груди отъ мокроты, причиняющей кашель и удушье, совѣтуетъ Г. Шульцъ, послѣдуя Веделю, давать порошки изъ корня сего вкупѣ съ кинноварью, взявъ перваго грановъ 4, а кинновари грановъ 2 на одинъ пріемъ.

Radix Ipecacuanhæ Илекауанской или рвотной корень.

Какъ всѣ прочія рвотныя лекарства, будучи даваемы въ меньшемъ количествѣ, имѣютъ разбивательную силу, такъ и сей корень подобное производитъ дѣйствіе.

Кромѣ того корень сей имѣетъ еще силу утолять судороги, почему въ удушливой

одышкѣ и другихъ судорожныхъ болѣзняхъ, наипаче, когда вмѣстѣ и завалы находишься будуще, сей корень предписывать можно.

Въ чувствительножилыхъ болѣзняхъ часто ни сей самый камень, ни Руландова вода не производятъ рвоты. Почему въ такомъ случаѣ надлежитъ смѣшивать вишней рвотной камень съ симъ корнемъ, которой вмѣстѣ гораздо лучшее производитъ дѣйствіе, нежели каждое изъ сихъ веществъ по рознь.

Естьли же смѣшать рвотной камень, съ равнымъ количествомъ опія и нѣкоторою среднею солью; то изъ смѣшенія сего происходитъ славной оной Доверовъ порошокъ, споль много въ Англіи превозносимый, которой имѣетъ хорошую силу производитъ испарину, и которой съ великою пользою давать можно въ упорномъ мокротномъ поносѣ или мышѣ.

Порошокъ Доверовъ составляется слѣдующимъ образомъ :

Возьми перечищенной селитры.	RC. Nitri depurat.
Вишняго купороснаго камня по 4 части.	Tart. vitriolat. aa p. IV.
Опія.	Opii.
Ипекакуанскаго корня.	Rad. ipecacuanhæ.
Солодовикаго корня по 2 части.	Liquirit. aa p. I.
Смѣшай и дай.	M. d.

Radix

Radix liquoritice солодковой корень.

Сей корень имѣетъ свойство уполять острету въ шлѣ. Смотри жалли бѣлаго бедренца (ЕШ. pimpinel. alb.)

Radix raphani nigri корень черной рѣдьки.

Черная рѣдька составляетъ хорошее лекарство отъ цынготной болѣзни и задержанія мочи. Почему можно употреблять оную вмѣсто закуски въ болѣзняхъ, отъ худокровія происходящихъ.

Radix Rhabarbari ревеневой корень.

Сей преславной корень употребляемъ мы отъ болѣзней, въ животѣ находящихся.

Впрочемъ надобно знать, что корня сего употреблять не должно, когда случатся какія либо скопленія къ груди, и когда должно будетъ споспѣшествовать испражненію какой либо матеріи изъ легкихъ или по крайней мѣрѣ не должно останавливать таковыхъ испражнений. Употребляютъ ремень и въ кровавомъ поносѣ тогда наипаче, когда оной происходитъ будетъ отъ слабости желудка и кишекъ. Въ большемъ пріемѣ употребленной ремень рождаетъ жаръ, а въ меньшемъ вяжетъ желудокъ. Кромѣ сего ремень имѣетъ еще и разбивательную силу, потому что дѣйствуетъ на мочу и тониитъ оную.

Смотри разбавительной порошкѣ (pulvis es-
phracticus).

Radix rubiae tinctorum корень красильнаго
дерева или дикой маріоны.

Сей корень имѣетъ такую силу или свойство,
что отъ употребленія онаго кости получаютъ
какъ красной цвѣтъ, такъ и крѣпость. Почему
весьма полезно употреблять оной въ Англинской
болѣзни. Наилучше предписывать корень сей
въ отварѣ, напримѣръ такимъ образомъ:

Возьми корня дикой маріоны :	℞. Rad. rub. tinct. unc.
унцѣ.	I.
Воды ромашковыхъ цвѣтѣвъ	Aq. fl. chamom. libr.
2 фунта.	II.
Получивъ отвару изъ сего	Colat. unc. XVIII.
унцовъ 18, приѣмай къ оному	adde.
Переплавленнаго меда 1 унцѣ.	Mel. despat. unc. I.
	d. s.
Дѣй, запечатавши, и вели	Capiat omni hora di-
принимать по подлошкѣ вся-	nitum cochlearis or-
кой часѣ.	dinarum.

Корень сей имѣетъ силу гонить и остано-
вившуюся мѣсячину. Чего однакожъ я въ моей
практикѣ не примѣтилъ.

Radix carfaparillae сарсапарилловой
корень.

Отварѣ сего корня щипается между самыми
лучшими кровочистительными лекарствами.
употребляютъ оной такъ, какъ самое хорошее
крово-

жрочочистительное лекарство въ любострастныхъ
болѣзняхъ.

Radix fenegae истодовъ корень.

Сей корень можно употреблять такъ, какъ
хорошее разбивашельное лекарство, поелику оной
непокомо мочу гонитъ, но и потъ производитъ,
въ разсужденіи чего и имѣетъ преимущество
предъ змѣевиковою или змѣиною правою.

Употребляютъ оной по большой части въ
водяныхъ болѣзняхъ и грудныхъ припадкахъ.

Употребляютъ же оной либо въ отварѣ, либо
въ порошокѣ. Для составленія отвара берется
половина унца корня сего на 8 унцовъ воды, и
варится до тѣхъ поръ, пока половина выки-
питъ, послѣ чего должно сливъ отваръ сей и
вельтъ употреблять всякой часъ по столовой
ложкѣ. Въ порошокѣ же дается корень сей опъ
то до 15 грановъ всякіе два часа, или всякіе
три часа.

Radix squillae корень москаго луку.

Корень сей составляетъ лекарство острое,
разбивашельное, мочегонительное и рвотное.
Употребляется оной опъ водяной наипаче бо-
лѣзни, и другихъ мокротныхъ припадковъ.
Особливое же дѣйствіе имѣетъ оной очищать
опъ мокроты грудь, и слѣдственно въ грудныхъ

мокропныхъ припадкахъ весьма хорошо употреблять оное. Вообще же корень сей больше дѣйствуетъ на желѣзы и мокроту, нежели на склизость, на первыхъ путяхъ находящуюся.

А поелику корень сей не производитъ пота, для того не можно употреблять онаго тогда, когда бываетъ наклонность къ поту, потому что оной не можетъ вкупѣ дѣйствовать на потъ и на мочу.

Ежели его дать отъ шести до семи грановъ, то онъ можетъ легко произвести рвоту, для произведенія которой рѣдко употребляется оной. Сперва дается корень сей отъ нѣсколькихъ грановъ и умножается пріемъ, смотря по обстоятельствамъ.

Radix taraxaci корень одуанчиковой.

Корень сей составляетъ весьма хорошее развѣшательное и кровочистительное лекарство. Смотри кровочистительные сорта и одуанчиковой экстрактъ (*species purificantes et extractum taraxaci*).

Radix Valerianae корень мауновой.

Сей корень есть самое лучшее противоядное лекарство, наипаче елики оной изъ самой Англіи получить можно. Его даютъ въ гнилыхъ и опасныхъ лихорадкахъ, въ упорной ломотѣ и падучей болѣзни. Въ первомъ случаѣ дается оной

въ опварѣ и капляхъ. Смотри противоядное
литіе (potio alexipharmaca), во впоромъ въ порош-
кѣ, почему сперва дается по 10 грановъ, а по-
томъ мало по малу умножается приѣмъ, и на-
конецъ дается до нѣсколькихъ золотниковъ.

Resina Jalappa Ялалловая смола.

Сія смола есть самое лучшее прогосное ле-
карство. Молодымъ людямъ дають оныя по
нѣскольку грановъ съ сладкимъ миндалемъ. Но
взрослымъ можно давать выше писанныя про-
носныя пилюли. (pills purgantes).

*Roob Juniperi можжевеловой робъ или
бзваръ.*

Сіе лекарство гонитъ нѣкоторымъ образомъ
мочу, слѣдственно можно употреблять оной
въ водяныхъ и мокротныхъ болѣзняхъ, такъ
какъ хорошей растворъ прочихъ приличныхъ
къ тому лекарствъ.

*Roob sambucci бузинникъ, бузиной
бзваръ.*

Сей бзваръ можно употреблять хорошимъ рас-
творомъ или основаніемъ противолихорадочныхъ
кашицъ, а наипаче, когда потребно будетъ со-
держать въ порядкѣ хорошую испарину.

Roob sorborum рябиной взваръ.

Сей взваръ часто гонитъ въ большемъ количествѣ мочу, нежели можжевеловой взваръ, почему рябиной взваръ можно употреблять тогда, когда можжевеловой чрезвычайно горячитъ и почти мочерѣзъ причиняетъ. Потому что рябиной рсбъ есть также и холодительное лекарство.

S.

*Sal ammoniacum аммоніачная или на-
шатырная соль.*

Сія соль составляетъ весьма хорошее разбивательное лекарство, которая всѣ прочія превышаетъ соли, тѣмъ паче, что соль сія не слабитъ желудка, но вяжетъ оный, почему съ великою пользою можно предписывать оную въ лихорадкахъ, съ коими бываютъ соединенны и припадочные поносы.

Полезно также употреблять соль сію и для оспановленія или унятія припадочныхъ потѣній.

Даютъ оной отъ 1 до 10 грановъ на одинъ пріемъ всякіе два часа, но въ четверодневныхъ лихорадкахъ, мало по малу умножая пріемъ,
мо-

можно давать до 20 грановъ на одинъ разъ.
Смотри сурьмяную сѣру (sulphur. antimonii).

Весьма великую дѣйствительность имѣетъ соль сія въ разбиваніи внутреннихъ завазовъ, почему преполезно употреблять оную въ четверодневныхъ лихорадкахъ. *Смотри порошокъ отъ лихорадки* (pulvis antifebris).

Sal. cornu cervi соль оленя рога.

Сія соль есть нечто иное, какъ летучая щелочная соль, которая употребляется иногда въ опасныхъ и негодныхъ лихорадкахъ. Поскольку же она чрезвычайно горячитъ; для того лучше смѣшивать ее съ кислотою, также летучею, которою она умѣряется. *Смотри янтарная оленья рога капли и второе противоядное лекарство* (liqu. c. . et potio alexiptarm. secunda).

Sal Mirable Glauberi слабительная Глауберова соль.

Сія соль есть средняго сложенія, которая разводитъ нечистоту, на первыхъ путяхъ находящуюся и извергаетъ низомъ вонъ изъ тѣла. Можно давать оной всякой день по полунца, по есть по 4 золотника, одной, либо въ какойнибудь микспурѣ. *Смотри разбивательную микстуру* (mixtura solvens).

*Sal sodæ et sal tartari травяная щелочная
и виннокаменная соль.*

Мы никогда почитай не употребляемъ однихъ щелочныхъ солей, потому что онѣ чрезвычайно растворяютъ влаги; естли же ихъ смѣшати съ маслами или съ растительными кислотами, съ которыми онѣ превращаются въ среднія соли; то онѣ въ семъ случаѣ бываютъ весьма хорошими разбивательными лекарствами. *Смотри жидкость листовъ земли винного камня и разбивательная жидкость (liquor terræ foliat. tart. atque elixirium resolvev.)*

При употребленіи внутрь постоянного воздуха виннокаменная соль, или перечищенная щелочная съ превеликою попребляющся пользою. *Смотри постоянной водухъ (aër fixus).*

Щелочная соль есть алкали минеральное, которое будучи соединено съ купоросною кислотою, составляетъ слабительную Глауберову соль, и въ семъ случаѣ заслуживаетъ преимущество предъ солью винного камня, потому что винная соль, соединившись съ купоросною кислотою, составляетъ окупорошенной винной камень, меньше дѣйствителенъ и полезенъ.

Sapo Hispanicus Гишпанское мыло.

Относительно до внутренняго употребленія сіе мыло должно предпочесть Грецкому мылу,

по-

потому что оно есть чище Грецкаго и острѣе. Оно составляеѣтъ весьма хорошее разбивательное лекарство, хопя и не имѣеѣтъ силы разбивать камней, на мочевыхъ путяхъ находящихся.

Рѣдко даюѣтъ одно токмо мыло, но по большей части смѣшнваюѣтъ оное съ другими лекарствами. *Смо при проносныхъ и разбивательныхъ мнлюли* (*pilulae purgantes et resolventes*).

Scarabei majales майки мухи.

Сии мухи или майки употребляютъ отъ угрызенія бѣшеннот собаки тогда, когда можно надѣяться, что произведеніемъ мочи въ великомъ количествѣ можно пользоваться сію болѣзнь. *Смотри лнтьс отъ угрызенія бѣшеной собаки и водной болѣзни* (*potio antilyssa*).

Semen cynae f. fantonicі цытварное сѣмя.

Сіе сѣмя есть весьма хорошее отъ глистовъ лекарство, которое можно варить въ молоко и давать малымъ дѣтямъ и даже самымъ младенцамъ.

Его можно употреблнть вмѣсто основанія прочихъ пропнвоглистныхъ лекарствъ. *Смотри порошокъ отъ глистовъ* (*pulvis anthelminticus*).

Semen faeniculi сѣмя волоскаго укрола.

Смотри во у и масло сего же укрола (*aqua et oleum faeniculi*).

Semen

*Semen fenugraeci сѣмя Божіей травы
или соевичное сѣмя.*

Сіе сѣмя содержиѣ въ себѣ весьма много склизкихъ и бальсамическихъ частей, почему, будучи употреблено снаружи, составляетъ весьма хорошее смягчительное и разбивательное лекарство. *Смотри сорты для припарокъ (sr. pro cataplasm.)*

Semen lini льняное сѣмя.

И сіе сѣмя имѣетъ такія же силы, какъ и вышеписанное, однако въ меньшемъ количествѣ.

○ *Semen fabadileos сѣмя сабадиловое.*

Ежели спереть сіе сѣмя мѣлко, то происходитъ опшуда порошокъ, которой называютъ *ешивымъ лоромомъ*, потому, что еспѣли посыпать имъ голову, то оное умерщвляетъ волосы. (

Впрочемъ не справедливо употребляютъ оное внутрь отъ плоской глисты (*tenia*); ибо я сколько ни употреблялъ въ семъ случаѣ оное, однако никакой пользы отъ того не видѣлъ, но еще не рѣдко причиняло оное великія досады больнымъ.

Semen linarios горчичное сѣмя.

Сіе сѣмя принадлежитъ къ противоцинготнымъ лекарствамъ. Снаружи употребляютъ оное

ное такъ, какъ мокроту натягивающее лекар-
ство (epistraiticum).

Sinapismus синализмъ, горчичникъ.

Сія прикладка или пластырь составляется
слѣдующимъ образомъ :

Возьми кислой хлѣбной квашни	RC. Ferment. pan. acid.
3 волошника.	unc. III.
Накобленного свѣжаго хрѣна.	Raf. rad. arm. rec.
Ис подченнаго и въ укусу на-	Sem. sinap. contuf.
жоченаго горчичнаго сѣмьяни	et in acet. macer. aa
по подшора волошника.	unc. I et f.
Нашатырной соли полунца.	Sol. ammon. unc. f.
Смѣшай и сдѣлай съ виннымъ	M. с. acet. v. ad-
укусомъ прикладку.	consist. cataplasma.

Сіе лекарство употребляется въ шѣхъ слу-
чаяхъ, когда не можно употреблять нарывнаго
пластыря, и когда нужда требуетъ возбудить
ослабшія шѣлесныя силы.

Species pro cataplasmate сорты для припарки или прикладки.

Возьми травы просвирекъ.	RC. Herb. malv.
Большаго проскурника по 3	Althae aa unc. III.
унца.	
Цвѣтковъ ромашковыхъ.	Flor. cham. vulg.
Мелилосныхъ или доннико- выхъ.	Melilot.
Лузиныхъ по 2 унца.	Sambuc. aa unc. II.
Корня большаго проскурника	Rad. althae. unc. IV.
4 унца.	
Сѣмьяни божіей травы 10 ун- цовъ.	Sem. fen. grac. unc. X.

Льня-



Двѣннато 1 фунтѣ. Lini libr. I.

Смѣшай, сдѣлай порошокъ и M. f. p. d.

дай.

Сей порошокъ, будучи опваренъ въ молоко, составляетъ весьма хорошую припарку какъ для разбитія начинающейся инфламации, такъ и приведенія къ скорѣйшему загноенію нарывовъ.

Species pectorales demulcentes грудные, утѣляющіе остроту, сорта изъ травъ и корней.

Составляются такимъ образомъ:

Возьми травы просвирокъ.	RC. Herb. malv.
Бѣлокошница.	Tussilag.
Корни большого проскурника.	Rad. anth.
Солодкового по 4 унца.	Liquirit. aa unc. IV.
Бадьяноваго сѣмянъ полунца.	Sem. anif. stellat.
	unc. fm.
Смѣшай и сдѣлай сортъ для	M. f. f. pro thea.

Сей сортъ или смѣшеніе разныхъ травъ и корней обыкновенно предписываютъ для чахотныхъ людей, которые никакого раздраженія перенѣть не могутъ, и однако чай употребляютъ желаютъ.

Но елики мы имѣемъ вмѣстѣ вниманіе и на настоящія мокротныя застои; то въ такихъ случаяхъ предписываемъ слѣдующей чай:

Species pectorales resolventes разбивательныя грудныя смѣшенія травъ и корней.

Возьми цвѣтѣвъ ромашковыхъ	RC. Flor. cham. vulg. unc.
4 унца.	IV.

Варенье

Бараней травы,
Травы дикой гречухи.
Сладковаго корня по 2 унца.

Сѣмянн бадьяноваго 1 водопи-
ниѣ.

Смѣшай, сдѣлай сортѣ для
чая и дай.

Agnic.
Herb. millefol.
Rad. liquirit. aa unc.
II.
Sem. anis. stellat. dr.
I.
M. f. sp. pro thea. d.

Species purificantes кровочистительные сорта.

Сии сорта собираюшѣ такимѣ образомѣ :

Волни можжевеловаго дерева,	RC. Lign. juniper.
Кореньѣ пирейнаго,	Rad. gram.
Одуванчиковаго,	Taraxac.
Зубнаго, по 4 унца.	Cichor. aa unc. IV.
Исподоваго,	Senegæ.
Сѣмянн Волоскаго укропа,	Sem. fœnicul.
Петрушешноваго,	Petroselin.
Можжевеловыхъ ягодѣ по пол- унца.	Bacc. juniper. 3a unc. fm.
Смѣшай и дай.	M. d.

Изѣ сего смѣшенія берется обыкновенно одинѣ
унцѣ на два фунта воды, и употребляется во
всѣхъ тѣхъ случаяхъ, въ коихъ должно очи-
стить и исправить кровь, и въ коихъ какѣ
гваяковаго дерева по причинѣ чрезвычайной его
раздражительности, такѣ и сарсапарилла по
причинѣ его дороговизны употреблять не
можно.

или

vel

Волни скоблѣ тволковаго или RC. Rasur. lign. græiac.
бактауповаго дерева.
Сладковаго корня.

Rad. liquirit.

Часть VII.

III

Мож-

Можжевельникъ ягодъ 1 фунту.	Bacc. junip. aa libr. I.
Пирейнаго корня 3 фунта.	Rad. gram. libr. III.
Смѣшай и дай.	M. d.

Вели употреблять такимъ образомъ, какъ вышеписанное лекарство.

Spiritus cornu cervi спиртъ изъ оленья рога.

Сей спиртъ есть самое лучшее попогонительное лекарство. Его даютъ отъ 10 до 20 грановъ одного, либо съ приличнымъ какимъ либо смѣшеніемъ. Смотри испарикогонительную микстуру (*mixtura diaphoretica*).

Spiritus Mindereri Миндереревой спиртъ.

Сей спиртъ готовится чрезъ насыщеніе уксусомъ спирта нашатырной соли, съ алкалическою солью приготовленнаго.

При чемъ должно замѣтить, чтобы насыщеніе дѣлать довольное или совершенное, и чтобы спиртъ не былъ давней; въ противномъ случаѣ щелочная летучая соль по большей части разсыпается на воздухъ и улетаетъ.

Сей спиртъ весьма хорошую производитъ испарину. Пріемъ онаго опредѣлить трудно, потому что таковое опредѣленіе зависитъ отъ крѣпости летучей щелочной соли и уксуса. По большей части примѣшиваютъ спиртъ сей къ

къ другимъ лекарствамъ. Смотри микстуру,
производящую испарину (mixtura diaphoretica).

*Spiritus salis ammoniaci спиртъ наша-
тырной соли.*

Сей спиртъ не что есть иное, какъ летучая
щелочная соль, выведенная изъ нашатырной со-
ли и распущенная въ водѣ, почему весьма не-
справедливо называется спиртомъ.

Поселику спирта сего одного внутрь не даютъ
или не предписываютъ, но насыщаютъ оной
уксусомъ: для того никогда не должно приго-
товлять онаго примѣщеніемъ къ нему извести,
но примѣщеніемъ щелочной соли, потому что
оной въ первомъ случаѣ трудно насыщается и
никогда почти не доходитъ до совершеннаго
насыщенія.

Еслили спиртъ сей будетъ приготовленъ по-
средствомъ извести; то его внутрь употре-
блять никакъ не должно, по причинѣ его чрез-
вычайной ѣдкости и жгучести.

Впрочемъ снаружи употреблять можно, рас-
творивши прежде въ чистой простой, или дру-
гой какой либо перегнаной водѣ.

*Spiritus sulphuris сѣрной спиртъ, или
сѣрная кислота.*

Сія кислота получается, изъ сѣры чрезъ со-
жженіе оныя, которая есть нечто иное, какъ

купоросная кислота, насыщенная нѣкоторымъ количествомъ горючаго начала, по причинѣ котораго она есть весьма проникательна и летуча.

Сію кислоту съ великою пользою употреблять можно въ коростѣ и гнилыхъ лихорадкахъ, когда силы начнутъ приходить въ изнеможеніе, остановится испарина, и однакожъ грудь спадать не будетъ.

Spiritus vini camphoratus винный камфорный спиртъ.

Сей спиртъ пригошовляется слѣдующимъ образомъ:

Возьми весъиз крѣпкого винна-	RC. Spirit. v. rectificatissim. unc. VIII.
го спирта 3 унцѣ.	
Камфоры 1 унцѣ.	Camphor. unc. I.
Разпусти и дай.	F. f. d.

Сей спиртъ кромѣ наружнаго употребленія отъ ломоты, предписывается еще и внутрь вкупѣ съ лекарствами, испарину производящими. *Смотри испариногонительную микстуру и второе противодное питье (mixture diaporetica et potio alexipharmaca secunda).*

Spiritus vitrioli купоросной спиртъ.

Сей спиртъ есть нечто иное, какъ купоросное масло, растворенное водою. *Смотри купоросную кислоту (acidum vitrioli).*

Спон-

Spongia marina морская губка.

Говоряшѣ, что сія губка весьма великое дѣйствіе имѣетъ въ леченіи и разбитіи подбородочной килы, иначе свинухою или зобомъ называемой (*ferophula*). Даютъ ея отъ 10 до 20 грановъ на одинъ пріемъ.

Succus citri лимонной сокъ.

Сей сокъ употребляется въ томъ случаѣ, когда укусъ оказывается чрезвычайно горячипельнымъ. Смотри винной укусъ (*acetum vini*).

Succus liquoritiae сокъ солодковаго корня.

Симъ именемъ называется водянистой экстрактъ или сгущенной сокъ солодковаго корня, которой употребляется какъ изрядное, оспропу утоляющее, лекарство въ грудныхъ болѣзняхъ. Смотри грудной сыропъ (*symporus restorialis*).

Sulphur antimonialis сурьямая сѣра.

Сурьямая сѣра различествуетъ отъ обыкновенной сѣры тѣмъ, что въ сей сѣрѣ находящіяся и корольковыя распущенныя части, по причинѣ которыхъ она имѣетъ весьма великую разбивательную силу.

Она есть весьма хорошее лекарство, какъ отъ внутреннихъ запоровъ и заваловъ, такъ и отъ грудныхъ мокротныхъ болѣзней; почему съ всею пользою можно и должно употреблять

оную въ перемежающихся лихорадкахъ и водяныхъ упорныхъ болѣзняхъ.

Сперва даютъ оной по нѣскольку грановъ, а наконецъ по цѣлому золопнику всякой день.

Еслили больной будетъ мокротнаго сложенія; то даютъ ея вкупѣ съ нашатырною солью отъ восьми до 10 грановъ. А еслили больной будетъ слабъ и чувствительнъ; то за основаніе берется ревень.

Сѣра сія, будучи одна употребленна, гонитъ мочу, наипаче, еслили смѣшать ее съ 10 гранами порошка изъ исподоваго корня (*radicis senegæ*).

По большей части употребляется сурьмяная сѣра претіей осадки, потому что первой осадки сѣра содержитъ въ себѣ много корольковыхъ частей и слѣдственно удобно рвоту произвести можетъ.

Syrupus acetosifatis citri сиропъ изъ лимоннаго соку.

Сей сиропъ обыкновенно примѣшиваютъ къ холодительнымъ лекарствамъ и употребляющъ съ обыкновеннымъ пищемъ.

Syrupus de althea сиропъ большаго проскурняка.

Варятъ сей сиропъ слѣдующимъ образомъ:

Возь-

Возьми корни сѣжнаго проскур- иана : фунтѣ.	RC. Rad. alth. recent. libr. I.
Вари въ довольномъ количе- ствѣ дождевой воды.	Coqu. cum aq. plu- vial. q. l.
Хорошо опариши, процѣ- ди отварѣ и придай :	Col. adde.
Бѣлаго сахара 4 фунта.	Sachar. alb. libr. IV.
Вари до шѣхъ перѣ, пока по- лучишѣ видѣ сиропа.	Coq. ad syrupi consi- scentiam.

Сей сиропѣ, поелику имѣетѣ весьма хорошую припупающую остроу, силу; для того сѣ великою пользою можно употреблять оной въ грудныхъ болѣзняхъ и чрезвычайной раздражи-тельности или боли въ кишкахъ, въ сильномъ кашлѣ, мочерѣзѣ и послѣ оправленія ѣдкими ка-кими либо веществами. Дается либо одинѣ по споловой ложкѣ, либо употребляется сѣ какою либо приличною настойкою или кашницею.

*Syrupus Pectoralis demulcens грудной, уто-
ляющій остроу, сиропѣ.*

Приготавливаютѣ его слѣдующимъ образомъ:

Возьми соку солодковаго корня	RC. Succi. liquirit. unc. I.
и унцѣ.	
Разпусти въ водѣ ромашко- выхъ цвѣтовѣ, безѣ вина при- готовленной, взявъ оной фун- товѣ 2.	Solv. in Aq. Hor- cham vulg. f. v. libr. II.
Послѣ придай :	Admisce.
Просвириковаго сиропа 8 ун- цовѣ.	Syrup. de althea unc. VIII.
Дай для употребленія.	D. usui.

Сей сиропѣ предписывается чахотнымъ лю-
демъ, весьма великую перхоту въ гортѣ сущу-
щую

пняющимъ, которой не токмо влажными дѣла-
етъ засыхающія въ горлѣ части, но и поспѣ-
шествуетъ очищенію груди. Даютъ его по чай-
ной ложкѣ почаще.

*Syrpus pectoralis resolvens разбавительной
грудной сиропъ.*

Составъ сего сиропа есть слѣдующій:

Возьми нащипырной чистой RC. Gum. ammon. depur.
гумми.

Нащипырной чистой соли по
2 золотника.

Sal. ammon. depur.
aa dr. II.

Распусти въ укусуномъ мор-
скимъ аркомъ приготовлен-
номъ меду, взявъ онаго :
унцѣ.

Solv. in oxymel. scil-
licit. unc. I.

Рулидовой благословенной во-
ды 2 золотника.

Aq. benedict. Ruland.
dr. II.

Придай наконецъ груднаго
вышписаннаго сиропа 8 ун-
цовъ,

Adm. syrop. pectoral.
demulc. unc. VIII.

И дай.

D.

Сей сиропъ предписывается чахотнымъ лю-
дямъ, когда не хорошо очищается грудь у
оныхъ. Также и тогда, когда гной всасывает-
ся въ кровь, производитъ сильную лихорадку
и чрезвычайной поносъ. Въ какомъ случаѣ даютъ
сиропа сего всякой часъ по ложкѣ, которая
ложка должна быть изъ дерева едланная.

Т.

Tartarus emeticus *рвотной винной*
камень.

Сей камень есть нечто иное, какъ корольковыя сурьмяныя часни, распущенныя въ кислощъ виннаго камня, почему составъ сей не различествуетъ существенно отъ Руландовой рвотной воды.

Поселику же сія кислоща, насыщенная корольковыми частицами, опять кристаллизуется; для того статься можетъ, что не всѣ кристаллы содержатъ въ себѣ одинаковое количество корольковыхъ частей; почему, естли Аптекарь не смѣшаетъ хорошо всѣхъ вмѣстѣ кристаллей, употребленіе сего лекарства подвержено будещъ нѣкоторому сомнѣнію.

Припомъ поселику рвотной винной камень не скоро распускается въ водѣ, и когда распустится, то опять удобно отдѣляется отъ оной, между тѣмъ поселику еще не извѣстно бывающъ, изъ чего приговоренъ оной винной рвотиной камень, изъ сурьмянаго ли спекла, или сурьмяной печенки; для того совѣтовалъ бы я лучше употреблять Руландову воду, нежели винной рвотной камень, для произведенія ли рвоты, или для учиненія разбитія какихъ либо застосвъ или вязкостей въ тѣлѣ.

Впрочемъ употребляютъ камень сей для про-
изведенія рвоты. Въ какомъ случаѣ даютъ его по 3
грана съ 10 гранами сахара на одинъ пріемъ, что
все должно принять въ мясной простой водѣ.

Tartarus tartaricatus возрожденной бин-
ной камень.

Сей камень есть очень хорошее разбиватель-
ное лекарство, которое давать можно весьма
чувствительнаго сложенія людямъ. Даютъ его
отъ 10, до 30 грановъ на одинъ пріемъ.

Естьли же не случится когда либо сея соли;
то вмѣсто оной можно употреблять Глауберо-
ву соль и Руландову растворенную воду. Ибо сіи
лекарства подобную оной имѣютъ силу, и есть-
ли когда окажутся не дѣйствительными сіи
лекарства; то и описываемая здѣсь соль ничего
не посебитъ.

Впрочемъ должно знать, что сія соль скоро
плетъ на воздухъ, почему надлежитъ содер-
жать оную въ закупоренномъ сосудѣ.

Terebinthina Veneta Венеціанской терпен-
тинъ, или густой скилидаръ изъ
лиственницы.

Терпентинъ сей составляетъ хорошее бальса-
мическое и мочегонительное лекарство. Онъ
даетъ мочѣ фіялковой запахъ.

По-

Послику терпентинъ имѣетъ силу горячить; для того не должно употреблять онаго въ горячкахъ и другихъ помѣстныхъ воспаленіяхъ.

Терпентинъ можно давать въ гонорей, распусшивши оной въ водѣ помощью личнаго бѣлка. Однако должно имѣть осторожность въ учрежденіи пріема онаго, для того, что нерѣдко случается, что отъ чрезвычайнаго, причиняемаго имъ раздраженія, заражаются любострастнымъ ядомъ и самые ядра.

Сперва должно давать онаго по 20 грановъ, а послѣ умножая мало по малу пріемъ, и по цѣлому золотнику. Его употреблятъ можно всякой день напримѣръ такимъ образомъ:

Возьми терпентина изъ лист- венницы ползолотника.	RC. Terebrath. venetæ. unc. sem.
Распусти съ довольнымъ ко- личествомъ личнаго желтка въ шести унцахъ воды ромаш- ковыхъ цвѣтовъ.	Solv. c. vit. ov. q. f. in aqu. flor. cham. unc. VI.
Запечатай и дай, вели при- нимать всякой часъ по сто- ловой ложкѣ.	D. f. sumat quotidie. omni hora coheare ordinarium.

Терпентинъ также служитъ и къ растворе-
нію ртутти. Смотри Неаполитанскую мазь
(unguentum Neapolitanum).

Если терпентинъ отварить въ водѣ; то
онъ отъ того затвердѣваетъ и ломается, что
происходитъ отъ того, что чрезъ вареніе раз-
сы-

сыпается тонкое онаго масло, по разсыпаніи котораго перпентинъ дѣлается не такъ горячительнымъ, и слѣдственно безопаснѣе оной употреблять можно.

Tinctura antimonii Jacobi сурьмяныя Якововы капли или Яковова сурьмяная тинктура.

Приготавливается такъ :

Составляется щелокъ изъ свѣжихъ огарковъ простаго сурьмянаго королька, и съ нѣкоторымъ свѣжимъ тонкимъ жатымъ масломъ сваривается въ мыло, которое поелику скоро портится, для того не бесполезно распускать оное въ винномъ спиртѣ. Для какого произведенія потребенъ есть весьма крѣпкой винной спиртъ или обыкновенная сурьмянаго королька тинктура, не корольковыми, но нѣкоторыми жигучей соли частицами насыщенная; каковъ растворъ мыла въ острой сурьмяной тинктурѣ есть помѣй почишай самой, которой иные называютъ жидкою сурьмяною сѣрою (*fulphur antimonii liquidum*).

Сии капли нѣмъ различествуютъ отъ Тедескихъ капель, что капли сии вмѣсто мыла содержатъ въ себѣ липсовую виннаго камня зѣ-

Капли сии составляютъ весьма хорошее разбавительное и мочегонительное лекарство. На-
стояще

стояще опредѣлить пріема сихъ капель не можно, потому что вся важность дѣла зависить отъ различія приготовленія сихъ капель, котораго совершенно опредѣлить не можно. Сперва даютъ лекарства сего по нѣскольку капель, и смотря по общиятельствамъ мало по малу умножаютъ пріемъ.

Весьма полезно употреблять капли сіи въ застарѣлыхъ гонорейхъ и внутреннихъ засореніяхъ.

Tinctura Cantharidum капли Шпанскихъ
мухъ.

Приготавливается по сему предписанію:

Возьми порошка Шпанскихъ	RC. Pulv. cantharid. dr.
мухъ з золотника.	II.
Дюймовой водки 1 фунтъ.	Sp. v. rect. libr. I.
Дай отдохнуть настоявшему про-	Dig. col. d.
цѣди и очисти.	

Сіе лекарство иногда хорошо пользуется бородавки и любострастные шишки, которыя также весьма хорошо пользуютъ салипреной рпуш-ной тонкой растворъ и перевязки.

Капли Шпанскихъ мухъ даютъ и внутрь въ хорошей и неядовитой гонорей и водяной болѣзни такъ, какъ мочегонительное и крѣпительное лекарство. Сначала давать должно по нѣскольку капель, растворивши хорошо въ водѣ. Съ хорошею также пользою употребляются оныя

сна-

снаружи отъ паралича. Смотри жидокрѣпительную мазь (unguentum nervinum).

Tinctura Guaiaci volatilis тонкія проника-
тельные или летучія капли Гваяко-
баго или Бакаутоваго дерева.

Составляются капли сіи слѣдующимъ обра-
зомъ:

Возьми самородной Гваяковой	RC. Gum. Gvajas. nativ.
гумми 4 унца.	unc. IV.
Виннаго нашатырнаго спир-	Sp. sal. ammon. vinosi
та 1 фунтъ съ половиною.	libr. i. et ℥.
Дѣй настояться въ закупорен-	Dig. col. d.
номъ сосудѣ, процѣди и дѣй.	

Сии капли весьма полезно употребляютъ въ
членосоставной боли и долговременныхъ ломотахъ.
Можно учреждать пріемъ до двухъ зо-
лопниковъ на всякой разъ и умножить пріемъ,
смотря по обстоятельствамъ.

Tinctura martis adstringens Ludouici желѣ-
зные крѣпительныя Лудовиковы
капли.

Сии капли составляются такимъ образомъ:

Возьми чистаго зеленого купороса.	RC. Vitriol. mart. depur.
Кремора виннаго мамии по пол-	Crem. tart. aa libr.
фунта.	℥.
Джжевой воды 6 фунтовъ.	Aq. plu. libr. VI.
Вари до шѣхъ поръ, пока огу-	Coq. ad spissitud. me-
стѣетъ такъ какъ медъ, по-	lis, postea adde:
слѣ придай:	

Двое-

Двояной води 6 фунтовъ.

Sp. vin. tastic. libr.
VL

Дай настояться, процѣди и дай
для употребленія.

Dig. col. d. usui.

Сихъ капель даютъ отъ 50 до 80 въ слабости во всемъ тѣлѣ ощущаемой и испорченномъ состояніи влагъ.

*Tinctura martis aperiens разбивательныя
или пропускныя желѣзныя капли.*

Составляютъ ихъ такъ:

Возьми желѣзистыхъ цвѣтовъ, RC. Flor. sal. ammon.
нашапырной соли 4 унца. mart. unc. IV.

Двояной води 1 фунтъ.

Sp. v. rect. libr. I.

Дай настояться, процѣди и
отдай.

Dig. col. d.

Сихъ капель даютъ отъ 30 до 40 нѣсколь-
ко разъ въ день для разбитія внутреннихъ
заваловъ и засореній.

*Tinctura Rhabarbari aquosa ревеневыя
водяныя капли.*

Тинктура или капли сіи суть нечто иное,
какъ только водяной ревеневой отваръ, кото-
раго то есть ревеня берется одинъ унцъ на
одинъ фунтъ воды. Часто придается для луч-
шаго усиленія къ настойкѣ сей нѣкоторое ки-
личество щелочной соли.

Полезно употреблять оныя отъ боли въ же-
лудкѣ и кишкахъ, причиняемой худою мокротою.

U.

U.

Unguentum de althea *проскурняковая*
мазь.

Сія мазь составляется слѣдующимъ образомъ:

Возьми корня свѣжаго проскур- няка 1 фунтъ.	RC. Rad. alth. recent. libr. I.
Сѣмянъ Рожьей травы, Льняного по 6 унцовъ,	Sem. lini Græc. Lini aa unc. VI.
Корня желтаго имбиря $\frac{1}{3}$ унца.	Radæ cur cum. unc. f.
Свѣж.го майскаго несоленого масла 10 фунтовъ.	Butyral. mai. recent. non salit. libr. X.
Вари на легкомъ огнѣ, пока огустѣетъ. Послѣ процѣди и дай для употребленія.	Coq. leni igne ad humidi consumptionem col. d. utri.

Сія мазь весьма хорошо мягчитъ, почему и употребляется отъ болѣзненныхъ судорогъ и сведеній, обжогъ и твердыхъ опухолей. Если примѣшать къ мази сей не много сулемы; то она составляетъ весьма хорошее очищающее раны и дикое мясо сѣдающее лекарство. Употребляется также мазь сія въ колотыи, намазывается, то есть оною больная часть пѣла.

Unguentum mercuriale rubrum *красная*
ртутная мазь.

Приготавливаютъ мазь сію такимъ образомъ:

Возьми красной осажденной рту- ти 1 золотникъ.	RC. Mercitat. præcip. rubr. dr. I.
---	---------------------------------------

Свин-

Свиного сала 1 унцѣ.
Смѣшай, сдѣлай мазь и дай.

Axung. porc. unc. I.
M. f. ung. d.

Употребляется сія мазь для очищенія и заживленія любострастныхъ ранѣ.

Unguentum Neapolitanum Неаполитанская мазь.

Мазь сія дѣлается слѣдующимъ образомъ:

Возьми чистой ртути 4 унца.	RC. Merc. curr. unc. IV.
Венеціанскаго перпенника 2 унца.	Terebinth. Venet. unc. II.
Смѣшай хорошо, послѣ дай:	Misc. exacte, dein adde:
Свиного сала 10 унцѣ.	Axung. porc. unc. X.
Смѣшай, сдѣлай мазь и дай.	M. f. ung. d.

Сію мазь такъ, какъ разбивательную силу имѣющее лекарство, употребляютъ для разбитія любострастныхъ опухолей, а наипаче, когда предпринимается намѣреніе посредствомъ напиранія ввести мазь въ шло.

Unguentum peruvianum жилоткрѣпительная мазь.

Сію мазь составляютъ такъ:

Возьми проскуринной мази 2 унцѣ.	RC. Ung. de akthea unc. VIII.
Янтарныхъ капель оленя рога 1 унцу.	Liq. c. c. succin. et Tinct. cantharid. aa. unc. I.
Перегнаннаго масла ромашковаго.	Ol. destil. chamom.

Часть VII.

Щ

Милл-

Мяшного,	Menthæ.
Бобковаго,	Bacc. Laur.
Можжевеловаго по 1 золот- нику.	Juniper. aa. dr. I.
Смѣшай и сдѣлай мазь.	M. f. ung.

Сія мазь съ превеликою пользою употребляется для укрѣпленія пораженныхъ параличемъ членовъ.

Прочіе готовится мазь сія слѣдующимъ образомъ:

Возьми Аптекарской жидокрѣ- пительной мази 4 унца.	RC. Ung. Nervin. officin. unc. IV.
Капель Шпанскихъ мухъ по- луунца.	Tincturæ catharid. unc f.
Камфоры ползолотника.	Camphor. dr. f.
Смѣшай и дай.	M. d.

Unguentum ophthalmicum *глазная мазь.*

Мазь сію можно соспавить слѣдующимъ обра-
зомъ:

Возьми красной осажденной рту- ти 2 съ половиною золотника.	RC. Merc. præcip. tabr. dr. II. et f.
Шпайсртовой сажки или ту- щѣ весыма нѣмко тертой 1 золотникъ.	Tutæ subtiliff. præ- parat. dr. I.
Камфоры 16 грановъ.	Camphoræ. gr. XV.
Яичнаго ясла ползолотника.	Ol. ovor. dr. f.
Свѣжаго несоленнаго Майскаго ясла 3 унца.	Butyr. infusa. recent Maial. unc. III.
Смѣшай, сдѣлай мазь и дай.	M. f. ung. d.

Сію мазь весьма полезно употреблять отъ
пятенъ роговой глазной плесви и ячменей на
глазу.

глазу. Почини обыкновенно употребляють оную по вечерамъ, впуская въ глазъ не большее сочевичнаго сѣмянн количества. Можно и въ другое время впускать мазь сію въ болѣзнуюцій глазъ.

**Unguentum ad scabiem мазь отъ
коросты.**

Мази сея составъ есть слѣдующій:

Возьми осажженной бѣлой рту- R. Merc. præcipit. alb.
ти.

Сурьмяной сѣры первой осад-
ки, по золотника.

Sulphur. antim. prim.
præcip. aa unc. f.

Свината сала 3 унцовъ.

Axung. porcina. unc.
VIII.

Перегнаннаго масла, лавро-
выхъ ягодъ 2 золотника.

Ol. destill. baccatum
lauri dr. II.

Смѣшай, сдѣлай мазь и дай.

M. f. ung. d.

Естьли короста отъ употребленія внутри лекарствъ не покидаетъ больного; тогда можно употреблять сію снаружи мазь. При употребленіи которой надобно смотрѣть, чтобы не оспановишь оною и парины. Почему надлежитъ послѣ намазыванія мазью, опять обмывать плѣхо калѣр. отваромъ изъ опрубей и проч. иногда довольно бываетъ натирать мазью сею одну ладонь на рукѣ.

Простѣе мазь сію составитъ можно слѣдующимъ образомъ:

Возьми осажженной бѣлой рту- R. Mercur. præcip. alb.

и

Сѣрыхъ цѣтловъ по 1 унцу.

Свиного сала 8 унцовъ.

Смѣшай и дѣй.

Flor. sulphur. an.
unc. I.

Aking. porcini. unc.
VIII.

M. d.

V.

Vinum вино.

Вино принадлежитъ къ самымъ сильнымъ лекарствамъ, почему всегда должно находиться въ Аптекахъ. Оно всегда употребляеться можно съ превеликою пользою въ гнилыхъ лихорадкахъ и въ нѣкоторыхъ видахъ судорогъ. Вино также хорошо распускаетъ сурьмяной королекъ. Французское хорошее вино я всемъ такого рода лекарствамъ предпочитаю.

Vitriolum album бѣлой купоросъ.

Бѣлой купоросъ есть нечто иное, какъ шпіаушеръ, распущенной въ купоросной кислотѣ, который составляетъ весьма хорошее глазное лекарство. Смотри глазную воду (aqua ophthalmica).

Vitriolum martis зеленой купоросъ.

Сей купоросъ есть нечто иное, какъ желѣзо, распущенное въ купоросной кислотѣ. Сего рода купоросъ принадлежитъ къ крѣпительнымъ и пропивогаишнымъ лекарствамъ. Смотри по-

тиско-

тисолистной порошокъ и хрѣлительныя желѣзные жали (pulvis anthelminbicus et tinctura martis adstringens).

Vitriolum veneris синей купоросъ.

Сей купоросъ съ немалою пользою употребляемъ иногда былъ въ чернотечныхъ припадкахъ, почему и теперь можно употреблять оной, иначе, естли къ раствору онаго прибавляется летучая акалическая соль, потому что въ такомъ случаѣ лекарство сіе не купоросомъ, но летучею нашатырною мѣдною солью называть должно.

Естли не можно когда либо употреблять другихъ лекарствъ, или хопя и употребляемы бывають другія лекарства, однако никакого не приносятъ пособія; то въ такомъ случаѣ синей купоросъ, и нашатырную мѣдную соль употреблять должно, и я совѣтовалъ бы лучше употреблять внутрь послѣднее лекарство.

Сперва дается раствора сего по нѣскольку капель, а со временемъ, смотря по обстоятельству, умножается пріемъ.

Растворъ дѣлается слѣдующимъ образомъ:

Возьми мѣдныхъ опилокъ 20 RC. Limat. vener. scr. XX. гранъ.

Нашатырнаго спирта со щелочною солью приготавленнаго, 2 унцъ.

Дай наслоятися, процѣди и дай.

Spir. sal ammoniac. c. f. alcali præpar. unc. II.

Dig. filtr. d.

Сіе лекарство употребляется въ Англіи отъ нѣкоторой, тамошнему мѣсту свойственной болѣзни, подобной любострастной болѣзни, отъ которой шѣмъ покло различествуесть оная Аглинская болѣзнь, извѣстная подъ Аглинскимъ словомъ (syins), что она не распространяется чрезъ заразу, и что Меркурій никакого дѣйствія на оную имѣть не можетъ.

**Vinum medicatum roborans лекарственное
крѣпительное вино.**

Сіе вино готовится слѣдующимъ образомъ:

Возьми кореньевъ дягилеваго,	RC. Rad. agelic.
Каагалнаго по 1 унцу.	Galang. aa. unc. I.
Пѣоннаго,	Rad. paeon.
Змѣениковаго по полуунца.	Serpent. virgin. aa unc. semis.
Травы дикой гречи,	Herb. millefol.
Пчельной травы по 1 горсти.	Melissæ aa m. I.
Цвѣтовъ мальфейныхъ,	Flor. salv.
Батуновыхъ,	Anthos.
Садовой ромашки по 3 щепотки.	Chamon. rom. aa. p. II.
Деревьевъ сабуроваго.	Lign. aloës.
Сандализаго желтаго по 1 унцу.	Sant. citrin. aa, unc. I.
Корекъ померанцовыхъ.	Cort. aurant.
Кашикармаловой по полуунца.	Cascarill. aa. unc. I.
Сѣмянъ Римской чернушки,	Sem. nigellæ romanc.
Корицы.	Cinnamom.
Кернесовыхъ зернышекъ по 1 золотника.	Gran. chermes aa. dr. II.
Восточнаго шафрана полузолотника.	Croc. orient. dr. I,

Срѣжь

Срѣжь все неочень мѣлко, послаѣ налей хоро-
шимъ ренскимъ виномъ, взявъ онаго полторы
мѣры, дай посшоятъ восемь дней сряду въ лег-
комъ духу, послаѣ сцѣди, очисти и храни для
употребленія.

Сіе вино согрѣваетъ шѣло, укрѣпляетъ чув-
ствительныя жилы и пользуетъ головныя бо-
лѣзни.

Весьма хорошее оказываетъ дѣйствіе вино сіе
въ болѣзняхъ, отъ слабости твердыхъ шѣле-
сныхъ чащей и вязкой мокроты происходящихъ,
каковыя супъ сонливые припадки, мокротной
поспрѣлъ или ударъ, параличъ, падучая бо-
лѣзнь, отъ худокровія происходящая, и лихосъ
или худосочность въ шѣлѣ.

Даютъ его отъ одного до двухъ унцовъ на
одинъ пріемъ.

Vinum medicatum stomachale et antifebrile,

Лекарственное вино, отъ живота

и лихорадокъ.

Сіе вино составляется по слѣдующему пред-
писанію:

Возьми кореньевъ стародубковаго.	RC. Rad. gentian. rubr.
Дялиинато,	Trifol. fibrin.
Зарьнаго по 1 унцу.	Levistic. aa. unc. I.
Травъ полынн,	Herb. absynth.
Конезаго чеснока,	Scordii.
Пчельной травы по 1 горсти.	Melissæ aa. m. I.
Верхушекъ золототысячико- выхъ.	Sumitat. centaur.
Гречушникыхъ.	Millefol.
Лавровыхъ листовъ по 3 цвепотъ.	Fol. laur. aa. p. III.

Вне-

Внешнихъ лимонныхъ корокъ,	Cort. citr. exterior.
Гвоздичной касси,	Cassia caryophyllatae.
Бадьяну по 2 золотника.	Anisi stellati. aa. dr. II.
Можжевельныхъ ягодъ полунца.	Bacc. Junip. unc. f.
Мушкетнаго цѣльца.	Maceris.
Кардамону или кресу по 1 золотнику.	Cardamomi aa. dr. I.
Коньшнато ревеня 1 унцѣ.	Rhabarbar. unc. I.

Срѣжѣ, испоаки и налей хорошимъ ренскимъ виномъ и дай настояться такимъ образомъ, какъ вышеписанное вино настаиваемо было.

Сіе вино укрѣпляетъ желудокъ и прочія внутренности, очищаетъ влаги, и гонитъ мочу и потъ; почему дается оное отъ слабости желудка и засореній онаго мокротными сыростями; предписывается также въ лихорадкахъ, а наипаче четверодневной, въспреннихъ припадкахъ, мокротномъ поносѣ, несваренномъ поносѣ, долговременныхъ внутреннихъ запорахъ, мокротной одышкѣ, коростѣ, худосочной крови, ножныхъ отекахъ и сии подобныя припадкахъ. Вино сіе также очищаетъ и наружныя гнусныя раны.

Даютъ его отъ одного до двухъ унцовъ, въ чайной годѣ или бѣломъ невесьма прѣпкомъ винѣ.

К О Н Е Ц Ъ .



Л Е К С И К О Н Ъ

ИЛИ

П О К А З А Н І Е

мѣстъ и вещей, въ сей книгѣ
содержимыхъ.

А.

Abdomen, брюхо, чрево. 54.

Abortus, выкидышъ, недоносокъ. 200. 469.

Cura, леченіе отъ выкидыша. 396.

Acetabulum, укуеница, вертлугъ. 15. 28.

Achores, шелуди, парши. 813.

Cura, леченіе оныхъ. 1231.

Ambustionum cura, леченіе обжогъ. 1235.

Adenologia, аденологія, наука о желѣзахъ. 10. 108.

Adiperfia, трудное вареніе желудка. 399.

Ale vespertilionum, связки у мыши, непопыръный крылатъ подобный. 99.

Ambustorum cura, леченіе отъ обжогъ. 1235.

Alecanon, гребню подобный отроспокъ. 31.

Alimentum fetus, питаніе зародыша, или младенца въ утробѣ. 193.

Amnion, сорочка зародышева. 182.

Liquores eius eorumque usus, влаги сего сорочки и подлиз оныхъ. 191.

Anaesthesia, ошѣмѣніе. 500.

Anaerga, повсемѣстная родячая болѣзнь. 414.

Anatomia, анатомія, тѣлораздробленіе. 1.

Partes illius, части анатоміи. 10.

Aneurisma, кровоизлитіе, аневризма или боевожилыя опухоль. 774.

Cura eius, леченіе кровоизлитія. 1199.

Anorexia, отверженіе отъ пищи, не хотѣніе ѣсть. 506.

Anthelix, передній завитокъ уха. 75.

Anthitenax, опселящая большой палецъ мышца. 62. 70.

Часть VII.

Щ 5

Ant-

- Anthitragus*, задній ушній завивокъ. 75.
Anus, задней проходъ. 87.
Aorta, начальственная боевая жила. 124.
Eius rami, — ея вѣтви. 126.
Aparanthropia, дружелюбіе. 572.
Aperpna, извареніе желудка. 399.
Aphtæ, шолошница. 215.
Apichanthropia, слезливіе, плачъ. 571.
Aponevrosis, разширеніе сухой жилы. 34.
Aporrhis corasicoidea, опростокъ вороньему носу подобный. 30.
Aproplexia, ударъ, пострѣлъ. 541.
Eius cura, леченіе онаго. 966.
Apetitus caninos, обжорство. 508.
Apyrexia, день нелихорадочный. 383.
Aquæ doctus Fallopii, водотокъ Фаллопеевъ. 75.
Arctus aortæ, дуга, сгибъ начальственной боевой жилы. 126.
Ardor ventriculi, жаръ въ желудкѣ. 503.
Eius cura, леченіе онаго. 954.
Aridura, усохлость. 401.
Arteriæ, бѣющіяся жилы. 86. 95. 124.
Aspera arteria, дыхательное горло. 71. 80.
Arteriæ axillares, бѣющіяся жилы, подмышечныя. 129.
— *Magna*, большая. 125.
— *Carotis*, сонная бѣющаяся жила. 126.
— *Coronariæ cordis*, вѣнечныя сердечныя бѣющіяся жилы. 137.
— *Iliaca*, подвздошная бѣющаяся жила. 133.
— *Innominata*, безъименная бѣющаяся жила. 125.
— *Subclavia*, подключевая бѣющаяся жила. 125. 128.
— *Pulmonalis*, легочная бѣющаяся жила. 136.
Arthritis, ломъ и боль въ членахъ. 487.
Eius cura, леченіе сихъ припадковъ. 934.
Articulationes ossium, членосоединенія костей. 13.
Arthrodia, неглубокочпалое членосоединеніе. 14.
Ascites, брюшная водяная болѣзнь. 410.
Asphyxia, замираніе. 552.
Asthma, одышка. 497.
Eius cura, леченіе оной. 949.

- Astragalus*, основная пятоугольная козья. 33.
Atheroma, безболѣзненный желвакъ на шѣлѣ. 798.
Eius cura, леченіе онаго. 1219.
Atrophia, сухотка. 407.
Eius cura, леченіе оной. 838.
Avris, ухо. 71. 75.
Axilla, крыльцо, мышка. 3.
Axis oculi, ось глазная. 307.
 — *Visionis*, ось видѣнія или зрѣнія. 305.

Прибавленіе къ А.

- Acetum vini*, винной или ренсковой уксусъ стр. 237.
 — *Bezoardium*, противозарыной уксусъ стр. 239.
 — *Squilliticum*, марсколуковой уксусъ стр. 240.
Acidum tartari, кислота виннаго камня стр. 241.
Acidum vitrioli, купоросная кислота. стр. 241.
Aer dellogificatus, лишенной горючаго вещества воздухъ
 стр. 243.
 — *Aer fixus*, огненастоянный, неподвижный воздухъ.
 стр. 245.
Aethiops antimonialis, сурьмовой саѣнѣ. стр. 250.
Aloe, сабурѣ. стр. 251.
Alumen, квасцы. стр. 252.
Antimonium, сурьма. стр. 252.
Aqua benedicta Rolandi, Руландова вода. стр. 253.
Aqua calcis vivæ, вода негашеной извести. стр. 255.
Aqua chamomille florum cum et sine vino, вода ромашко-
 выхъ цвѣтковъ, съ виномъ и безъ вина пригото-
 вленная. стр. 256.
Aqua cinnamomi cum et sine vino, корицевая простая и
 съ виномъ приготовленная вода. стр. 256.
Aqua fœniculi, вода волоскаго укропа. стр. 257.
Aqua menthæ cum et sine vino, мятная вода съ виномъ и
 безъ вина приготовленная стр. 257.
Aqua mineralis, минеральная вода. стр. 257.
Aqua selterana, зельцерская вода. стр. 259.
 — *Sedlicensis*, седлицкая вода. — 259.
Thermæ carolinæ, каролинскія теплицы. стр. 260.

- Hirschbergenses, Landeckenses et Triplicenses, теплая вода Гиршбергскія, Ландекскія и триплицкія. стр. 260.
- Aquigranenses, Аквигранскія теплицы. стр. 261.
- Freyvaldens, Lauschied-tenies et Berglinenses, Фрейнвальдскія, Дамштедскія, и Берлинскія теплицы. стр. 261.
- Aqua sprada, спасная вода. стр. 261.
- Egrana, — егрянская. 261.
- Pyrmontana, Пирмонтская — стр. 262.
- Ophthalmica confortans, глазная крѣпительная вода. стр. 262.
- Ophthalmica resolvens, разбивательная глазная вода. стр. 263.
- Phagedænica, фатеденская вода. стр. 263.
- Aqua florum sambucci, бузинноцвѣтная вода. стр. 264.
- Solopetaria Thedenii, рамоцѣлительная Теденіера вода. стр. 265.
- Arsenicum, мышьякъ. стр. 265.

В.

- Baculus, ослыпаніе, глухота, и причины оныя. 519.
- Basis linguae, основаніе, корень языка. 78.
- Bilis, желчь. 2.
- Hepatica, — печеночная. 254.
- Brachia, мышцы. 5.
- Bregma, чело, передняя часть головы. 3.
- Bronchia, дыхательные каналы. 80.
- Bubo, паханья, бубонъ. 771.
- Eius cura, леченіе оного. 1185.
- Excinator, ланитная мышца. 42.
- Globus oculi, глазное яблоко, глазной шаръ. 70. 302.
- Volimus, ненасытимая жадность. 509.

Прибавленіе къ В.

- Boscae juniperi, можжевельниковыя ягоды. стр. 267.
 Balnea, бани. стр. 267.
 — Frigida, холодныя бани. стр. 268.
 — Embrocatio, водокапная баня. стр. 268.
 Balsamus spiraeae, спиреиной бальзамъ. стр. 268.
 — Sulphuris, серной бальзамъ. — 268.
 Borax, бура. стр. 269.
 Butyrum antimonii, сурьмяное масло. стр. 269.

С.

- Cachexia, худоба, худокровіе. 402.
 Ejus cura, — леченіе онаго. 435.
 Cachochymia, порча соковъ, худосочность. 318.
 Calamus scriptorius, перообразная бразда въ мозгу. 73.
 Calcaneum, пятка. 33.
 Calor, теплота. 265. 495.
 Calliginis causa, слѣпоты, неясное видѣніе, и причины
 онаго. 513.
 Canalis venosus, крововозвращающій жилный каналъ. 184.
 Cancer, ракъ болѣзнь. 773.
 Ejus cura, леченіе онаго. 1190.
 Canthas major et minor, глазами кутокъ, большій и мень-
 шій. 76.
 — Oculi, глаза. 307.
 Capsula Glissoni, Глиссоніева сумочка. 90.
 — Chyli, сумочка млечнаго соку Пельвицеръ. 272.
 Caput gallinaginis, петухи голова, сѣмясобирающее
 мѣсто въ началѣ сплюда. 97.
 Cardia, лѣвое устье желудка. 85, 86.
 Cardialgia, околосердечная щемота, боль въ желудкѣ. 304.
 Ejus cura, леченіе онаго. 955.
 Cartilagineae, хрящи. 81.
 Caries, червоточина, гниль въ кости, костюда. 759.
 Ejus cura, леченіе онаго. 1177.

- Caro luxurians, мясное наростѣніе, дикое мясо. 784.
 Ejus cura, леченіе онаго. 1211.
 Caruncula lachrymalis, слезособирательное мясо. 76.
 Catalepsis, околѣлость. 644.
 Catarrhus, насморкъ. 450.
 Ejus cura, леченіе онаго. 871.
 — Suffocativi causa, причина душоузаживательнаго или
 удушливаго насморка. 499.
 Cavitas tympani, шишпанная впадина, полость въ слухо-
 вой кости. 26.
 Cerebrum et cerebellum, большій и меньшій мозгъ. 71. 73.
 Cholera humida, желчепеченіе, желчиизліяніе, желчная
 болѣзнь мокротная. 441.
 — Sicca, — сухая. 443.
 Chlorosis, дѣвичья безцвѣтность, или бѣлая дѣвичья ли-
 хорадка. 406.
 Chorea f. Viti, плясаніе святому Виту, буйственное
 плясаніе. 539.
 Ejus cura, — леченіе онаго. 990.
 Chorion, верхняя зародышева сорочка. 182.
 Chylificatio, сокообразованіе, сокошвореніе, вырабаты-
 ваніе питательнаго соку. 270.
 — Lesæ causa, причина поврежденнаго сокошворенія. 400.
 Chylus, питательный сокъ. 271.
 Chymos, второвареніе, другое вареніе пищи. 269.
 Cilia, рѣсницы. 76.
 Circulatio sanguinis, кругопеченіе крови. 205.
 — Omnium humorum, кругопеченіе всѣхъ влагъ въ тѣ-
 лѣ. 311.
 Cisterna lactea, млечное пріятельище, пріятельище пи-
 тельнаго соку. 88.
 Claviculae, остовныя кости, дужки, распорки. 30.
 Clitoris, петочка въ женскихъ дѣтородныхъ членахъ. 98.
 Color, цвѣтъ. 299.
 Coeliaca, сырой поносъ. 459.
 Coma somnolentum, спачка, сонливость. 555.
 — Vivil, — безсонная сонливость. 558.
 Conceptio, зачатіе, зарожденіе младенца въ утробѣ. 171.
 Congressus facundus, плодородное совокупленіе. 170.
 Condilomata, заднепроечные шишки. 788.

- Contractura*, сморченіе, сведеніе частей. 732.
Contusio, ушибъ, копузѣ. 753.
Eius cura, леченіе оныхъ. 1151.
Crisis, переломъ болѣзни. 384.
Crusta lactea, молочуха, огникъ, болячка на лицѣ у младенцевъ. 813.
Cristæ, гребнистыя заднепроходныя шишки. 789.
Cubitus, локоть. 31.
Cystis fellea, желчной пузырь. 454.

Прибавленіе къ С.

- Camphora*, камфора. стр. 470. 4
Cantharides, шпанскія мухи. стр. 271.
Castoreum, бобровая струя. стр. 272.
Conchæ præparatæ, приготовленные раковины. стр. 274.
Conserva antiscorbutica, противоцинготная приправа. стр. 473.
Cortex cascarillæ, кашкарыловая корка. стр. 274.
Cortex chinæ, лхорадошина корка. стр. 474.
Cortex cinnamomi, корица. стр. 278.
 — *Meferei*, корка волчьего корня, горюнь. стр. 278.
 — *Simarubæ*, завязная корка. стр. 279.
Cremor tartari, винной перечищенной казни. стр. 279.
Crocus, шафранъ. стр. 480.
 — *Metallorum*, металлической шафранъ. стр. 480.

D.

- Deglutio*, глотаніе. 263.
 — *Imminuta*, — уменьшенное, несовершенное. 397.
 — *Abolita*, — истребленное. 398.
Dentes, зубы. 24.
 — *Usus*, — употребленіе оныхъ. 263.
Diabetes, незадержаніе мочи, мочеиспеченіе. 452.
Eius cura, — леченіе онаго. 276.
Dyaphisis, срединя кость. 11.

Dia-

Diaphragma, грудобрюшная перепонка, перегородка. 71.
227.

Diarrhea, мытъ, жоротной поносъ. 451.

Eius cura, — леченіе онаго. 272.

Dilatole, разширеніе, раздланіе сердца. 159.

Digestio. is tempus, время и денаренія. 268.

Dysicte ciusfe, оглухасель, и причины оныя. 320.

Dysperdia, трудное вареніе желудка. 399.

Dyspnea, трудное дыканіе, задыханіе. 496.

Dysuria, трудное мочеиспущеніе, мочерѣтъ. 478.

Eius cura, — леченіе онаго. 916.

Ductus cholidochus, общій желчный протокъ. 91. 253.

— **Cysticus**, пузырежичный протокъ. Тамъ же.

— **Hepaticus**, желчный печеночный протокъ. 90.

— **Maxillares**, челюстные слюнные протоки. 79.

— **Pancreaticus**, протокъ поджелудочной желѣзы. 92.

— **Salivales**, слюнные протоки. 79.

— **Sublinguales**, подъязычные протоки. Тамъ же.

— **Thoracicus**, грудной протокъ. 98. 273.

Durae matris usus, употребленіе и польза твердой мозговой
оболочки. 243.

Е.

Eccly'a, внезапное сокрушеніе силъ, обморокъ. 394.

Eius cura, — леченіе онаго. 834.

Emphifematis cura, эмфизематознаго леченіе. 1243.

Eiaculatio seminis, изверженіе мужскаго сѣмени, 162.
167.

Embryo, зародышъ. 175.

Eius nutritio, — питаніе онаго. 179.

— **Situs in utero**, положеніе зародыша въ маткѣ. 194. 195.

Empirothotonus, слячнсть, переднесшоронная скорчен-
ность. 537.

Epierpia, черная немочь, падучая болѣзнь. 546.

Eius cura, — леченіе оныя. 992.

Enarthrosis, глубоководное членосоединеніе. 15.

При-

Прибавленіе къ Е.

Electricitas, электричество. стр. 281.

Elisirium antiscorbuticum, противоцинготный капль. стр. 285.

— *Resolvens*, разсывающіе капль. стр. 286.

— *Roborans*, крѣпящіе капль. стр. 287.

Empastrum de ammoniaco, аммоніачной пластырь. стр. 288.

— *De cicuta*, омеговой или болиголовной пластырь. стр. 289.

— *Resolvens Schmückeri*, Шмюккероу разсывающій пластырь. стр. 289.

— *Vesicatorium*, нарывный пластырь. стр. 290.

— *Vesicatorium perpetuum*, вѣсдашній нарывный пластырь. стр. 291.

Essentia alces, сабуровыя капль. стр. 292.

— *Angelicae*, дягилевыя капль. стр. 292.

— *Assae foetidae*, вонючей азы капль. стр. 292.

— *Aurantiorum*, померанцевыя капль. стр. 293.

— *Castorei*, бобровой струи капль. стр. 293.

— *Rumome lae albae*, бедренцевыя капль. стр. 293.

Essentia valerianae, валдырьяновыя капль. стр. 293.

Extractum absynthii aquosum, полынной водяной экстрактъ. стр. 294.

— *Ligni campechensis aquosum*, кампекскаго дерева водяной же экстрактъ. стр. 294.

— *Cascarillae aquosum*, водяной кашкариловой экстрактъ. стр. 295.

— *Centaurei minoris aquosum*, водяной золототысяшной экстрактъ. стр. 295.

— *Florum chamomillae aquosum*, ромашковой водяной экстрактъ. стр. 296.

— *Corticis chinæ aquosum*, джлорадошной корки водяной экстрактъ. стр. 296.

— *Cicutæ*, болиголовной экстрактъ. стр. 297.

— *Fumigae aquosum*, фиалковой водяной экстрактъ. стр. 297.

- *Gentianæ rubræ aquosum*, спародубконей водяной эк-
страктъ. стр. 297.
- *Graminis aquosum*, пирейной водяной экстрактъ. стр.
298.
- *Hellebori aquosum*, чемерицной водяной экстрактъ.
стр. 298.
- *Saturni*, свинцовой экстрактъ. стр. 298.
- *Talaxi*, одуванчиковой экстрактъ. 299.
- *Trifolii fibrini*, дилишней экстрактъ. 299.

F.

Fames, голодъ. 285.

Fauces, глвы. 78.

Favi, желною мокнущія матерією язвыны, парши на го-
ловѣ, гостецъ. 814.

Febris, лихорадка, трясавица, лихоманка. 575.

— *Intermittentes*, перемежающіяся лихорадки. 578. 579.

— *Cura*, — леченіе сихъ лихорадокъ. 1012.

— *Continuæ*, безпрерывныя лихорадки. 601. 605.

— *Cura*, леченіе оныхъ. 1030. 1034.

— *Symptomata*, припадки. 577.

— *Divisio*, — раздѣленіе оныхъ. 578.

— *Acota*, — острая. 580.

— *Peracuta*, — — преострая. 581.

— *Acotissima*, — — весьма острая. 582.

— *Anginoidea*, — жабная лихорадка, жаба. 630.

— *Cura*, леченіе оныхъ. 1061.

— *Biliofa*, caufus, желчная лихорадка, огневица. 616.

— *Cura*, — леченіе оныхъ. 1047.

Dysenterica, — кровавопоносная лихорадка. 656.

— *Cura*, — леченіе оной. 1077.

— *Hepatica*, — печеночная, съ воспаленіемъ печенки со-
единенная, лихорадка. 612.

— *Cura*, — леченіе оныхъ. 1035.

— *Erysipelacea*, — воспалительная, рожаная лихорадка.

643.

— *Cura ejus*, — леченіе оныхъ. 1077.

Мог-

- Morbillosa, корьная лихорадка. 669.
- Cura, — лечение оных. 1114.
- Nephritica, почечная, съ воспаленіемъ почекъ соединенная, лихорадка. 616.
- Cura, — лечение оных. 1039.
- Paraphrenetica, преградогрудобрюшная лихорадка. 652.
- Cura, — лечение оных. 1090.
- Peripneumonica, легочная, съ воспаленіемъ въ легкомъ и колющемъ въ него соединенная, лихорадка. 639.
- Cura, — лечение оных. 1074.
- Phrenetica, бѣшеная, бѣшная лихорадка. 648.
- Cura, — лечение оных. 1084.
- Plevritica, съ колющемъ въ бокахъ соединенная лихорадка, колюще. 635.
- Cura, — лечение онаго. 1063.
- Purpurata, краснобагровая лихорадка. 673.
- Cura, — лечение оных. 1118.
- Petechialis, пятнистая заразительная лихорадка.
- Cura, лечение оных. 1122.
- Splenetica, селезеночная лихорадка. 620.
- Synocha, непрерывная лихорадка. 622.
- Cura, лечение оных. 1044.
- Variolosa, оспенная лихорадка. 661.
- Cura, лечение оных. 1104.
- Lenta et hectica, медленная и сухопная или чахотная лихорадка. 686. 690.
- Cura, лечение оных. 1127.
- Feces, жидкостный калъ. 190. 375.
- Femur, бедро. 5.
- Fenestra ovalis, овальное окно въ слуховой кости. 36.
- Rotunda, — круглое окно въ той же кости. 75.
- Fermentum ventriculi, закваска въ желудкѣ, опара. 350.
- Fibræ, волокна, волоки. 155. 156.
- Fibula, дудка, берцовая кость. 32.
- Fistula, свищъ, болѣзнь. 826.
- Cura eius, — лечение онаго. 1237.
- Fissuræ, разщепины. 816.
- Fletus, плачь. 341.

Fluidum nervorum, нервная жидкость, жизненный сокъ.

341.

Fluor albus, женская бѣла. 462.

— *Cura*, — леченіе оной. 380.

Fluxus hepaticus, печеночное теченіе, непрерывной поножъ.

466.

— *Lochiorum*, кровоочищенія у женщинъ, теченіе кровей у женщинъ послѣ родовъ. 202.

— *Mensium*, — мѣсячина. 161.

— *Periodicus sanguinis*, урочное теченіе крови у женщинъ. 162.

Fœtus, зародышъ. 179.

Quando se movere incipit, когда двигаться или имѣть движеніе начинаетъ. 196.

Quam diu in utero manet, какъ долго находится въ утробѣ. 197.

Foramen ovale, овальная дыра. 188.

Fornix, сводаобразная часть въ мозгу. 72.

Fractura, переломъ кости. 756.

Cura eius, — леченіе оного. 1154.

Frigoris causa, причина стужи, холоду. 526.

Fungus, — грибъ, грибушное мясное наростѣніе въ ранѣ, дикое мясо. 779.

— *Cura*, леченіе оного. 1217.

Прибавленіе къ F.

Fel tauri inspissatum, сгущенная бычачья желчь. стр. 300.

Folia belladonnae, листья красавицы нѣрвы или блекоты. стр. 300.

Flores salis ammoniaci martiales, желѣзистые аммоніачныя цвѣты. стр. 300.

Flores arnicæ veræ, истинныя цвѣты. стр. 301.

— *Chamomilla vulgaris*, ромашечные цвѣты. стр. 302.

— *Sambucci*, бузиновые цвѣты. 302.

— *Sulphuris*, сѣрные цвѣты. стр. 303.

G.

Ganglion, сухожильный желвакъ. 780.

Cura eius, — леченіе онаго. 1210.

Guttæ rosacæ cura, леченіе пьянственной угреватины. 1236.

Galasmi, передніе зубы. 3.

Generandi potestas, могущество раждать, способность къ
произрожденію. 161.

Generationis requisita, принадлежності къ рожденію. 162.

Genitalia virorum et feminarum, дѣлородныя части муж-
жескія и женскія. 71. 97. 98.

Glandulæ, железы. 108.

— Pinealis, кубарообразная желѣза въ мозгу. 72. 113.

— Conglobata, шаровидная желѣза. 110.

— Conglomerata, многосложная желѣза. 111.

— Capitis, головная желѣзы. 112.

— Colli, шейныя желѣзы. 115.

— Genitalium mulierum et virorum, желѣзы дѣлородныхъ
частей мужескихъ и женскихъ. 118. 119.

— Divisio glandularum, раздѣленіе желѣзъ. 108.

— Membrotum, членосоединенныя желѣзы. 120.

— Infimi ventris, брышныя желѣзы. 117.

— Oris et linguae, устныя и язычныя желѣзы. 114.

— Thoracis, грудныя желѣзы. 116.

Glands, плѣшка мужескаго члена. 97.

Glottis, надглоточной хрящикъ, мостикъ. 78. 337.

Compholis, неподвижное членосоединеніе. 10.

Gonorrhoea benigna, Благая, добрая грыжа, генорей. 464.

— Cura eius, леченіе оной. 882.

— Maligna, злая, заразительная грыжа. 465.

— Eius cura, леченіе оной. 884.

Gummata gallica, любострастные ягкія костонароетѣ-
нія. 792.

Gustus, вкусъ. 289.

Guttæ serenæ causa, причина темной воды въ глазахъ. 512.

Прибавленіе къ G.

Gargarisma adstringens, вяжущее полосканье. стр. 303.

— Resolvens, разбивательное полосканье. стр. 304.

- Globuli martiales, желѣзные шарики, лдрышки. стр. 304.
 Gummi ammoniacum, аммоніачная камедь. стр. 305.
 — Arabicum, Арапская камедь. стр. 305.
 — Assæ foetidae, чертова духа камедь. стр. 306.
 Gummi euphorbii, еффорбіева камедь. стр. 306.
 — Galbani, галбанова камедь. стр. 306.
 — Gvajaci nativum, самородная банаутова камедь. стр. 307.
 Gummi guttæ, желтая камедь. стр. 308.

Н.

- Nallux, большой на ногѣ палецъ. 5.
 Harmonia, единообразное членосоединеніе. 19.
 Haemortylus, кровохарканіе. 441.
 — Eius cura, — леченіе онаго. 362.
 Haemorrhagia, кровотеченіе. 457.
 — Eius cura, — леченіе онаго. 910.
 Haemorrhoides nimiae, чрезвычайное теченіе геморол. 458.
 — Cura eorum, — леченіе онаго. 911.
 Helix, передній завитокъ у уха.
 Hemiplexia, полуотъяніе шѣла, полутѣльной параличь. 524.
 Hepar, печенька. 71. 90.
 Herniæcum divisio, раздѣленіе килъ или грыжей. 833.
 — Cura eorum, леченіе оныхъ. 1204.
 Hernia flatulenta, вѣтренная грыжа. 430.
 — Varicosa, — жилонатяжная грыжа. 776.
 Herpes, летучій ѣдкій огонь. 812.
 Heterogenea, инокродная, 339.
 Homogenea, однородная жидкость. 347.
 Humores oculi, глазныя влаги. 77. 310. 312.
 Hydatides, водяные пузыри. 428.
 Hydrocele, мошонковая водяная болѣзнь, или грыжа. 429.
 — Eius cura, леченіе оныхъ. 856.
 Hydrocephalia, головная водяная болѣзнь. 426.
 Hydrops, водяная болѣзнь. 412.

Eius cura, леченіе оных. 344.

Hydrops pectoris, грудная водяная болѣзнь. 431.

— Cordis, сердечная водяная болѣзнь. Тамъ же.

Hygrophthalmia, водяное глазоболѣніе. 427.

Hymen, дѣвственнаѣ, дѣвство, не скверной бракъ по-
звуждал плена. 98.

Hypotenar, ошводлила самой меньшей палецъ мышица. 61.

Прибавленіе къ Н.

Hepar sulphuris, сѣрная печенька. стр. 308.

Herba aristolochiae rotundae, трава конарникавал. стр. 310.

Herba boni hernici, степной шалфей. стр. 310.

Herba centaurei minoris, золототысячникъ. стр. 311.

Herba cicutae, болиголовъ. стр. 311.

— Cochleariae, дожешная трава. стр. 312.

— Malvae, просвирыя. стр. 313.

— Meliloti, донникова трава, буркунъ. стр. 313.

— Menthae, мята. стр. 313.

— Mullefolii, диная гречуха, кашка, деревей. стр. 313.

— Nicotianae, табакъ. стр. 313.

— Sabinae, казацкой можжевельникъ. стр. 314.

— Trifolii fibrini, трилистникъ, дяшлина. стр. 314.

I.

Icterus, желтуха. 433.

Ilcus, подвздошнокишечная болѣзнь, сильной рѣзъ въ живо-
тѣ съ запоромъ. 476.

— Cura eius, — леченіе онаго. 915.

Imaginatio, воображеніе. 330.

Incubus, домовый, захвачиваніе духа во снѣ. 553.

Incus, подобна въ слуховой кости наковальнѣ косточка. 26.

Infundibulum, воронка. 71.

Ingvina, пахи. 4.

Ingenium, острота ума. 332.

Infantia, сновидѣнія. 365.

- Intemperies, нерастворенность, неравномерное и непорочное сѣщеніе часней въ тѣлѣ. 360.
 — Quotuplex, — коликотворное есть. 361.
 Intertrigo, изопредость на тѣлѣ, болячка. 810.
 Integumenta, покровы из тѣлѣ. 90.
 Intestina, кишки. 71. 87.
 Iris, радѣкъ въ глазу. 77.
 Ischuria, задержка мочи. 479.

К.

- Kermes minérale, шаргузѣянской порошокъ. спир. 314.

L.

- Labia, зубы. 78.
 Labyrinthus, лабиринтъ въ ухѣ. 75. 315.
 Lactis abundantia, преизобиліе молока, грудища. 453.
 Eius cura, — леченіе оной. 901.
 Lagynx, гортань. 80.
 — Eius musculi, мышцы оной. 43.
 Lens crystallina, хрустальная сочевица, сочевицѣ подобная хрустальная плита въ глазу 77. 298.
 Lepa, проказа. 808.
 Lethargus, безпросыпной холодной сонъ. 549.
 Lienteria, ѣственесваренный поносъ. 460.
 — Cura ejus, — леченіе онаго. 879.
 Lichen, лишай. 811.
 Cura ejus, его леченіе. 1213. и послѣдующее.
 Ligamentum subperforium, пощѣночная связка. 90. 184.
 — Latum et rotundum, широкая и круглая связки. 99.
 — Interclaviculare, междоушковая связка. 100.
 Rhomboideum, ромбoidalная связка. Тамъ же.
 — Capsulae, лопаточная связка. Тамъ же.
 — Vaginalia phalangum, связки влагалищныхъ рядовъ
 ручныхъ костей. Тамъ же.

- Maxillare, челюстная связка. 104.
- Spinae dorsii, спинной кости связка. 105.
- Costarum et sterni, реберная и грудная связки. 106.
- Ossium innominatorum, безыменых костей связки. 107.

Lipothymia, обморокъ. 550.

— Cura ejus, — лечение онаго. 999.

Lingvæ musculi, язычные мышцы. 46.

Liquor gastricus, желудочной разворагительной сокъ. 86.
250.

— Pancreaticus, — подобный же сокъ поджелудочной же-
лѣзы. 251.

Lobulus, ушко. 75.

Lochiorum fluxus nimius, чрезвычайное кровотечение у
женщинъ послѣ родовъ случающееся, немѣрное
кровоочищение. 455.

Loquella, рѣчь, словопроизношеніе. 340.

Laxatio, вывихъ. 744.

— Cura, — лечение онаго. 1134.

Прибавленіе къ L.

Lapides cancerorum, раковыя жерновки. стр. 316.

Lavdanum liquidum sydenhami, утолительная Зиденгамо-
вы мапли. стр. 316.

Lichen caninos, пестій мохъ. стр. 317.

— Islandicus, Исландской мохъ. 317.

Lignum juniperi, можжевельное дерево. стр. 318.

— Camprechense, кампекское дерево. стр. 318.

— Quajaci, Гваяковое или бакауиное дерево. стр. 318.

Lignum quassiae, квасцѣро дерево. стр. 319.

Limatura martis, желѣзная опилки. стр. 320.

Limentum pantispassmodicum, прописное дорожная мазь.
стр. 320.

Liquamen myrrhae, мирровой разтворъ. 321.

Liquor anodinus, утолительная капля. стр. 321.

— Cornu cervi succinatus, ланцарыня, оленья рога, кап-
ли. стр. 323.

Liquor terrae foliatæ tartari, разтворъ гипнокаменной ли-
сеновой земли. стр. 324.

М.

Malleus, молотку подобная кость въ ухѣ. стр. 26.

Malleoli, лодышки. 5.

Malum hypochondriacum, подозрѣнная болѣзнь, и похондріа. 482.

— *Cura ejus*, леченіе оныя. 919.

— *Hystricum*, истерическая болѣзнь. 484.

Cura ejus, — леченіе оныя. 921.

Mania, сумашествіе. 569.

Masticatio, жеваніе. 262.

— *Imminuta*, уменьшенное. 395.

— *Abolita*, истребленное. стр. 396.

Meatus auditorius, слуховой проходъ. 75. 322.

Meconium, первая дѣтская пороша. 190.

Mediastinum, перегородка въ груди, грудостѣнная перегородка. 84.

Medulla spinalis, спинная жила. 74. 121.

Melanchoia, задумчивость, меланхолія. 567.

— *Cura ejus*, — леченіе оныя. 1013.

Melceris, ядунца, мягкой вододыр из шѣлѣ. 797.

— *Cura ejus*, леченіе онаго. 1219.

Memoria, память. 331.

Menses inordinati, неупорядоченная мѣсячина. 468.

Mentium fluxus nimius, непомерная мѣсячина, чрезвычайное мѣсячное кровотеченіе. 454.

Cura ejus, — леченіе онаго. 902.

Mesenterium, брыжженка. 272.

Metacarpos, палецъ у руки. 5. 31.

Actatargis, злѣзенье. 5. 32.

Misanthropia, человеконенависть, нелюдность. 570.

Morbus, болѣзнь. 353.

— *Causae ejus*, — причины оныя. 354.

— *Divisio*, — раздѣленіе болѣзней. 363.

— *Continui*, непрерывныя болѣзни. 367.

— *Remittentes*, послабляющія болѣзни. 368.

— *Intermittentes*, перемежающіяся болѣзни. 369. 376.

— *Epidemici*, повальные, эпидемическія болѣзни. 385.

Status morbi, состояніе, утвержденіе болѣзни. 382.

Motus

- Motus epileptici, червонемочный движѣнїя. 335.
 — Peristalticus, равноснотѣльное движѣнїе. 267.
 — Sanguinis, движѣнїе крови. 205.
 — Musculi, мышцы. 34. 35.
 — Abdominis, брюшныя мышцы. 33.
 — Bulbi viulorum, глазаго шара мышцы. 40.
 — Auris, ушныя мышцы. 37. 38.
 — Oculi externi, глазныя вышнїя мышцы. 39. 308.
 — Labiorum, губныя мышцы. 42.
 — Laryngis, горланныя мышцы. 48.
 — Linguae, язычныя мышцы. 46.
 — Lumborum et ossis coxae, поясничныя и кончиновыя мышцы. 31.
 — Pharyngis, ушья ниде рѣмного горла мышцы. 49.
 — Caput moventes, головодвижныя мышцы. 47.
 — Ossis hyoides, яичной кости мышцы. 45.
 — Humeri, раменныя мышцы. 55.
 — Scapulae, лопатковыя мышцы. 54.
 — Radii et cubiti, лучной кости и локтя мышцы. 57.
 — Thoracis, грудныя мышцы. 52.
 — Uvulae, язычка въ горлѣ мышцы. 50.
 — Myologia, мїологїя, или наука о мышцахъ. 10. 34.
 — Myopia, близорукость. 318. 314.

Прибавленїе къ М.

- Magisterium fatorni, снїдцовая илѣсть. стр. 325.
 Magnesia salis ferriacetis, магнезія (сѣдлцкой соли. стр. 326.
 Manna, манна. 327.
 Mei, медь. стр. 327.
 Mercurius dulcis, ртуть, живое серебро. стр. 328.
 — Dulcis, усладѣнная ртуть. стр. 329.
 — Gummosus, камедьная ртуть. стр. 331.
 — Nitrosus, сѣдлцкая ртуть. стр. 332.
 — Praecipitatus albus, осажденная бѣлая ртуть. стр. 334.
 — Praecipitatus ruber, красная осажденная ртуть. стр. 335.
 — Sublimatus, сулема. стр. 335.
 — Tartaratus, или тартаровая ртуть. стр. 336.
 Mixtura acida, кислая махшуря. стр. 336.

Mixtura diaphoretica, испариногонительная микстура смр. 337.

- Refrigerans, холодительная микстура. смр. 338.
- Retolvens, разбивательная микстура. смр. 339.
- Solvens, таящая микстура. смр. 339.
- Temperans, ушляющая жаръ микстура. смр. 340.
- Moschus, мускусъ. смр. 341.

N.

Nates, лягушцы. 72.

Nausea caufae, причины омерзѣтїа, тошноты. 507.

Nervi medullae spinalis, чувствительныя жилы, спинной жилы. 123.

— Oculi moventes, глазодвижныя, чувствительныя жи-
лы. 123.

— Olfactorii, обонятельныя, чувствительныя жилы. 123.
291.

— Optici, зрительныя, чувствительныя жилы. 77. 306.

— Nervologia, неврологїа или наука о нервахъ и чувстви-
тельныхъ жилахъ. 10. 121.

— Nyctalopia, ночное видѣнїе. 516.

Noctambuli, лунашники, ночеходцы. 566.

Nutritio corporis, питанїе тѣла. 278.

Immutata et depravata, уменьшенное и испорченное пита-
нїе тѣла. 401.

Nymphae, дѣтородоудныя сережки. 98.

Прибавленїе къ N.

Nitrum antimoniatum, сурьмяная селитра. смр. 342.

— Depuratum, очищенная селитра. смр. 344.

О.

Oblivio, забвѣнїе. 563.

Oculi, глаза. 71. 76. 77.

Odor, olfactus, запахъ, обоняніе. 294.

Oedema, отеки. 770.

— Eius cura, — леченіе оного. 1208.

Oesophagus, пищедрѣмное горло. 71. 85.

Omentum, сальникъ. 95.

Oristotonus, шестипная скорченность. 536.

Orthopnea, задышка, тяжелое дыханіе. 498.

Oscitationis causa, причина званія. 527.

Ossa innominata, безъименныя кости. 27.

Oss femoris, бедровая кость. 31.

— Hyoides, роговая, язычная кость, кобылка. 25. 45.

— Scaphoides, лоджѣ подобная кость. 33.

— Tibiae, берцовая кость. 32.

Ossium functiones, осправленія, польза костей. 160.

Osteologia, остеологія, наука о костяхъ. 10. 11.

Ovaria, яичники. 99. 175.

Прибавленіе къ О.

Oleum animale dipelii, Дипеліево животное масло. стр. 34.

Oleum anisi, анисовое масло стр. 347.

Oleum caryophyllogum, гвоздичное масло. стр. 348.

— Chanomillae destillatum, двойное ромашечное масло. стр. 348.

— Foeniculi, волосного укропа масло. стр. 348.

— Baccarum juniperi, можжевельное масло. стр. 348.

Oleum lauri baccarum destillatum, лавровое масло. стр. 349.

Oleum mathae destillatum, мятное двойное масло. стр. 349.

Oleum millefolii, масло дикой гречухи. стр. 349.

Oleum petrae, каменное масло. стр. 350.

Oleum riari, дивнаго дерева или крижовнишное масло. стр. 350.

Ole-

Oleum terebinthinae, терпентинное масло, скипидаръ. стр. 351.

Opium, опиѣ. стр. 351.

Oxynel simplex, простой кислой медъ. стр. 354.

Oxynel scilliticum, морскодуговой медъ. 354.

Р.

Palpebrarum visus, употребленіе глазныхъ вѣкъ. 314.

Palpitation cordis, трясеніе, трепетаніе сердца. 311.

— *Cura eius*, — леченіе оного. 987.

Pancreas, подъ желудочная большая многосложная желѣза. 71. 92.

Panniculus carnosus, мясистая подъ кожей оболочка. 9.

Paralysis, парализъ. 523.

— *Cura eius*, — леченіе оного. 966.

Partis eiusque initium, роды, и ихъ начало. 194.

— *Requisita*, принадлежности къ родамъ. 199.

— *Præcox*, скоропоспѣвшіе роды. 200. 471.

— *Pathologia*, патологія, наука о болѣзняхъ. 352.

Pedartrocæ, околосоставная кость. 832.

— *Penis*, мужской дѣтородный членъ. 97.

— *Pericardium*, околосердечная перепонка, сердечной мѣшочки. 83. 136.

— *Periostium*, надкостная плева. 12.

— *Phantasia*, мечпаніе. 330.

— *Pharynx*, узкое глотъ гортанного горла. 85.

— *Phlyctenæ*, водяные пузырьки. 817.

Phthisis, чахотка. 821.

Physiologia, физиологія, наука о человѣческомъ естествѣ. 154.

Plica, колунтъ, польская болѣзнь. 794.

— *Cura eius*, — леченіе оныхъ. 1218. 1234.

— *Pica*, испорченное желаніе ѣсть, испорченной вкусъ, пика. 510.

Placenta, дѣтское мѣсто, послѣдъ. 182.

— *Pleura*, подреберная плева. 71. 84.

Pol-

- Pollutio nocturna, ночное оскверненіе. 472.
 Prolapsus, выпаденіе. 729.
 Cura eius, — леченіе онаго. 7143 по 1147.
 — Pruritus, почесота, свербѣжъ. 502.
 Ptyalismos, слюнотеченіе. 447.
 Pulso, легкое. 82.
 Pulsus magnitudo, великое бѣненіе жилъ, или пульса. 108.
 — Celeritas, — скорое бѣненіе пульса. 210.
 — Crebritas, — частое. 212.
 — Duritas, — твердое. 214.
 — Mollities, — мягкое. 215.
 — Plenitudo, — полное. 216.
 — Raritas, — рѣдкое. 211.
 — Vacuitas, — пустой пульсъ. 216.
 Proportio bona, хорошая пропорція, разиѣръ. 217.
 Pylorus, правое устье желудка. 86.

Прибавленіе къ Р.

- Pilula antihydricæ, мапошныя пилюли. стр. 355.
 — Balsamicæ, бальзамическія пилюли. стр. 356.
 — Hydragoga janini, водотонительныя лияновы пилюли.
 стр. 356.
 — Purgantes, проносныя пилюли. стр. 358.
 — Purgantes antelminticæ, противоглистныя проносныя
 пилюли. стр. 358.
 — Resolventes, разиивательныя пилюли. стр. 359.
 Potio antipharmacica prima, противолдое первое питье.
 стр. 360.
 — Secunda, другое противолдое питье. стр. 360.
 — Communis, обыкновенное противолдое питье. стр. 362.
 — Antyllia, противобѣшенное питье. стр. 362.
 — Laxans, слабительное питье. стр. 363.
 Pulpa tamarindorum, тамариндовая кашка. стр. 363.
 Pulvis antelminticus, порошокъ отъ глистовъ стр. 364.
 — Antifebrilis, порошокъ отъ лихорадки. стр. 365.
 — Euphrasticus, разиивательный порошокъ. стр. 365.
 — Pectoralis, грудной порошокъ. стр. 366.

R.

Rabies canina, неистовство, отъ угрызенія бѣшеной соба-
ки произшедшее, болѣзнь отъ воды, песье
бѣшенство. 573.

— *Cura eius*, — леченіе сего припадка. 1018.

Rachitis, Аглинская болѣзнь, убоѣе. 410.

— *Cura eius*, — леченіе онаго. 841.

Radius luminis, лучъ свѣта. 300. 306.

Ranina, жаба, опухоль въ горлѣ. 772.

Ratio, разумъ. 332.

Raucedinis causa, причина хрипоты. 433.

Receptaculum chyli, пріемелище питательнаго соку. 88.

Refractio, предомленіе лучей. 299.

Regio epigastrica, сторона надчеревная. 4.

— *Hypogastrica*, — подчеревная. Тамъ же.

— *Umbilicalis*, — пуповная. Тамъ же.

Reminiscentia, припамятованіе. 331.

Repes, почки. 94. 255.

Res naturales, натуральныя вещи. 357.

— *Non naturales*, не натуральныя вещи. Тамъ же.

Rheumatismus, простуда, ревматизмъ, ломота. 490.

Risus, смѣхъ. 341.

Roctus, отпрыжка, рытаніе. 443.

Cura eius, — леченіе онаго. 869.

Прибавленіе къ R.

Radix altheæ, корень большого проскурника. стр. 367.

— *Angelicæ*, дягилевой корень. стр. 367.

— *Apii*, селлеринной корень. стр. 368.

— *Artemisiæ*, хрѣнъ. стр. 368.

— *Belladonæ*, блекотной корень. стр. 368.

— *Columbo*, корень полумбо. стр. 369.

— *Consolidæ majoris*, корень дашакова уха. стр. 369.

Radix gentianæ rubræ, корень стародубки. стр. 370.

— *Graminis*, пирейной корень. стр. 370.

— *Hellebori nigri*, черной чемерицы корень. стр. 370.

— *Jalappæ*, ладановой корень. стр. 371.

- *Ipecacuanhæ*, рвотной корень. стр. 371.
- *Li uiritiæ*, солодкового корень. стр. 373.
- *Raphani nigri*, черная рѣдька. стр. 373.
- *Rhabarbari*, копытной ремень. стр. 373.
- *Rubix tinctorium*, корень дикой марѣоны. стр. 374.
- *Sarsaparillæ*, сарсапарилъ. стр. 374.
- *Senegæ*, щетинковъ корень. стр. 375.
- *Squillæ*, морского луку корень. стр. 375.
- *Taraxaci*, одуванчиковой корень. стр. 376.
- *Valerianæ*, мауновой корень. стр. 376.
- Resina jalapæ*, ялапная смола стр. 377.
- Roob Juniperi*, можжевеловой взваръ. стр. 377.
- *Sambucci*, бузинникъ. стр. 377.
- *Sorborum*, рябинникъ. 378.

Б.

- Saccus lachrymalis*, слезегобирательная сумочка. 76.
- Salivæ secretio*, отдѣленіе, пивореніе слюны. 249.
- Sanguificatio*, кровосоставленіе, кровопвореніе. 274.
- Lang inis circulatio in foetu*, круготеченіе крови въ за-
ромышѣ, или младенцѣ, находящемся въ
матерней утробѣ. 188.
- *Contentatio*, — ступеніе крови младенческой. 187.
- *Motus celerrimus*, — самое скорое шеченіе оной въ мла-
денцѣ же. 207.

- Sapor*, вкусъ, смакъ. 292.
- *Eios diversitas*, — его различіе. 293.
- Sarcocele*, мясистая, шуляпная грыжа. 781.
- Sarcoma*, мясной наростъ. 782.
- Scabies*, короста, чесотка. 492.
- Cura eius*, — леченіе оных. 944.
- Scirrhus*, тугая опухоль, скиръ. 767.
- Cura eius*, — леченіе онаго. 1180.
- Scorbutus*, скорбета, цынготная болѣзнь. 486.
- Cura eius*, — леченіе оных. 928.
- Scrotum*, мошонка. 97.

- Secretio, отдѣленіе или выработываніе влаги. 234.
 Semen, семя мужское. 257.
 Sensus externi, чувства внѣшніе. 279.
 — Interni, — внутренніе. 329.
 Sensatio, чувствованіе. 280.
 Signum virginitatis, знакъ дѣвства. 172.
 Sinus verae portae, пазуха воронной крововозвратной жи-
 лы. 90.
 Sitis, жажда. 288.
 Situs factus in utero, положеніе младенца въ матерней
 утробѣ. 194.
 Singultus, икота. 529.
 Sinus, рытвикъ или нора въ шлѣбѣ. 125.
 Sirones, черная свербящая сыпь на шлѣбѣ, роцы. 819.
 Spina ventosa, неперенная ость, внутрикостная гниль.
 831.
 Soni phaenomena, явленія звука. 321.
 Splanchnologia, спланхнологія, наука о внутренностяхъ.
 10. 71.
 Spirituum animalium secretio, отдѣленіе жизненныхъ со-
 ковъ. 242.
 Spotum croentum, кровавая харкотина. 444.
 Cura eius, — леченіе оной. 867.
 Steatoma, волдырь на шлѣбѣ, сальника. 799.
 Stereotimonis causa, причина чиханія. 527.
 Stranguria, мочерѣзѣ. 480.
 Cura eius, — леченіе онаго. 916.
 Stomacace, — дынга. 492.
 Strabismus, косоглазость. 517.
 Sudamina, зудная сыпь. 818.
 Sauciatorum a serpente cura, 1243.
 Sudor copiosus, великой потѣ, сильное потѣніе. 449.
 Cura eius, — леченіе онаго. 870.
 Symptomata, признаки. 386.
 Syncope, обмираніе. 551.
 Syndesmologia, Синдесмологія, или наука о связкахъ. 10.
 100.
 Synevrofis, связопосредственное членосоединеніе. 17.
 Syfarcosis, непосредственное членосоединеніе. 18.
 Systole, сжатіе, сплитываніе сердца. 159.

Прибавленіе къ S.

- Sal ammoniacum, нашатырная соль. стр. 378.
 Sal cornu cervi, соль выжженная изъ оленья рога. стр. 379.
 — Mirabile glayberi, сазимельная глауберова соль. стр. 379.
 Sal sodæ et sol tartari, иранная щелочная и виннокислая соль. стр. 380.
 Sapo Hispanicus, Гиппанское мыло. стр. 380.
 Searabot majales, майки мухи. стр. 381.
 Semen cunæ, цинварное сѣмя. стр. 381.
 — Fam.coli, сѣмя волоскаго укропа. стр. 381.
 Semen lini, льняное сѣмя. стр. 382.
 Semen sabadilleos, сабадилловое сѣмя. стр. 383.
 Semen foenogreci, сѣмя Божіей травы. стр. 382.
 — Senapios, горчица. стр. 382.
 Sinapismus, горчичникъ. 382.
 Species pro cataplasmate, наторъ для припарки. стр. 383.
 Species pectorales demulcentes, грудные оспротомолительные сорты. стр. 384.
 — Pectorales resolventes, разбивательной грудной наторъ и коренья. стр. 384.
 — Purificantes, кровочистительной наторъ. стр. 385.
 Spiritus cornu cervi, спиртъ оленья рога. стр. 386.
 — Mindereri, миндереверъ спиртъ. стр. 386.
 — Salis ammoniaci, нашатырной спиртъ. стр. 387.
 — Sulphuris, сѣрная кислота. стр. 387.
 Spiritus vini camphoratus, камфорной спиртъ. стр. 388.
 — Vitrioli, купоросная кислота. стр. 388.
 Spongia marina, морская губка. стр. 389.
 Succus citri, лимонной сокъ. стр. 389.
 — Liquiritize, сокъ солодковаго корня. стр. 389.
 Sulphur antimonialis, сурьмяная сѣра. 389.
 Sympus acetosatus cytri, спиртъ лимоннаго сока. стр. 390.
 — De althea, проскурняшней спиртъ. стр. 390.
 Sympus pectoralis demulcens, грудной оспротомолительный спиртъ. стр. 391.
 — Pectoralis resolvers, разбивательный грудной спиртъ. стр. 391.

Tactus, осязаніе. 283.

Tendines, сухія жилы. 7.

Tenesmus, сиеденіе при испражненіи желудка, позывъ на
нижъ. 474.

Tera eius, — леченіе онаго. 914.

Testiculi, ятра, шулаша. 97. 257.

Totanus, всецѣлесная пружность, околѣніе. 338.

Thymus, тимьяновидное мясное наростѣніе. 790.

Thorax, грудь. 84.

Tinea, жоль, шелудя. 827.

Tonsillae, миндаловидныя желѣзы въ зѣвахъ. 78.

Trachea, дыхательное горло. 80.

Tragus, передущекъ. 75.

Transpiratio insensibilis, нечувствительное испареніе. 258.

Tunicae, плевы. 7. 86.

— Oculi, — глазныя плевы. 77.

Tossis, кашель. 328.

Tera eius, — леченіе онаго. 971.

Прибавленіе къ Т.

Tartarus emeticus, рюшной винной камень. стр. 395.

— Tartarizatus, возрожденной или сохпавшей винной камень.
стр. 394.

Tetrastichina veneta, скипидаръ изъ лещевницы. стр. 394.

Tinctura antimonii Jacob., сурьмяныя Якововы капли.
стр. 396.

Tinctura cantharidum, капли шпанскихъ мухъ. стр. 397.

Tinctura gvajaci volcatilis, проникательныя гваяковыя ка-
пли. стр. 398.

Tinctura martis adstringens Ludovici, желѣзныя влззатель-
ныя капли людовиковы. стр. 398.

— Martis aperitiva, пропускаемыя капли желѣзныя. стр. 399.

— Rhubarbari aquosa, ревеневыя водяныя капли. стр. 399.

U.

- Vagina, рукавъ, влагалище у матки. 98.
 Valvulae tricuspidates заслоночки предлестных. 83.
 — Mytrales, — ширпообразные. 83.
 — Semilunares, — полудунины. Тамъ же.
 Vapor, паръ. 251.
 Varix, жилонапряжение. 779.
 Cura eius, — леченіе онаго. 1201.
 Variolae magnae, любоспристныя шишки. 793.
 Vasa biliaria, сосуды желчныя. 90.
 — Sangvifera, кровеносныя. 235.
 — Lymphatica, лимфатичныя. 86. 95.
 — Lactea, млечныя. 88. 272.
 Vena cava, полая большія жила. 138. 188.
 — Portae, крововозвратная воротная жила. 128.
 — Sinus, пазуха сея жилы. 147.
 Iliacae, подвздошныя крововозвратныя жилы. 144.
 Axillares, подмышечныя крововозвратныя жилы. 141.
 Mesentericae, брыжеечныя крововозвратныя жилы. 149.
 — Pulmonales, легочныя крововозвратныя жилы. 118.
 152.
 — Raninae, подъязычныя крововозвратныя жилы. 153.
 — Splenetica, селезеночная крововозвратная жила. 151.
 — Subclavicae, подмышечныя крововозвратныя жилы. 140.
 Ventriculi cerebri, полости, пузырьки мозговые. 72.
 — Cordis, — сердечныя. 83.
 Vermes, глисты. 436.
 Cura, — леченіе онаго. 842.
 Vertebrae, позвонки. 27.
 — Verae et spurcae, истинныя и ложныя. 27.
 Vertigo, круженіе въ очахъ и головѣ. 362.
 Cura, — леченіе онаго. 1009.
 Vesica fellea, желчный пузырь. 71. 91.
 Venucae feminales, сѣмянные пузырьки, 97.
 Vis elastica, упругая сила. 156.
 Voluntas, воля. 333.
 Vonitus, рвота. 440.
 Cura, — леченіе онаго. 857.

- Vitia auditus, пороки или припадки слышанія. 513.
 Cura, — леченіе оныхъ. 960.
 Ulcus, вередъ, чырей. 357.
 Cura, — леченіе оного. 1173.
 Ureteres, мочеточники. 71 34.
 Urina, моча урина. 255.
 Uterus, матка, утроба. 99.
 Uvula, язычекъ въ горлѣ. 78.
 мышцы оного. 50.
 Vulneta, раны. 755.
 Cura, — леченіе оныхъ. 1159.

Прибавленіе къ U.

- Unguentum da althea, проскурняшная мазь. стр. 400.
 — Mercuriale rubrum, красная ртутная мазь. стр. 400.
 — Neapolitanum, неаполитанская мазь. стр. 401.
 — Nervinum, жидокрѣпительная мазь. 401.
 — Ophthalmicum, глазная мазь стр. 402.
 — Ad scabiem, отъ коросты мазь. стр. 403.

V.

- Vinum, вино. стр. 404.
 Vitriolum album, бѣлой купоросъ. стр. 404.
 — Martis, зеленой купоросъ. стр. 404.
 — Veneris, синей купоросъ. стр. 405.
 Vinum medicatum corroborans, лекарственное крѣпительное
 вино. стр. 406.
 — Medicatum stomachale et antifebrile, отъ жирома и ли-
 хорадокъ вино. стр. 407.



ТОМЪ II.

ПОГРѢШНОСТИ.

Строк. строки	напечатано	читай.
1 — 1	во внезапномъ сокру- шеніи силъ	въ скоропоспѣж- номъ орморокѣ или обыкраніи.
5 — 27	засорѣнїе	засореніе вездѣ.
33 въ гл. 17.	моченоченїя	мочепеченїя.
44 гл. 22	преизбишечества молока	грудницы или опу- холи въ грудяхъ вездѣ.
88 гл. 44	святому вишу	Вимову испукану.
97 гл. 48	въ глазахъ	должно прибавить и головѣ.
183 — 10	помякнушымъ	помянутымъ
— — 16	не каясь	не казаясь вездѣ.
184 — 29	случаются	случаются вездѣ.
192 — 22	употребленїе	употребленїемъ
232 гл. 96.	обжогъ	ожогъ вездѣ.
237 — 12	бѣшенія	бѣшенная.
— — 14	белена	бѣлена вездѣ.
259 — 18	зельцерская	сэльтерская
283 — 19	сорты	наборъ вездѣ, что простые люди Еро- феемъ назы- ваютъ.

30852-12

unb 15807





